

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA CON 1 VIAL DE 50 ML

CAJA CON 1 VIAL DE 100 ML

CAJA CON 1 VIAL DE 250 ML

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Marbosyva 100 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Marbofloxacino 100 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

50 ml

100 ml

250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino (cerdas)

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: vía intramuscular, subcutánea o intravenosa

Porcino (cerdas): Vía intramuscular

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino:

Vía intramuscular (dosis única de 8 mg/kg):

Carne: 3 días

Leche: 72 horas

Vía intramuscular o subcutánea (inyección única diaria de 2 mg/kg, durante 3-5 días):

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-13-04

Carne: 6 días

Leche: 36 horas

Porcino (cerdas):

Vía intramuscular:

Carne: 4 días

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, fecha límite de utilización ...

Período de validez después de abierto el envase: 28 días.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No congelar.

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”
--

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
--

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--

Laboratorios SYVA, S.A.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2670 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

VIALES DE 50 ML
VIALES DE 100 ML
VIALES DE 250 ML

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Marbosyva 100 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Marbofloxacino 100 mg/ml

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino (cerdas)

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: vía intramuscular, subcutánea o intravenosa

Porcino (cerdas): Vía intramuscular

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino:

Vía intramuscular (dosis única de 8 mg/kg):

Carne: 3 días

Leche: 72 horas

Vía intramuscular o subcutánea (dosis única diaria de 2 mg/kg, durante 3-5 días):

Carne: 6 días

Leche: 36 horas

Porcino (cerdas):

Vía intramuscular:

Carne: 4 días

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, fecha límite de utilización ...

Período de validez después de abierto el envase: 28 días

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No congelar.

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Laboratorios SYVA, S.A.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}