

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

БИО – СТИМ

BIO – STIM

Прах за прилагане във вода за пиене за прасета и птици

2. Състав

В 100 g се съдържат:

Активни вещества:

Chlortetracycline hydrochloride	5.5 g	
Vitamin A		50 000 IU
Vitamin D ₃		5 000 IU
Vitamin E		7 mg
Vitamin K		10 mg
Vitamin C		250 mg
Vitamin B ₁		6.5 mg
Vitamin B ₂		25 mg
Vitamin B ₆		10 mg
Vitamin B ₁₂		0.025 mg
Folic acid		1 mg
Pantothenic acid		50 mg
Nicotinic acid	130 mg	
Biotin	0.35 mg	

Помощно вещество:

Dextrose monohydrate

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Прасета и птици.

4. Показания за употреба

Лечение на стомашно-чревни, дихателни и други инфекции – паратиф, едемна болест, бронхопневмонии при прасетата; пулороза, холера, ХРБ и кокцидиоза при птиците.

5. Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към антибиотици от тетрациклиновата група.

Да не се използва при животни с чревни обструкции.

6. Специални предупреждения

Специални предупреждения:

Употребата на ветеринарния лекарствен продукт трябва внимателно да се обмисли, когато тестът за чувствителност е показал резистентност към тетрациклини, тъй като неговата ефективност може да бъде намалена.

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Употребата на ветеринарния лекарствен продукт трябва да се основава на идентифициране и тестване за чувствителност на целвите бактерии. Ако това не е възможно, терапията трябва да се основава на епидемиологична информация и чувствителността на целевите бактерии на ниво ферма или на местно/регионално ниво. Употребата на ветеринарния лекарствен продукт трябва да бъде в съответствие с официалните, национални и регионални антимикробни политики.

По време на лечението се дава само и единствено медикаментозната вода за пиене.

Медикаментозната вода трябва да се подменя на 12 часа.

При промяна в количеството на консумираната вода за пиене, концентрацията на продукта в медикаментозната вода трябва да се коригира.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

При прилагане на продукта да не се яде, пие или пуши.

Да се избягва инхалирането на праха.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от гумени ръкавици и противопрахова маска, съответстваща на Европейски Стандарт EN149, FFP2, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт.

След работа е необходимо обилно измиване с вода и сапун. Да се пази от попадане в очите. При попадане върху очите същите се измиват обилно с умерена струя вода.

Бременност:

Тетрациклините минават през плацентарната бариера и могат да окажат въздействие върху формирането на костите при плода.

Не се препоръчва прилагането по време на бременността.

Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:

Антибиотиците от тетрациклиновата група взаимодействат с антиациди, калциеви производни (като калциев карбонат), производни на желязото, магнезий-съдържащи лаксативи, натриев бикарбонат, фенобарбитал, пеницилин, оксацилин, цефалоспорицини, ампицилин, карбеницилин, еритромицин, оксацилин.

Едновременното приложение с калциеви, желязни, алуминиеви, манганови и други метални йони, затруднява резорбцията на хлортетрациклина.

Предозиране:

При многократно предозиране не са наблюдавани реакции при видовете животни за които е предназначен продукта. Предозирането на тетрациклините при животните е твърде рядко явление, тъй като дори и много високите дози са добре поносими.

Основни несъвместимости:

Едновременното приложение с продукти, които съдържат калциеви, желязни, алуминиеви, манганови и други метални йони, затрудняват резорбцията на хлортетрациклина (образуват се неразтворими комплекси).

7. Неблагоприятни реакции

Не са наблюдавани.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарния лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване: <https://kvmp.bfsa.bg/phv>.

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

Перорално приложение във вода за пиене, като единствена вода за пиене.

Прасета: 10-20 mg/kg телесна маса дневно в продължение на 5-7 последователни дни.

Птици: 20-30 mg/kg телесна маса дневно в продължение на 5-7 последователни дни.

Съдържанието на една опаковка от 100 g добавена към 40 L вода за пиене осигуряват концентрация на хлортетрациклин от 138 ppm във водата.

Три пълни чаени лъжички от 5 ml (600 mg хлортетрациклин) добавени към 5 L вода за пиене осигуряват концентрация на хлортетрациклин от 120 ppm във водата.

Медикаментозната вода трябва да се подменя на 12 часа.

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

Моля, вижте т.8.

10. Карентни срокове

Прасета: месо и вътрешни органи - 10 дни.

Птици: месо и вътрешни органи - 1 ден.

Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат или са предназначени да произвеждат яйца за консумация от хора.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: 2 месеца.

Срок на годност след разтваряне, съгласно указанията: 12 часа.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

0022-2667

Пликове от трипластово фолио – полиетилен, полипропилен с алуминиево фолио от 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g и 1.0 kg.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

15. Дата на последната редакция на текста

03/2024

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия и производител, отговарящ за освобождаването на партиди и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

“Фарма Вет” ООД
гр. Шумен, ул. “Отец Паисий” № 40
Република България
тел./факс: 054/801-215
E-mail: farma_vet@abv.bg

X

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР