

BIJSLUITER

1. Naam van het diergeneesmiddel

Primun Gumboro W2512 Lyofilisaat voor gebruik in drinkwater voor kippen.

2. Samenstelling

Per dosis :

Werkzaam bestanddeel

Levend verzwakt aviaire infectieuze bursitis (IBD)-virus, intermediair plus IBDV_2512-stam, 1,5 - 3,0 log₁₀ EID₅₀*

* EID₅₀ (embryo infectieuze dosis 50%)

Lyofilisaat voor gebruik in drinkwater.

Uiterlijk: Gevriesdroogde pellet met wit-beige kleur.

3. Doeldiersoort(en)

Kip (vleeskuikens)

4. Indicaties voor gebruik

Voor de actieve immunisatie van vleeskuikens met maternale antilichamen (maternally derived antibodies, MDA) om sterfte, klinische ziekte en acute laesies in de bursa van Fabricius geassocieerd met infectie veroorzaakt door aviaire infectieuze bursitisvirussen te verminderen.

Aanvang van de immuniteit: 14 dagen na vaccinatie.

Duur van de immuniteit: 28 dagen.

5. Contra-indicaties

Geen.

6. Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen:

Vaccineer alleen gezonde dieren vaccineren.

Het vaccin bevat een 'intermediair-plus'-virusstam waarvan bekend is dat deze immuunsuppressie en schade aan de bursa veroorzaakt. Daarom is het vaccin alleen geïndiceerd voor immunisatie van kippen met MDA's en die blootgesteld worden aan zeer virulente IBD-virusstammen. De ideale vaccinatiedag wordt berekend volgens de formule van Deventer (zie rubriek 8), met 450 als de ELISA-doorbraaktiterwaarde (dit is de MDA-titer die geen negatieve invloed heeft op de door het vaccin geïnduceerde bescherming).

Speciale voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik bij de doeldiersoort(en):

Kippen jonger dan 7 dagen mogen niet worden gevaccineerd.

Het vaccin bevat een 'intermediair-plus'-virusstam, die aanzienlijke immuunsuppressie en schade aan de bursa veroorzaakt wanneer geïnoculeerd in kippen zonder MDA.

Het vaccin mag alleen worden gebruikt nadat is aangetoond dat zeer virulente IBDV-stammen epidemiologisch relevant zijn in het gebied waar het bedrijf is gevestigd.

Gevaccineerde kippen kunnen het vaccinvirus gedurende ten minste 21 dagen uitscheiden. Er moeten passende veterinaire en houderijmaatregelen worden genomen om verspreiding van de vaccinstam naar andere vogels te voorkomen. Met name moet verspreiding worden voorkomen naar kippen zonder MDA's, leghennen, kippen die bijna aan de leg zijn en jonge kippen jonger dan 7 dagen.

Vaccineer tegelijkertijd alle vatbare kippen op het terrein.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

- Persoonlijke beschermingsmiddelen bestaande uit handschoenen en laarzen moeten worden gedragen bij het hanteren van het diergeneesmiddel.
- De vaccinstam kan minimaal 21 dagen in de omgeving worden aangetroffen. Bij de verzorging van gevaccineerde kuikens moet het personeel de algemene beginselen van hygiëne in acht nemen (omkleden, handschoenen dragen, laarzen reinigen en desinfecteren) en uiterst voorzichtig omgaan met de mest en het strooisel van recent gevaccineerde kuikens om verspreiding van de vaccinstam te voorkomen.
- Handen en materiaal wassen en desinfecteren na vaccinatie.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van het milieu:

Niet van toepassing.

Legvogels:

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens de leg.

Niet gebruiken bij vogels in de legperiode en binnen 4 weken vóór het begin van de legperiode.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in combinatie met enig ander diergeneesmiddel. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na enig ander diergeneesmiddel dient per geval een beslissing te worden genomen.

Overdosering:

Uit onderzoeken met een tienvoudige overdosering van PRIMUN GUMBORO W2512, toegediend aan 7 dagen oude vleeskuikens zonder MDA's (SPF-kippen), werden geen andere ongewenste effecten gevonden dan de bijwerkingen genoemd in rubriek 7 gevonden.

Onverenigbaarheden:

Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel.

7. Bijwerkingen

Zeer vaak (>1 dier/10 behandelde dieren)
Lymfopenie

Een opmerkelijke voorbijgaande lymfocytdepletie kan zeer vaak worden waargenomen bij kippen op dag 7 na vaccinatie. De repopulatie van de follikels in de bursa van Fabricius door lymfocyten begint na dag 7 na vaccinatie. Op dag 28 na vaccinatie zijn bij sommige kippen nog slechts milde laesies over. Deze laesies hebben geen immuunsuppressief effect tot gevolg.

Het melden van bijwerkingen is belangrijk. Op deze manier kan de veiligheid van een diergeneesmiddel voortdurend worden bewaakt. Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het geneesmiddel niet heeft gewerkt, neem dan in eerste instantie contact op met uw dierenarts. U kunt bijwerkingen ook melden aan de houder van de vergunning voor het in de handel brengen of de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen met behulp van de contactgegevens aan het einde van deze bijsluiter of via uw nationale meldsysteem: adversedrugsreactions_vet@fagg-afmps.be

8. Dosering voor elke diersoort, toedieningswijzen en toedieningswegen

Dosering:

Vanaf de leeftijd van 7 dagen dient één dosis per dier via het drinkwater te worden toegediend.

Vaccinatieprogramma:

De bepaling van de vaccinatiedatum is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de status van maternale antilichamen (MDA's), het type vogel, de infectiedruk, de huisvesting en managementomstandigheden.

In het geval van aanwezigheid van een zeer virulente IBD-veldstam, is het veldvirus buitengewoon virulent, wat het gebruik vereist van een vaccin dat relatief hoge gehalten MDA's kan doorbreken. Het vaccin kan een ELISA-antilichaamgehalte van 450 ELISA-eenheden doorbreken.

Homogene gehalten MDA's vergemakkelijken een nauwkeurigere timing van de vaccinatie.

Om de leeftijd te voorspellen, wanneer de hoeveelheid MDA voldoende is gedaald om effectieve vaccinatie mogelijk te maken, moeten monsters van minimaal 18-20 kuikens serologisch worden getest en moet de 'formule van Deventer' worden gebruikt om de optimale vaccinatieleeftijd te berekenen.

Optimale vaccinatieleeftijd =

$\{(\log_2 \text{ IBV antilichamen ELISA-titer van kip \%} - \log_2 \text{ doorbraaktiter van het vaccin}) \times t_{\frac{1}{2}}\} + \text{leeftijd bij monstername} + \text{correctie 0-4}$

kip % = ELISA-titer van de vogel, die een bepaald percentage van het koppel vertegenwoordigt.

$t_{\frac{1}{2}}$ = halfwaardetijd (ELISA) van de antilichamen in het type kippen dat wordt bemonsterd

Leeftijd bij monstername = leeftijd van de kippen bij monstername

Correctie 0-4 = extra dagen wanneer de monstername werd gedaan op een leeftijd van 0 tot 4 dagen)

Volgens deze formule wordt de optimale vaccinatieleeftijd als volgt berekend:

1. Bepaal welk percentage van het koppel wordt vertegenwoordigd en verwijder de hoogste titers die worden uitgesloten (bijv. 75% van het koppel; verwijder de hoogste 25% van de titers).
2. Bereken de gemiddelde ELISA-antilichaamtiter van deze kippen.
3. Berekening van de optimale vaccinatieleeftijd.

Kippen moeten bij vaccinatie minimaal 7 dagen oud zijn. De optimale leeftijd voor vaccinatie kan worden berekend aan de hand van het MDA-gehalte van de eendagskuikens (formule van Deventer), maar ligt meestal tussen de 12-21 dagen.

Toedieningsweg: Toediening in het drinkwater.

9. Aanwijzingen voor een juiste toediening

Bereiding en toediening van het vaccin:

Verwijder de aluminium verzegeling van de injectieflacon met vaccin. Om de vaccinpellet te suspenderen, mag de rubberen stop alleen worden verwijderd terwijl de injectieflacon is ondergedompeld in een plastic maatbeker die de vereiste hoeveelheid schoon, koud water bevat. Vul de injectieflacon voor de helft met water, plaats de stop terug en schud om eventueel achtergebleven vaccin te suspenderen. Het vaccinconcentraat moet dan aan het drinkstelsel worden toegevoegd.

Belangrijke aandachtspunten voor een succesvolle vaccinatie:

1. Het vereiste aantal vaccindoses moet worden toegevoegd aan de juiste hoeveelheid drinkwater, berekend op basis van eerdere waterconsumptie van de te immuniseren kippen.
2. Splits geen grote injectieflacons om meer dan één pluimveestal of drinkstelsel te vaccineren, aangezien dit kan leiden tot doseringsfouten
3. Zorg ervoor dat alle leidingbuizen, slangen, troggen, drinkbakken enz. grondig schoon zijn en vrij van sporen van ontsmettingsmiddelen, reinigingsmiddelen enz. Gebruik alleen koud, vers, niet-gechloreerd water dat vrij is van ontsmettingsmiddelen, reinigingsmiddelen en metaalionen om de levensvatbaarheid van het vaccin te garanderen.
4. Drinkwater moet 2-4 uur vóór vaccinatie van de kippen worden afgesloten, afhankelijk van de leeftijd van de kippen en de temperatuur van de stal.
5. Om de virusactiviteit te behouden, wordt geadviseerd om 2-4 g magere melkpoeder per liter berekend drinkwater of magere melk (20 – 40 ml/liter water) op te lossen voordat het vaccin wordt gesuspenderd.

6. Het wordt aanbevolen om het aantal drinkplekken tijdens de vaccinatie te verhogen. Om ervoor te zorgen dat alle kippen toegang hebben tot het gevaccineerde water, wordt geadviseerd om kippen rond de drinkplekken in de eerste paar minuten van de vaccinatie te verplaatsen. De vogels kunnen pas van vers drinkwater worden voorzien nadat het gemedicineerde water volledig is verbruikt.
7. Het vaccin moet onmiddellijk na reconstitutie aan de kippen worden toegediend.
8. De toediening van het vaccin moet binnen 2 uur na reconstitutie worden afgerond
9. Bescherm het gereconstitueerde vaccin tegen direct zonlicht.

10. Wachttijden

Nul dagen.

11. Bijzondere bewaarvoorschriften

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Gekoeld bewaren en transporteren (2 °C – 8 °C). Niet in de vriezer bewaren.

Beschermen tegen licht.

Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

Houdbaarheid na reconstitutie volgens instructies: 2 uur.

12. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.

Maak gebruik van terugnameregelingen voor de verwijdering van ongebruikte diergeneesmiddelen of uit het gebruik van dergelijke middelen voortvloeiend afvalmateriaal in overeenstemming met de lokale voorschriften en nationale inzamelingssystemen die van toepassing zijn. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.

Vraag aan uw dierenarts of apotheker wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen.

13. Indeling van het diergeneesmiddel

Diergeneesmiddel op voorschrift.

14. Nummers van de vergunningen voor het in de handel brengen en verpakkingsgrootten

BE-V594426

Verpakkingsgrootten:

Kartonnen doos met 1 injectieflacon van 1.000 doses

Kartonnen doos met 1 injectieflacon van 5.000 doses

Kartonnen doos met 10 injectieflacons van 1.000 doses

Kartonnen doos met 10 injectieflacons van 5.000 doses

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

15. Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien

Juli 2023

Gedetailleerde informatie over dit diergeneesmiddel is beschikbaar in de diergeneesmiddelenbank van de Unie (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Contactgegevens

Voor alle informatie over dit diergeneesmiddel kunt u contact opnemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen die hieronder staat aangegeven.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

LABORATORIOS CALIER, S.A.

c/o. Barcelonés 26, Pla del Ramassà

08520 Les Franqueses del Vallès, BARCELONA, SPANJE

Tel: +34 (0) 938495133

Lokale vertegenwoordigers en contactgegevens voor het melden van vermoedelijke bijwerkingen:

VETPHARM

Noordkaai 24

8870 Izegem,

België

Tel: +32 (0)51 30 31 00

E-Mail: qa@vetpharm.be

17. Overige informatie