

A. ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**BOÎTE EN CARTON**

flacon de 20 ml, 50 ml, 100 ml et 250 ml

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

MARBOCYL 100 mg/ml solution injectable pour bovins et porcs.

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Marbofloxacine 100 mg/ml

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

20 ml

50 ml

100 ml

250 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins, porcs.

5. INDICATIONS

Non requis.

6. VOIES D'ADMINISTRATION

i.m, s.c, ou i.v.

Chez les bovins :

Traitements des infections respiratoires causées par des souches sensibles de *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* : la dose recommandée est de 8 mg par kg de poids vif, soit 2 ml pour 25 kg de poids vif en une seule injection intramusculaire.

Traitements des infections respiratoires causées par des souches sensibles de *Mycoplasma bovis* : la dose recommandée est de 2 mg par kg de poids vif, soit 1 ml pour 50 kg de poids vif en une injection quotidienne par voie sous-cutanée ou intramusculaire, pendant 3 à 5 jours consécutifs. La première injection peut être faite par voie intraveineuse.

Traitements des mammites aiguës : 2 mg par kg de poids vif, soit 1 ml pour 50 kg de poids vif en une injection quotidienne par voie sous-cutanée ou intramusculaire pendant 3 jours consécutifs. La première injection peut également être administrée par voie intraveineuse.

Chez les porcs :

Traitements du syndrome Postpartum Dysgalactia – PDS – (Métrite-Mammite-Agalactie) : 2 mg par kg de poids vif, soit 1 ml pour 50 kg de poids vif en une injection quotidienne par voie intramusculaire, pendant 3 jours.

Traitement chez le porc en engrangement des infections des voies respiratoires : 2 mg par kg de poids vif, soit 1 ml pour 50 kg de poids vif en une injection quotidienne par voie intramusculaire, pendant 3 à 5 jours consécutifs.

Lire la notice avant utilisation.

7. TEMPS D'ATTENTE

Bovins :

Indication	Respiratoire	Mammite
Dose	2 m/kg pendant 3 à 5 jours (i.v, i.m, s.c)	8 mg/kg en une seule injection (i.m)
Viande et abats	6 jours	3 jours
Lait	36 heures	72 heures

Porcs :

Viande et abats : 4 jours.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Avant ouverture du flacon, ce médicament vétérinaire ne nécessite pas de conditions particulières de conservation.

Après première ouverture du flacon : ne pas conserver à une température supérieure à 25 °C.
Protéger de la lumière.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

VETOQUINOL NV/SA

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V198511

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

Etiquettes des flacons de 100 ml et 250 ml

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

MARBOCYL 100 mg/ml, solution injectable pour bovins et porcs.

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Marbofloxacine..... 100 mg

3. ESPÈCES CIBLES

Bovins, porcs.

4. VOIES D'ADMINISTRATION

i.m, s.c, ou i.v.

Chez les bovins :

Traitement des infections respiratoires causées par des souches sensibles de *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* : la dose recommandée est de 8 mg par kg de poids vif, soit 2 ml pour 25 kg de poids vif en une seule injection intramusculaire.

Traitement des infections respiratoires causées par des souches sensibles de *Mycoplasma bovis* : la dose recommandée est de 2 mg par kg de poids vif, soit 1 ml pour 50 kg de poids vif en une injection quotidienne par voie sous-cutanée ou intramusculaire, pendant 3 à 5 jours consécutifs. La première injection peut être faite par voie intraveineuse.

Traitement des mammites aiguës : 2 mg par kg de poids vif, soit 1 ml pour 50 kg de poids vif en une injection quotidienne par voie sous-cutanée ou intramusculaire pendant 3 jours consécutifs. La première injection peut également être administrée par voie intraveineuse.

Chez les porcs :

Traitement du syndrome Postpartum Dysgalactia – PDS – (Métrite-Mammite-Agalactie) : 2 mg par kg de poids vif, soit 1 ml pour 50 kg de poids vif en une injection quotidienne par voie intramusculaire, pendant 3 jours.

Traitement chez le porc en engrangement des infections des voies respiratoires : 2 mg par kg de poids vif, soit 1 ml pour 50 kg de poids vif en une injection quotidienne par voie intramusculaire, pendant 3 à 5 jours consécutifs.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Bovins :

Indication	Respiratoire	Mammites
Dose	2 m/kg pendant 3 à 5 jours (i.v./i.m/s.c)	8 mg/kg en une seule injection (i.m)
Viande et abats	6 jours	3 jours
Lait	36 heures	72 heures
		36 heures

Porcs :

Viande et abats : 4 jours

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours.

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Avant ouverture du flacon, ce médicament vétérinaire ne nécessite pas de conditions particulières de conservation.

Après première ouverture du flacon : ne pas conserver à une température supérieure à 25 °C.
Protéger de la lumière.**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

VETOQUINOL NV/SA

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE

Etiquettes des flacons de 20 ml et 50 ml

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

MARBOCYL 100 mg/ml, solution injectable pour bovins et porcs.

20 ml

50 ml

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Marbofloxacin..... 100 mg/ml

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours.