

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

{Umkarton mit 1 Durchstechflasche zu 6, 20, 50, 100 ml und Umkarton mit 10 Durchstechflaschen zu 6 ml}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Acegon 50 Mikrogramm/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Gonadorelin 50 µg/ml
(entspricht 52,5 µg Gonadorelin Acetat)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

6 ml
20 ml
50 ml
100 ml
10 x 6 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kuh und Färse)

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:
Essbare Gewebe: Null Tage
Milch: Null Stunden

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.
Nach Anbrechen verwendbar bis _____

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Laboratorios SYVA S.A.

Mitvertreiber:

Zoetis Österreich GmbH {logo}

14. ZULASSUNGNUMMERN

Z.Nr.: 835285

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

{50-ml/100-ml-Durchstechflaschen}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Acegon 50 Mikrogramm/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)Gonadorelin 50 µg/ml
(entspricht 52,5 µg Gonadorelin Acetat)**3. ZIELTIERART(EN)**

Rind (Kuh und Färse)

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: Null Tage

Milch: Null Stunden

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis _____

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Laboratorios SYVA S.A.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

{6 ml/20 ml}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Acegon

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Gonadorelin 50 µg/ml
(entspricht 52,5 µg Gonadorelin Acetat)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.
Nach Anbrechen verwendbar bis _____