

PŘÍBALOVÁ INFORMACE
POLYEQUAN injekční suspenze
Sérum proti ochromě hřibat

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

POLYEQUAN injekční suspenze

Sérum proti ochromě hřibat

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení – 100 ml:

Immunoserum anti Escheria coli	min. titr 20
Immunoserum anti Salmonella abortus equi	min. titr 40
Immunoserum anti Actinobacillus equinum nativum	min. titr 32
Immunoserum anti Streptococcus equi	RP $\geq$ 1

Fenol.

4. INDIKACE

K pasivní imunizaci hřibat při ohrožení chovu nebo při onemocnění vyvolaném zárodky *E. coli*, *Salmonella abortus equi*, *Streptococcus equi*, *Actinobacillus equinum nativum*.

5. KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování:

Preventivně hřibata do 1 týdne stáří	25 ml
hřibata starší	50 ml

Léčebně dávky dvojnásobné, polovina s.c., polovina i.v., v případě potřeby lze opakovat.

Aplikace subkutánně nebo intravenózně.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před upotřebením nutno obsah lékovky protřepat.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Neuplatňuje se.

Březost a laktace:

Přípravek nemá vliv na průběh gravidity a laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:

Vyšší dávky než doporučené nemají lepší léčebný nebo preventivní efekt. Vyšší objem přípravku aplikovaný na jedno místo může poškodit okolní tkáň a způsobit sekundární reakce.

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2022

15. DALŠÍ INFORMACE

Imunologické vlastnosti

Protilátky obsažené v koňském séru vytvoří imunitu u zvířat po období 10 – 14 dnů. Důležitá je přitom dynamika resorpce a využitelnosti protilátek při různých způsobech aplikace.

Intravenózně podané protilátky jsou bezprostředně obsaženy v krevním séru a jejich využitelnost se počítá na 90%.

Subkutánně podané sérum proti ochromě hříbat infekcím je vstřebáno jen pozvolna, ale využitelnost globulinů je pouze 10 %.

Balení: 50ml, 100 ml.

Doba použitelnosti: 2 roky.

Použitelnost po prvním otevření: 10 hodin.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.