

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Engemycin 100 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje 100 mg oksitetraciklina (v obliki oksitetraciklinijevega klorida)

3. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

250 ml

500 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči, konji, ovce, psi in mačke

5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

Govedo, konji in ovce: (počasi) i.v. ali i.m.

Prašiči: i.m.

Psi: i.m. ali s.c.

Mačke: s.c.

7. KARENCA

Karenca:

Govedo: Meso in organi: zdravljenje z majhnimi odmerki: 24 dni.
zdravljenje z velikimi odmerki: 16 dni.

Mleko: 3 dni (6 molž)

Ovce: Meso in organi: 12 dni.

Mleko: 3 dni (6 molž).

Prašiči: Meso in organi: 7 dni.

Ni dovoljena uporaba pri konjih, ki so namenjeni za prehrano ljudi.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zaščitite pred svetlobo.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Intervet International B.V.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0109/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Viala

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Engemycin 100 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje 100 mg oksitettraciklina (v obliki oksitettraciklinijevega klorida)

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči, konji, ovce, psi in mačke.

4. POTI UPORABE

Govedo, konji in ovce: (počasi) i.v. ali i.m.

Prašiči: i.m.

Psi: i.m. ali s.c.

Mačke: s.c.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Govedo: Meso in organi: zdravljenje z majhnimi odmerki: 24 dni.
zdravljenje z velikimi odmerki: 16 dni.

Mleko: 3 dni (6 molž)

Ovce: Meso in organi: 12 dni.

Mleko: 3 dni (6 molž).

Prašiči: Meso in organi: 7 dni.

Ni dovoljena uporaba pri konjih, ki so namenjeni za prehrano ljudi.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zaščitite pred svetlobo.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Intervet International B.V.

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}