

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Pyralgivet, 500 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła, świń i psów
Metamizol sodowy

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Metamizol sodowy 500 mg/ml

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1x250 ml
1x100 ml
1x50 ml
1x20 ml

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Koń, bydło, świnia, pies.

6. WSKAZANIA LECZNICZE

Objawowa terapia stanów bólowych, w tym kolek pochodzenia nerkowego, jelitowego i wątrobowego, bólów pooperacyjnych oraz nowotworowych. Leczenie schorzeń przebiegających z gorączką (m.in. zespół MMA u macior, kliniczne *mastitis*, grypa u świń). Ponadto jako środek wspomagający w stanach zapalnych układu mięśniowo - szkieletowego (ścięgien, pochewek ścięgowych, mięśni i stawów).

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Produkt należy podawać powoli, domięśniowo lub dożylnie, 1 - 2 razy dziennie w dawkach:

Psy: 10-50 mg/kg m.c. (1-5 ml)

Konie, bydło: 10-50 mg/kg m.c. (10-50 ml)

Żrebięta, cielęta: 10-50 mg/kg m.c. (3 -10 ml)

Świnie: 10 - 50 mg/kg m.c. (3 - 15 ml).

W razie potrzeby dopuszczalne jest stosowanie produktu co 8 godzin.

8. OKRES(-Y) KARENCJI

Tkanki jadalne 12 dni.

Mleko 4 dni.

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Produkt powinien być podawany w powolnych iniekcjach.

Nie stosować u zwierząt ze stwierdzoną nadwrażliwością na jakikolwiek składnik produktu.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności:

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

Nie zamrażać.

Chronić przed światłem.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Odpady należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt.

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o.

ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin, Polska

tel.: 81 445 23 00, fax: 81 445 23 20, e-mail: vet-agro@vet-agro.pl

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1636/06

17. NUMER SERII

Nr serii:

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Butelka 100 ml, 250 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Pyralgivet, 500 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła, świń i psów
Metamizol sodowy

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Metamizol sodowy 500 mg/ml

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

250 ml

100 ml

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Koń, bydło, świnia, pies.

6. WSKAZANIA LECZNICZE

Objawowa terapia stanów bólowych, w tym kolek pochodzenia nerkowego, jelitowego i wątrobowego, bólów pooperacyjnych oraz nowotworowych. Leczenie schorzeń przebiegających z gorączką (m.in. zespół MMA u macior, kliniczne *mastitis*, grypa u świń). Ponadto jako środek wspomagający w stanach zapalnych układu mięśniowo - szkieletowego (ścięgien, pochewek ścięgnowych, mięśni i stawów).

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Produkt należy podawać powoli, domięśniowo lub dożylnie, 1 - 2 razy dziennie w dawkach:

Psy: 10-50 mg/kg m.c. (1-5 ml)

Konie, bydło: 10-50 mg/kg m.c. (10-50 ml)

Żrebięta, cielęta: 10-50 mg/kg m.c. (3 -10 ml)

Świnie: 10 - 50 mg/kg m.c. (3 - 15 ml).

W razie potrzeby dopuszczalne jest stosowanie produktu co 8 godzin.

8. OKRES(-Y) KARENCJI

Tkanki jadalne 12 dni.

Mleko 4 dni.

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Produkt powinien być podawany w powolnych iniekcjach.

Nie stosować u zwierząt ze stwierdzoną nadwrażliwością na jakikolwiek składnik produktu.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności:

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

Nie zamrażać.

Chronić przed światłem.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE
--

Odpady należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY
--

Wyłącznie dla zwierząt.

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o.

ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin, Polska

tel.: 81 445 23 00, fax: 81 445 23 20, e-mail: vet-agro@vet-agro.pl

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

1636/06

17. NUMER SERII

Nr serii:

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICII**

Butelka 20 ml, 50 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Pyralgivet, 500 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła, świń i psów
Metamizol sodowy

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

Metamizol sodowy 500 mg/ml

**3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
DAWEK**

20 ml

50 ml

4. DROGA (-I) PODANIA

Produkt należy podawać powoli, domięśniowo lub dożylnie.

5. OKRES(-Y) KARENCJI

Tkanki jadalne 12 dni.
Mleko 4 dni.

6. NUMER SERII

Nr serii:

7. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności:
Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

8. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt.

Dodatkowe informacje znajdujące się na opakowaniu:

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VET-AGRO Sp. z o.o.
ul. Gliniana 32, 20-616 Lublin, Polska
tel. 81 4452300, fax 81 4452320, e-mail: vet-agro@vet-agro.pl