

## ЛИСТОВКА:

Спорил – маз за говеда  
Sporyl – Ointment for cattle

### **1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ**

Притежател на лиценза за употреба и производител, отговорен за освобождаване на партидата:  
VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Austria

### **2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ**

Спорил – маз за говеда  
Sporyl – Ointment for cattle

### **3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ**

100 g съдържат:

#### **Активни субстанции:**

Карамфилово масло, съдържащо

Eugenol 2.0 g

Cetrimide 1.2 g

#### **Експципенти:**

Vaselineum flavum

Cetyl stearyl alcohol

### **4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ**

За лечение на трихофитози при говедата. Спорилът притежава силно фунгицидно действие, дължащо се на съдържащия се еугенол, основна съставка на карамфиловото масло и дезинфекционно действие, дължащо се на цетримида.

Спорил не причинява дразнене на кожата, добре прониква през нейния повърхностен слой, унищожава дерматофитите и подпомага бързото оздравяване на инфектираната кожа.

### **5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от експципентите.

### **6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ**

Не са известни.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

### **7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП**

Говеда.

### **8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ**

След почистване на засегнатите области по кожата да се втрива старателно ежедневно до оздравяване.

След няколко дни се формират корусти. Те трябва да се отстранят с дървена шпатула преди следващо приложение.

## **9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

Да не се прилага в очите на говедата.

Собственикът на животно трябва да приложи необходимите мерки за предпазване от разпространение на трихофитозата.

Спорил може да се използва по време на бременност и лактация.

Да се внимава продуктът да не попада в очите, да се мият ръцете след употреба.

## **10. КАРЕНТЕН СРОК**

Нула дни.

## **11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА**

Да се пази далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да не се съхранява при температури над 25 °С.

Да се пази първичната опаковка плътно затворена.

Срок на годност на крайния ветеринарномедицинския продукт: 3 години.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета.

## **12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Няма.

## **13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

## **14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА**

05/2023

## **15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

Номер на лиценза за употреба: 0022-2209-11.03.2014

Полипропиленова цилиндрична кутия от 100 g с капак на винт.

За друга информация относно този продукт се свържете с представителя ни за България:

Рихтер Фарма ЕООД, 1360 София, ул. Обелско шосе № 7, тел. 9279966

**Д-Р АНТОНИО РАДОЕВ**

*ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР*