

ANEKS III
OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko zawierające fiolkę 100 ml lub 500 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Multimin roztwór do wstrzykiwań dla bydła

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Cynk: 60 mg (co odpowiada 74,68 mg cynku tlenku)

Mangan: 10 mg (co odpowiada 20,92 mg manganu węglanu)

Miedź: 15 mg (co odpowiada 26,09 mg miedzi węglanu)

Selen: 5 mg (co odpowiada 10,95 mg sodu seleninu)

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

100 ml

500 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT



5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Wyłącznie do podania podskórnego. Nie podawać domięśniowo.

Dawkowanie:

Bydło – do 1 roku: 1 ml na 50 kg

Bydło – w wieku 1-2 lat: 1 ml na 75 kg

Bydło – powyżej 2 lat: 1 ml na 100 kg

Maksymalna objętość podawana w jedno miejsce: 7 ml.

7. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Tkanki jadalne: 28 dni.

Mleko: zero godzin.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni. Zużyć do...

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”
--

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Warburton Technology Limited

Lokalny przedstawiciel: Virbac

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

Nr pozwolenia: 3099/21

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Fiolka 100 ml i 500 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Multimin roztwór do wstrzykiwań dla bydła

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Cynk: 60 mg (co odpowiada 74,68 mg cynku tlenku)

Mangan: 10 mg (co odpowiada 20,92 mg manganu węglanu)

Miedź: 15 mg (co odpowiada 26,09 mg miedzi węglanu)

Selen: 5 mg (co odpowiada 10,95 mg sodu seleninu)

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT



4. DROGI PODANIA

Wyłącznie do podania podskórnego. Nie podawać domięśniowo.

Dawkowanie:

Bydło – do 1 roku: 1 ml na 50 kg

Bydło – w wieku 1-2 lat: 1 ml na 75 kg

Bydło – powyżej 2 lat: 1 ml na 100 kg

Maksymalna objętość podawana w jedno miejsce: 7 ml.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Tkanki jadalne: 28 dni.

Mleko: zero godzin.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni. Zużyć do...

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Warburton Technology Limited

9. NUMER SERII

Lot {numer}