

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CANIQUEL PLUS OCHUCENÉ tablety

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Loxavet pharma GmbH
Max-Planck-Strasse 11
D-85716 Unterschleissheim
Německo

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

CYMEDICA spol. s r.o.
Pod Nádražím 308/24
26801 Hořovice
Česká republika

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CANIQUEL PLUS OCHUCENÉ tablety

Praziquantelum
Fenbendazolum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek obsahuje v 1 tabletě:

Léčivé látky:

Praziquantelum 50 mg
Fenbendazolum 500 mg

Téměř bílé až šedavé tablety s křížem na jedné straně

4. INDIKACE

Přípravek CANIQUEL PLUS OCHUCENÉ tbl. je určen jako anthelmintikum proti endoparazitům psů a koček, jak plochých, tak obličných červů.

Jde zejména o *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubaeformis*, *Trichuris vulpis*, *Phisaloptera* spp., *Aelurostrongylus* spp., *Angiostrongylus* spp., *Filaroides* spp., *Capillaria* spp., *Strongyloides stercoralis*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipilidium caninum*, *Taenia* spp., *Multiceps multiceps*, *Mesocystoides* spp., *Diphyllobothrium* spp.

5. KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi, kočky.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTY A ZPŮSOB PODÁNÍ

Přípravek CANIQUANTEL PLUS tablety OCHUCENÉ se aplikuje psům a kočkám perorálně: tableta se podává přímo do tlamy, v krmivu nebo rozdrčená v potravě. Není nutné hladovění nebo dietní opatření.

Obecná dávka: 5 mg praziquantelu a 50 mg fenbendazolu na 1 kg ž.hm. (tj. 1 tableta / 10 kg ž.hm.)

Doporučené dávkování přípravku CANIQUANTEL PLUS tbl. OCHUCENÉ

	Hmotnost (kg)	Dávka (tablety)
Kočky	do 2	$\frac{1}{4}$
	2 – 4	$\frac{1}{2}$
	nad 4	$\frac{3}{4}$
Štěňata a malá plemena psů	do 2	$\frac{1}{4}$
	2 – 5	$\frac{1}{2}$
	5 - 10	1
Střední plemena psů	10 – 15	1 $\frac{1}{2}$
	15 – 25	2
	25 - 30	3
Velká plemena psů	30 – 40	4
	40 - 50	5

Zpravidla se léčba provádí jednorázově. V případě masivní invaze je možné léčbu opakovat ve dvou následujících dnech.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

- Štěňata a koťata se odčervují od 2 týdnů věku a léčbu opakujeme každé dva týdny až do dosažení 12ti týdnů věku. Od věku 12 týdnů každé 3 měsíce stejně jako dospělí jedinci.
- Odčervení *Toxocara canis* gravidních fen provádíme 2 – 3 týdny před porodem a po porodu stejně jako u štěňat každé dva týdny.
- Odčervení *T. cati* provádíme u gravidních a kojících koček současně s koťaty.
- Nově koupená zvířata doporučujeme odčervit bezprostředně po uvedení do nového prostředí.

Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným podáním léku.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v suchu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém, opakovaném použití anthelmintik ze stejné skupiny.

Případné předávkování přípravku může navodit přechodnou nevolnost, zvracení a diareu.

Tyto nežádoucí účinky vymizí velmi rychle bez léčebného zákroku. Psi snášejí trojnásobnou dávku, kočky jsou poněkud více citlivé.

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2024

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení:

6 tablet: 2 blistry po 3 tabletách vloženy do papírové krabičky

10 tablet: 1 blister po 10 tabletách vložen do papírové krabičky

12 tablet: 1 blister po 12 tabletách vložen do papírové krabičky

120 tablet: 12 blisterů po 10 tabletách nebo 10 blisterů po 12 tabletách vloženy do papírové krabičky

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.