

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА –  
КОМБИНИРАН ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА**

Херметически, алуминиев спрей флакон съдържащ 200 ml

**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

NEO CAF SPRAY/CAF SPRAY

спрей за кожа, суспензия за говеда, овце и свине

**2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА**

Всеки ml съдържа:

Активно вещество:

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Оxytetracycline hydrochloride     | 25,00 mg |
| (еквивалентно на oxytetracycline) | 23,15 mg |

Помощни вещества:

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Patent blue V (E131) като оцветител | 1,25 mg |
|-------------------------------------|---------|

**3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА**

200 ml

**4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП**

Говеда, овце и свине:

**5. ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА**

**Показания за употреба**

За лечение на инфекции, причинени от или свързани с микроорганизми, чувствителни към окситетрациклин при говеда, овце и свине.

Копитни инфекции, причинени от: *Dichelobacter nodosus*, *Fusobacterium necroporum* и други *Fusobacterium* spp. и *Bacteroides* spp.

Подпомагане на лечението на повърхностни раневи инфекции (следоперативни или физически наранявания, например ухапване на опашката при прасета и кастрации на прасета, одрасквания и охлузвания).

**6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

**Противопоказания**

Да не се използва за третиране на папилите на млечната жлеза, за да се предотврати попадането на продукта в млякото.

Да не се използва при свръхчувствителност към окситетрациклин или към някои от помощните вещества.

## **7. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

### **Специални предупреждения**

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Употребата на продукта трябва да се основава на тестове за чувствителност на бактериите, изолирани от животното. Ако това не е възможно, лечението трябва да се основава на местната (регионална, на ниво ферма) епидемиологична информация за чувствителността на прицелните бактерии.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Да не се вдишва. Избягвайте контакт на очите и лигавиците с продукта.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от подходящи непропускливи ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт.

При случайно прилагане върху себе си, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

При случаен контакт с кожата измийте ръцете и другите замърсени кожни участъци с вода.

При случайно попадане в очите или лигавиците, измийте незабавно с обилно количество вода.

Дръжте флакона далеч от запалими източници.

Хора с установена свръхчувствителност към окситетрациклин трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

## **8. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ**

### **Неблагоприятни реакции**

Говеда, овце и свине:

Не са известни.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в този етикет или мислите, че ветеринарния лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт на този етикет или чрез Вашата национална система за съобщаване.

## **9. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, НАЧИН И МЕТОД НА ПРИЛАГАНЕ**

### **Дозировка за всеки вид животно, начин и метод на прилагане**

Само за локално приложение.

Раклатете добре флакона преди употреба. Засегнатият участък трябва да се почисти добре от некротични и чужди тъкани, ексудати и др. Напръскайте върху засегнатата зона за 1-2 секунди от разстояние 15-20 cm, докато се получи равномерно оцветяване. Повторете третирането на всеки 12 часа за 1 до 3 дни, в зависимост от възстановяването на засегнатия участък.

## **10. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА**

## **Съвет за правилното прилагане на продукта**

За постигане на добри резултати, засегнатият участък трябва да се почисти добре от некротични и чужди тъкани, ексудати и др. След третиране животното трябва да се остави в сухо помещение за 24 часа.

## **11. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ**

### **Карентни срокове**

Месо и вътрешни органи: нула дни.

Мляко: нула дни.

## **12. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**

### **Специални условия за съхранение**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C. Да се пази от пряка слънчева светлина и източници на топлина.

Да не се използва този ветеринарен лекарствен продукт след изтичане срока на годност, посочен върху флакона.

## **13. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ**

### **Специални предпазни мерки при унищожаване**

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

## **14. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ**

### **Класификация на ветеринарните лекарствени продукти**

Да се отпуска само по лекарско предписание.

## **15. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗМЕРИ ОПАКОВКИ**

0022-2007

### **Размери опаковки**

Един флакон, съдържащ 200 ml от продукта.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

#### 16. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ЕТИКЕТА

Дата на последната редакция на етикета

08/2024

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

#### 17. ДАННИ ЗА ВРЪЗКА

Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия:

Intervet International B.V.

Wim de Koerverstraat 35

5831 AN BOXMEER

The Netherlands

Производител, отговарящ за освобождаването на партии:

Intervet Productions S.r.l.

Via Nettunense, Km 20 000, 04011 Aprilia (LT)

Italy

Местни представители и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

**Република България**

Intervet International B.V.

Тел: + 359 28193749

#### 18. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

#### 19. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

|                            |
|----------------------------|
| <b>20. СРОК НА ГОДНОСТ</b> |
|----------------------------|

Годен до: {мм/гггг}

|                           |
|---------------------------|
| <b>21. ПАРТИДЕН НОМЕР</b> |
|---------------------------|

Партида {номер}



Recoverable Signature

X

---

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ  
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП  
Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV