

## **B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

**ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:  
HIPRAPOX**

**1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παρασκευαστής υπεύθυνος για την αποδέσμευση των παρτίδων:  
LABORATORIOS HIPRA S.A.  
Avda. la Selva 135  
Amer (Girona)  
ΙΣΠΑΝΙΑ

**2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

HIPRAPOX

**3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ**

Σύνθεση ανά δόση του εμβολίου:

**Δραστικό συστατικό:**

Ομόλογος ιός Fowl Pox των ορνίθων..... $\geq 10^4$  EID<sub>50</sub>

**4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)**

Πρόληψη της διφθεροεπιδωμίας.

**5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Αντενδείκνυται η χορήγηση σε όρνιθες κατά την περίοδο ωοπαραγωγής.

**6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Δεν έχουν παρατηρηθεί.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

## **7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ**

Όρνιθες, ινδόρνιθες.

## **8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

1 δόση/πτηνό (0,01 mL).

Το εμβόλιο χορηγείται τρυπώντας τα φτερά σε μια βελόνα, προσέχοντας να μην προκληθεί βλάβη στα αγγεία.

Στις ινδόρνιθες, το εμβόλιο πρέπει να χορηγείται με σκαριφισμό στο πόδι.

Μετά τον εμβολιασμό, στο σημείο της χορήγησης, πρέπει να αναπτυχθεί ένα μικρό οζίδιο. Σε περίπτωση μη εμφάνισής του, ο εμβολιασμός δεν είναι επιτυχής.

## **9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ**

Το εμβόλιο πρέπει να χρησιμοποιείται σε νεαρά πτηνά, σε καλά αναπτυσσόμενες όρνιθες ηλικίας 8-10 εβδομάδων, ή σε αυτές που χρειάζονται 4-8 εβδομάδες για την ωοτοκία. Δεν πρέπει να εμβολιάζονται όρνιθες κατά την περίοδο ωοπαραγωγής.

## **10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Μηδέν ημέρες.

## **11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Να φυλάσσεται και να μεταφέρεται σε ψυγείο (2°C - 8°C).

Να φυλάσσεται προστατευμένο από το φως.

## **12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)**

Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος ζώου:

Πριν από τον εμβολιασμό πρέπει να γίνεται έλεγχος των πτηνών για να επιβεβαιωθεί ότι δεν έχουν προσβληθεί από κοκκιδίωση, λοιμώδη κόρυζα ή νοσήματα του αναπνευστικού, ότι δεν έχουν μολυνθεί από εντερικά παράσιτα και ότι δεν έχουν ανεπάρκεια βιταμίνης Α.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:

Ιδιαίτερη προσοχή να μην χυθεί το προϊόν κατά την χορήγησή του. Η ανασύσταση του λυοφιλού εμβολίου πρέπει να γίνεται εκτός των θαλάμων. Τα φιαλίδια πρέπει να ανοίγονται αμέσως πριν από την χρήση, και να χρησιμοποιούνται μέσα σε 2 ώρες.

Ωοτοκία:

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι όρνιθες κατά την περίοδο ωοπαραγωγής να εμβολιάζονται.

## **13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ**

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας τον φαρμακοποιό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

**14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

<DD/MM/YYYY>

**15. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Συσκευασίες:

Ο διαλύτης (καθαρό νερό 30 ml) περιέχεται στην συσκευασία.

Συσκευασία 5 φιαλιδίων των 1.000 δόσεων

Συσκευασία 5 φιαλιδίων των 2.500 δόσεων

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:

HIPRA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Τηλ: 210 4978660