

B. PACKUNGSBEILAGE

GEBRAUCHSINFORMATION
UTERUS STÄBE 1 g intrauterine Tablette

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

V.M.D. n.v.
Hoge Mauw 900
B-2370 Arendonk.

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

UTERUS STÄBE 1 g intrauterine Tablette.
Chlortetracyclin HCl

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

pro Tablette

Wirkstoff:

Chlortetracyclin HCl 1 g

Sonstige Bestandteile:

Laktose

Gummi arabicum

Stärke

Talk

Magnesiumstearat.

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Behandlung von akuten, postpartalen, uterinen Infektionen, die durch Chlortetracyclin-empfindliche Bakterien verursacht wurden.

5. GEGENANZEIGEN

- Nicht bei Tieren mit einer mäßigen bis ernsten Leber- und/oder Niereninsuffizienz anwenden.
- Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Tetracyclinen.

6. NEBENWIRKUNGEN

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kuh in der postpartalen Periode).

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Einmalig zwei intrauterine Tabletten so weit wie möglich in den Uterus einführen, nachdem die Vulva gründliche gewaschen und desinfiziert wurde. Die Stäbe sind unter Verwendung von viel Gleimittel mit einem langen Plastikhandschuh einzuführen. Nicht Verabreichen, wenn der Gebärmutterhals unzureichend geöffnet ist.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**10. WARTEZEIT(EN)**

Essbare Gewebe: 3 Tage.

Milch: 96 Stunden (8 Milchgaben).

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Aluminium-PVC Blisterpackung

Vor Licht schützen.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nach dem EXP nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aluminium-Polyethylen Folienstreif

Nicht über 25°C lagern.

Vor Licht schützen.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nach dem EXP nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

12. BESONDERE WARNHINWEISEBesondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Die unangebrachte Verabreichung des Produktes kann das Auftreten von Bakterien, die eine Resistenz gegen Chlortetracyclin zeigen, steigern und die Effizienz der Behandlung mit anderen Tetracyclinen wegen Kreuzresistenz vermindern.

Die Empfindlichkeit der Zielstämme für das Produkt kann zeitabhängig variieren. Ein Antibiogramm kann für die Behandlung erforderlich sein.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Gebrauchen Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie wissen, dass Sie allergisch dagegen sind, oder wenn Ihnen geraten wurde, nicht mit derartigen Produkten zu arbeiten.

Im Fall von unabsichtlichem Augen- oder Hautkontakt unmittelbar mit Wasser spülen.

Laktation:

Die Wartezeit, die für den Gebrauch der Milch von behandelten Tieren auferlegt ist, muss eingehalten werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Nicht zusammen mit bakteriziden Mitteln verabreichen, wie z.B. Penicilline, Cephalosporine, ...

Inkompatibilitäten:

Tetracycline sind mit bivalenten Ionen wie Ca^{2+} , Mg^{2+} , ... und mit trivalenten Ionen wie Al^{3+} nicht kompatibel.

Während der Behandlung mit Chlortetracyclinen dürfen keine Präparate, die diese Ionen enthalten, intra-uterin verabreicht werden.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Maßnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

August 2017

15. WEITERE ANGABEN

Für Tiere.

Ablieferung: Verschreibungspflichtig.

BE-V113425 (Aluminium-Polyethylen)

BE-V489244 (Aluminium-PVC)

Packung mit 50 oder 100 intrauterine Tabletten.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.