

A. Etiquetage

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

CARTON

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Combispot 67 mg/60.30 mg Solution pour spot-on pour petits chiens 2-10kg.
Fipronil/(S)-methoprene

2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Chaque pipette contient du Fipronil (67 mg), (S)-methoprene (60.30 mg).

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution spot on

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1 x 0.67 ml
2 x 0.67 ml
3 x 0.67 ml
4 x 0.67 ml
6 x 0.67 ml
8 x 0.67 ml
9 x 0.67 ml
10 x 0.67 ml
12 x 0.67 ml
15 x 0.67 ml
18 x 0.67 ml
20 x 0.67 ml
21 x 0.67 ml
24 x 0.67 ml
30 x 0.67 ml
60 x 0.67 ml
90 x 0.67 ml
150 x 0.67 ml
160 x 0.67 ml

5. ESPÈCES CIBLES

Chiens

6. INDICATION(S)

Traite les puces, les tiques et les poux broyeur. Lire la notice avant utilisation.

7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Spot-on

Lire la notice avant utilisation

8. TEMPS D'ATTENTE

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

Pour usage externe uniquement

10. DATE DE PÉREPTION

EXP (mois/année)

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver dans l'emballage d'origine afin de protéger de la lumière.

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Lire la notice avant utilisation

13. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRIINAIRE » ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ECHEANT

Usage vétérinaire

14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd, Co. Galway, Ireland.

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

BN {nombre}

USAGE VÉTÉRIINAIRE

Empêche la contamination de l'habitat par les oeufs et les larves de puces.
Empêche le développement des oeufs, larves, et pupes des puces, ce qui permet d'éviter la contamination de l'environnement du chien pendant la période de traitement

TEXTE PACKAGING PIPETTES CHIEN M COMBISPOT

A. Etiquetage

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

CARTON

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Combispot 134 mg/120.60 mg Solution pour spot-on pour chiens moyens 10-20kg.
Fipronil/(S)-methoprene

2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Chaque pipette contient du Fipronil (134 mg), (S)-methoprene (120.60 mg).

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution spot on

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1 x 1.34 ml
2 x 1.34 ml
3 x 1.34 ml
4 x 1.34 ml
6 x 1.34 ml
8 x 1.34 ml
9 x 1.34 ml
10 x 1.34 ml
12 x 1.34 ml
15 x 1.34 ml
18 x 1.34 ml
20 x 1.34 ml
21 x 1.34 ml
24 x 1.34 ml
30 x 1.34 ml
60 x 1.34 ml
90 x 1.34 ml
150 x 1.34 ml
160 x 1.34 ml

5. ESPÈCES CIBLES

Chiens

6. INDICATION(S)

Traite les puces, les tiques et les poux broyeurs. Lire la notice avant utilisation.

7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Spot-on

TEXTE PACKAGING PIPETTES CHIEN M COMBISPOT

Lire la notice avant utilisation

8. TEMPS D'ATTENTE

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

Pour usage externe uniquement

10. DATE DE PÉREMPTION

EXP (mois/année)

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver dans l'emballage d'origine afin de protéger de la lumière.

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Lire la notice avant utilisation

13. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE » ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT

Usage vétérinaire

14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd, Co. Galway, Ireland.

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

BN {nombre}

USAGE VÉTÉRINAIRE

Empêche la contamination de l'habitat par les oeufs et les larves de puces.
Empêche le développement des oeufs, larves, et pupes des puces, ce qui permet d'éviter la contamination de l'environnement du chien pendant la période de traitement

A. Etiquetage

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

CARTON

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Combispot 268 mg/241.2 mg Solution pour spot-on pour grands chiens 20-40kg.
Fipronil/(S)-methoprene

2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Chaque pipette contient du Fipronil (268 mg), (S)-methoprene (241.20 mg).

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution spot on

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1 x 2.68 ml
2 x 2.68 ml
3 x 2.68 ml
4 x 2.68 ml
6 x 2.68 ml
8 x 2.68 ml
9 x 2.68 ml
10 x 2.68 ml
12 x 2.68 ml
15 x 2.68 ml
18 x 2.68 ml
20 x 2.68 ml
21 x 2.68 ml
24 x 2.68 ml
30 x 2.68 ml
60 x 2.68 ml
90 x 2.68 ml
150 x 2.68 ml
160 x 2.68 ml

5. ESPÈCES CIBLES

Chiens

6. INDICATION(S)

Traite les puces, les tiques et les poux broyeur. Lire la notice avant utilisation.

7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Spot-on

Lire la notice avant utilisation

8. TEMPS D'ATTENTE

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

Pour usage externe uniquement

10. DATE DE PÉREPTION

EXP (mois/année)

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver dans l'emballage d'origine afin de protéger de la lumière.

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Lire la notice avant utilisation

13. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRIINAIRE » ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ECHEANT

Usage vétérinaire

14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd, Co. Galway, Ireland.

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

BN {nombre}

USAGE VÉTÉRIINAIRE

Empêche la contamination de l'habitat par les oeufs et les larves de puces.
Empêche le développement des oeufs, larves, et pupes des puces, ce qui permet d'éviter la contamination de l'environnement du chien pendant la période de traitement

A. Etiquetage

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

CARTON

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Combispot 402 mg/361.8 mg Solution pour spot-on pour tres grands chiens >40kg.
Fipronil/(S)-methoprene

2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Chaque pipette contient du Fipronil (402 mg), (S)-methoprene (361.8 mg).

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution spot on

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1 x 4.02 ml
2 x 4.02 ml
3 x 4.02 ml
4 x 4.02 ml
6 x 4.02 ml
8 x 4.02 ml
9 x 4.02 ml
10 x 4.02 ml
12 x 4.02 ml
15 x 4.02 ml
18 x 4.02 ml
20 x 4.02 ml
21 x 4.02 ml
24 x 4.02 ml
30 x 4.02 ml
60 x 4.02 ml
90 x 4.02 ml
150 x 4.02 ml
160 x 4.02 ml

5. ESPÈCES CIBLES

Chiens

6. INDICATION(S)

Traite les puces, les tiques et les poux broyeur. Lire la notice avant utilisation.

7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Spot-on

Lire la notice avant utilisation

8. TEMPS D'ATTENTE

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

Pour usage externe uniquement

10. DATE DE PÉREMPTION

EXP (mois/année)

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver dans l'emballage d'origine afin de protéger de la lumière.

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Lire la notice avant utilisation

13. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE » ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT

Usage vétérinaire

14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd, Co. Galway, Ireland.

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

BN {nombre}

USAGE VÉTÉRINAIRE

Empêche la contamination de l'habitat par les oeufs et les larves de puces.
Empêche le développement des oeufs, larves, et pupes des puces, ce qui permet d'éviter la contamination de l'environnement du chien pendant la période de traitement

TEXTE PACKAGING PIPETTES CHAT COMBISPOT

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES

SACHET

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Combispot 50 mg/60 mg Solution pour spot-on pour chats et furets.
Combispot 67 mg/60.30 mg Solution pour spot-on pour petits chiens 2-10kg.
Combispot 134 mg/120.60 mg Solution pour spot-on pour chiens moyens 10-20kg.
Combispot 268 mg/241.20 mg Solution pour spot-on pour grands chiens 20-40kg.
Combispot 402 mg/361.8 mg Solution pour spot-on pour tres grands chiens >40kg.
Fipronil/(S)-methoprene

2. QUANTITÉ DE(S) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Fipronil 50 mg (S)-methoprene 60 mg

Dans chaque pipette de 0.67 ml
Fipronil 67.00 mg (S)-methoprene 60.30 mg

Dans chaque pipette de 1.34 ml
Fipronil 134.00 mg (S)-methoprene 120.60 mg

Dans chaque pipette de 2.68 ml
Fipronil 268.00 mg (S)-methoprene 241.20 mg

Dans chaque pipette de 4.02 ml
Fipronil 402.00 mg (S)-methoprene 361.8 mg

3. CONTENU EN POIDS, EN VOLUME OU EN NOMBRE DE DOSES

0.5ml, 0.67ml, 1.34ml, 2.68ml, 4.02ml

4. VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Spot-on

5. TEMPS D'ATTENTE

6. NUMÉRO DU LOT

BN {nombre}

7. DATE DE PÉREMPTION

EXP (mois/année)

8. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE »

Usage vétérinaire

NOTICE

Combispot 67/60.30 mg SOLUTION POUR SPOT-ON POUR PETITS CHIENS 2-10KG.
Combispot 134/120.60 mg SOLUTION POUR SPOT-ON POUR CHIENS MOYENS 10-20KG.
Combispot 268/241.20 mg SOLUTION POUR SPOT-ON POUR GRANDS CHIENS 20-40KG.
Combispot 402/361.8 mg SOLUTION POUR SPOT-ON POUR TRES GRANDS CHIENS >40KG.

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
Loughrea,
Co. Galway.
Ireland.

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRIINAIRE

Combispot 67mg/60.3 mg Solution pour spot on pour petits chiens 2-10kg.
Combispot 134 mg/120.60 mg Solution pour spot-on pour chiens moyens 10-20kg.
Combispot 268 mg/241.20 mg Solution pour spot-on pour grands chiens 20-40kg.
Combispot 402mg/361.8 mg Solution pour spot on pour tres grands chiens >40kg.
Fipronil/(S)-methoprene

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Solution pour spot on. Solution Claire ambrée.

Chaque pipette de 0.67ml contient :

Substances actives :
Fipronil 67 mg
(S)-methoprene 60.3 mg

Excipients :
Butylhydroxyanisole (E320) 0.13 mg
Butylhydroxytoluene (E321) 0.07 mg

Chaque pipette de 1.34ml contient :

Substances actives :
Fipronil 134 mg
(S)-methoprene 120.60 mg

Excipients :
Butylhydroxyanisole (E320) 0.27 mg
Butylhydroxytoluene (E321) 0.13 mg

Chaque pipette de 2.68ml contient :

Substances actives :

Fipronil 268 mg
(S)-methoprene 241.20 mg

Excipients :

Butylhydroxyanisole (E320) 0.54 mg
Butylhydroxytoluene (E321) 0.27 mg

Chaque pipette de 4.02ml contient :

Substances actives :

Fipronil 402 mg
(S)-methoprene 361.80 mg

Excipients :

Butylhydroxyanisole (E320) 0.80 mg
Butylhydroxytoluene (E321) 0.40 mg

4. INDICATION(S)

Chez les chiens :

A utiliser contre les infestations de puces seules ou en association avec des tiques et /ou des poux broyeur :

- Traitement des infestations par les puces (*Ctenocephalides* spp.).

L'effet insecticide sur les puces adultes provenant de nouvelles infestations est visible pendant 8 semaines.

- Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs et des larves et pupes provenant des œufs pondus par les puces adultes pendant 8 semaines après l'application.

- Traitement des infestations par les tiques (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*). L'efficacité acaricide contre les tiques persiste pendant 4 semaines.

- Traitement des infestations par les poux broyeur (*Trichodectes canis*)

Le médicament peut être intégré dans un programme de traitement de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP).

5. CONTRE-INDICATIONS

En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chiots de moins de 8 semaines et/ou pesant moins de 2 kg.

Ne pas utiliser chez les animaux malades (par exemple : maladies systémiques, fièvre) ou convalescents.

Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent survenir. En l'absence d'étude, l'utilisation du produit n'est pas recommandée pour les espèces non cibles.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Chez les chiens :

Parmi les effets secondaires très rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (desquamation, perte de poils, démangeaisons, rougeurs localisés) ainsi que des démangeaisons ou une perte de poils généralisées ont été rapportées.

De la salivation excessive, des signes nerveux réversibles (augmentation de la sensibilité à la stimulation, abattement, autres signes nerveux) ou des vomissements ont également été observés après utilisation.

En cas de léchage, une brève période de salivation excessive peut être observée en raison principalement de la nature de l'excipient.

Ne pas surdoser.

Si vous remarquez des effets indésirables graves ou d'autres effets non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chiens

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Application cutanée.

Posologie :

Poids	Dose
2-10kg	1 pipette de Combispot 67mg/60.3mg
10-20kg	1 pipette de Combispot 134mg/120.60mg
20-40kg	1 pipette de Combispot 268mg/241.2mg
>40kg	1 pipette de Combispot 402mg/361.80mg

2-10kg : Une pipette de 0.67mL par chien de 2 à 10kg, correspondant à une dose minimale recommandée de 6.7 mg/kg de poids corporel pour le fipronil et de 6 mg/kg de poids corporel pour le (S)-méthoprène, en une application cutanée.

10-20kg : Une pipette de 1.34mL par chien de 10 à 20kg, correspondant à une dose minimale recommandée de 6.7 mg/kg de poids corporel pour le fipronil et de 6 mg/kg de poids corporel pour le (S)-méthoprène, en une application cutanée.

20-40kg : Une pipette de 2.68mL par chien de 20 à 40kg, correspondant à une dose minimale recommandée de 6.7 mg/kg de poids corporel pour le fipronil et de 6 mg/kg de poids corporel pour le (S)-méthoprène, en une application cutanée.

>40kg : Une pipette de 4.02mL par chien supérieur à 40kg, correspondant à une dose minimale recommandée de 6.7 mg/kg de poids corporel pour le fipronil et de 6 mg/kg de poids corporel pour le (S)-méthoprène, en une application cutanée.

En l'absence d'étude d'innocuité, l'intervalle de traitement minimum est de 4 semaines.

Mode d'administration au dos de l'étui.

Tenir la pipette droite. Tapoter la partie étroite de la pipette pour s'assurer que son contenu reste dans la partie large et casser l'embout d'un geste sec en direction du dos de la pipette. Ecarter les poils au niveau du dos de l'animal, à la base du cou entre les omoplates, jusqu'à ce que la peau soit visible. Placer l'embout de la pipette sur la peau et presser plusieurs fois afin de vider totalement le contenu de la pipette sur la peau en un point.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Jeter toutes les pipettes ouvertes

10. TEMPS D'ATTENTE

Non applicable

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption mentionnée sur la boîte et l'étiquette après {EXP}. La date d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.

Conserver dans l'emballage d'origine afin de protéger de la lumière.

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions d'emploi sur l'animal

Évitez le contact avec les yeux de l'animal.

Il est important de s'assurer que le produit est appliqué sur une zone où l'animal ne peut pas se lécher et de s'assurer que les animaux ne se lèchent pas après le traitement.

Précautions pour l'administrateur :

Ce produit peut provoquer une irritation des muqueuses, de la peau et des yeux. Par conséquent, le contact du produit avec la bouche, la peau et les yeux doit être évité. Les animaux ou les utilisateurs présentant une hypersensibilité connue aux insecticides ou à l'alcool doivent éviter tout contact avec le Combispot.

Éviter que le contenu n'entre en contact avec les doigts. Si cela se produit, lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau.

En cas d'exposition accidentelle avec les yeux, rincer avec soin à l'eau pure.

Se laver les mains après utilisation.

Les animaux traités ne doivent pas être manipulés avant que le site d'application soit

sec.

Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec les animaux traités jusqu'à ce que le site d'application soit sec.

Il est donc recommandé que les animaux ne soient pas traités pendant la journée, mais qu'ils soient traités en début de soirée, et que les animaux récemment traités ne soient pas autorisés à dormir avec les propriétaires, en particulier avec les enfants.

Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Gestation et Lactation :

Le produit peut être utilisé pendant la gestation et la lactation.

Interaction avec d'autres produits vétérinaires

Aucunes interactions connues

Conservation

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption mentionnée sur la boîte et l'étiquette après {EXP}. La date d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.

Conserver dans l'emballage d'origine afin de protéger de la lumière.

Surdosage (symptômes, procédures d'urgence, antidotes

Aucun effet indésirable n'a été mis en évidence dans des études de tolérance chez les chiens et chiots âgés de 8 semaines et pesant environ 2 kg traités une fois par mois à cinq fois la dose recommandée pendant six mois consécutifs.

Des démangeaisons peuvent survenir après le traitement.

Le surdosage provoquera une apparence collante des poils au site d'application.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tout médicament vétérinaire non utilisé ou déchet dérivé de ce médicament vétérinaire doit être éliminé conformément aux exigences locales.

Le fipronil et le (S) -méthoprène ne doivent pas contaminer les cours d'eau, car ils peuvent être dangereux pour les poissons et d'autres organismes aquatiques.

14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE

31/01/18

15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Boîte avec 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 30, 60, 90, 150 ou 160 pipettes dans des sachets individuels.

Toutes les présentations ne peuvent pas être commercialisées.

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

PharmaPets, Barq BV
Mannebeekstraat 5
8790 Waregem
Belgium
Tél: +32 (0)9 298 17 72
info@pharmapets.be