

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltkarton für 50 ml / 100 ml / 12 x 100 ml / 250 ml / 500 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Roxilin Depot 150 mg/ml Injektionssuspension für Tiere

2. WIRKSTOFF(E)

Ein ml enthält:

Amoxicillin als Trihydrat 150 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

100 ml

12 x 100 ml

250 ml

500 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein, Schaf, Hund, Katze.

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Rinder, Schafe und Schweine: Intramuskuläre Anwendung.

Hunden und Katzen: Subkutane Anwendung.

Vor Gebrauch gut schütteln.

Das Dosisvolumen entspricht 1 ml pro 10 kg Körpergewicht. Wenn das Dosisvolumen bei Rindern 15 ml sowie bei Schafen und Schweinen 4 ml überschreitet, sollte es auf zwei oder mehr Stellen aufgeteilt werden.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder:

Essbare Gewebe: 39 Tage

Milch: 4,5 Tage (108 Stunden)

Schweine:

Essbare Gewebe: 42 Tage

Schafe:

Essbare Gewebe: 29 Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Datum und Uhrzeit der ersten Entnahme sind auf dem Etikett der Durchstechflasche einzutragen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25° C lagern.

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z. Nr.: 8-00180

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

Durchstechflasche zu 50 ml / 100 ml / 250 ml / 500 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Roxilin Depot 150 mg/ml Injektionssuspension für Tiere

2. WIRKSTOFF(E)

Ein ml enthält:

Amoxicillin als Trihydrat 150 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein, Schaf, Hund, Katze

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Rinder, Schafe und Schweine: Intramuskuläre Anwendung.

Hunden und Katzen: Subkutane Anwendung.

Vor Gebrauch gut schütteln.

Das Dosisvolumen entspricht 1 ml pro 10 kg Körpergewicht. Wenn das Dosisvolumen bei Rindern 15 ml sowie bei Schafen und Schweinen 4 ml überschreitet, sollte es auf zwei oder mehr Stellen aufgeteilt werden.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder:

Essbare Gewebe: 39 Tage

Milch: 4,5 Tage (108 Stunden)

Schweine:

Essbare Gewebe: 42 Tage

Schafe:

Essbare Gewebe: 29 Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach Anbruch: 3 Tage bei Lagerung im Kühlschrank (2° - 8 °C).

Erste Entnahme am: um Uhr.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE
--

Nicht über 25° C lagern.

Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS
--

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

50 ml
100 ml
250 ml
500 ml