

**B. NOTICE**

**1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT****Titulaire d'enregistrement**

CEVA Santé Animale  
Avenue de la Métrologie 6  
1130 Bruxelles

**Fabricant responsable de la libération des lots**

Ceva Santé Animale  
Z.I. de Très-le-Bois  
B.P. 372  
22 603 Loudéac – Cedex  
France

**2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

VETRIMOXIN, 150 mg, comprimé

**3. LISTE (DE LA) (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)**

Amoxicilline (sous forme de trihydrate) 150 mg/ comprimé quadrisécable non enrobé

**4. INDICATION(S)**

Traitements des infections à germes sensibles à l'amoxicilline, à savoir:

- ♦ les infections respiratoires,
- ♦ les infections gastro-intestinales,
- ♦ les infections urogénitales,
- ♦ les infections cutanées.

**5. CONTRE-INDICATION(S)**

Ne pas administrer:

- aux chiens allergiques aux pénicillines
- aux lapins, cobayes, hamsters et gerbilles: dans ces espèces, les aminopénicillines sont responsables d'entérotoxémies.

**6. EFFETS INDÉSIRABLES**

De rares troubles digestifs ( vomissements, dyspepsies) peuvent être observés; dans tous les cas ces manifestations sont bénignes et transitoires, et ne nécessitent généralement pas l'arrêt du traitement.

Des réactions allergiques peuvent être observées.

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

**7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)**

Chiens

**8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION**

Administration orale.

10 mg d'amoxicilline par kg de poids vif, soit 1 comprimé par 15 kg de poids vif, 2 fois par jour pendant 5 jours.

## **9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE**

-

## **10. TEMPS D'ATTENTE**

-

## **11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Tenir hors de portée des enfants.

A température ambiante (15 - 25°C), dans son emballage d'origine.

Ne pas utiliser après la date d'expiration (EXP) inscrite sur l'emballage.

## **12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)**

### **Précautions particulières d'emploi chez les animaux**

La sélection de résistance microbienne se développe avec certains micro-organismes pathogènes; le produit doit être utilisé sur des germes sensibles.

### **Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux**

Ne pas entrer en contact avec le produit lors d'hypersensibilité connue ou s'il est conseillé de ne pas travailler avec ces substances.

Utiliser ce produit avec précaution pour éviter les expositions et suivre les précautions recommandées.

En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement avec de l'eau.

Si des symptômes tels qu'irritations de la peau apparaissent après exposition, consulter un médecin et lui montrer ces avertissements.

Des gonflements de la face, des lèvres et des yeux ou des difficultés à respirer sont les symptômes les plus sérieux qui demandent une aide médicale rapide.

Se laver les mains après utilisation.

### **Utilisation en cas de gravité et de lactation**

L'amoxicilline n'est pas contre-indiquée en cas de gestation.

### **Interactions médicamenteuses et autres formes d'interaction**

Il est conseillé d'éviter d'administrer l'amoxicilline avec un bactériostatique, étant donné leur activité antagoniste.

### **Surdosage**

Dans ce cas, démarrer un traitement symptomatique.

**13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Les mesures de précaution adéquates doivent être prises pour que le produit ne se retrouve pas dans l'environnement.

**14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVEÉE**

18-10-2007

**15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

**Présentations**

Boîte contenant 1 blister de 10 comprimés.

Boîte contenant 50 blisters de 10 comprimés.

BE-V158663