

**I PIELIKUMS**  
**VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS**

## 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Stronghold Plus 15 mg/2,5 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem ≤ 2,5 kg

Stronghold Plus 30 mg/5 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem > 2,5-5 kg

Stronghold Plus 60 mg/10 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem > 5-10 kg

## 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra devas vienība (pipete) nodrošina:

### Aktīvās vielas:

| Stronghold Plus šķīdums pilināšanai uz ādas | Vienības deva (ml) | selamektīns (mg) | sarolaners (mg) |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Kaķiem ≤ 2,5 kg                             | 0,25               | 15               | 2,5             |
| Kaķiem > 2,5-5 kg                           | 0,5                | 30               | 5               |
| Kaķiem > 5-10 kg                            | 1                  | 60               | 10              |

### Palīgvielas:

| Palīgvielu un citu sastāvdaļu kvalitatīvais sastāvs | Kvantitatīvais sastāvs, ja šī informācija ir būtiska veterināro zāļu pareizai ievadīšanai |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butilhidroksitoluols                                | 0,2 mg/ml                                                                                 |
| Dipropilēnglikola monometilēteris                   |                                                                                           |
| Izopropilspirts                                     |                                                                                           |

Dzidrs, bezkrāsas līdz dzeltens šķīdums pilināšanai uz ādas.

## 3. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

### 3.1. Mērķsugas

Kaķi.

### 3.2. Lietošanas indikācijas katrai mērķsugai

Kaķiem, kuri slimo vai pakļauti saslimšanas riskam ar jaukta tipa parazitāru invāziju ar ērcēm un blusām, utīm, ērcītēm, kuņģa-zarnu trakta nematodēm vai sirdstārpiem. Šīs veterinārās zāles paredzētas lietošanai tikai tādos gadījumos, kad vienlaicīgi nepieciešama ārstēšana pret ērcēm un vismaz vienu vai vairākiem citiem mērķa parazītiem.

### Ektoparazīti:

- Blusu (*Ctenocephalides* spp.) izraisītas invāzijas ārstēšanai un profilaksei. Šīm veterinārajām zālēm piemīt tūlītēja un pastāvīga blusas nogalinoša iedarbība 5 nedēļu garumā. Šīs veterinārās zāles nogalina pieaugušas blusas, pirms tās izdēj olas, 5 nedēļu garumā. Savas ovicīdās un larvicīdās darbības dēļ šīs veterinārās zāles palīdz apkārtējā vidē kontrolēt esošo blusu invāziju dzīvniekiem pieejamās vietās.
- Šīs veterinārās zāles var tikt lietotas kā daļa no ārstēšanas stratēģijas blusu alerģiskā dermatīta gadījumā.
- Ērcu invāzijas ārstēšanai. Šīm veterinārajām zālēm piemīt tūlītēja un pastāvīga akaricīda iedarbība pret *Ixodes ricinus* un *Ixodes hexagonus* 5 nedēļu garumā un pret *Dermacentor reticulatus* un *Rhipicephalus sanguineus* 4 nedēļu garumā.
- Ausu ērcīšu (*Otodectes cynotis*) invāzijas ārstēšanai.

- Grauzējutu (*Felicola subrostratus*) invāzijas ārstēšanai.
- Notoedrozes (*Notoedres cati*) ārstēšanai.

Ērcēm jāpiesūcas pie dzīvnieka un jāuzsāk baroties, lai tās tiktu pakļautas sarolanera iedarbībai.

#### **Nematodes:**

- Pieaugušu apaļtārpu (*Toxocara cati*) un pieaugušu zarnu āķtārpu (*Ancylostoma tubaeforme*) invāzijas ārstēšanai.
- *Dirofilaria immitis* ierosinātas sirdstārpu slimības profilaksei, lietojot reizi mēnesī.

### **3.3. Kontrindikācijas**

Nelietot kaķiem, kuri vienlaikus slimo ar kādu citu slimību vai, ja tie ir novājināti un ar nepietiekamu ķermeņa svaru (attiecīgi lielumam un vecumam).

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret jebkuru no palīgvielām.

### **3.4. Īpaši brīdinājumi**

Saskaņā ar labu veterinārmedicīnisko praksi valstīs, kur ir sastopams slimības vektors, pirms šo veterināro zāļu lietošanas profilaktiskiem mērķiem, ir ieteicams visus dzīvniekus no 6 mēnešu vecuma testēt uz pieaugušu sirdstārpu invāzijas esamību.

Šīs veterinārās zāles nav efektīvas pret pieaugušu *D. immitis*. Lietošana dzīvniekiem ar pieaugušu sirdstārpu infekciju nerada drošuma problēmas.

Lai gan tā nav rutīnas prakse, atsevišķos gadījumos atbildīgajam veterinārārstam jāizvērtē iespējamais ieguvums no periodiskas pārbaudes uz sirdstārpu infekciju.

Ērcēm jābūt baroties no dzīvnieka, lai tās tiktu pakļautas sarolanera iedarbībai, tāpēc nevar izslēgt saslimšanas iespējamību ar ērcu pārnēsātajām infekcijām.

### **3.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā**

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērksugām:

Šīs veterinārās zāles paredzēts lietot kaķiem no 8 nedēļu vecuma un ar ķermeņa svaru vismaz 1,25 kg.

Šīs veterinārās zāles lietot tikai uz ādas. Nelietot iekšķīgi vai parenterāli.

Nelietot, kad dzīvnieka apmatojums ir mitrs.

Ausu ērcīšu invāzijas ārstēšanai nelietot tieši auss kanālā.

Ir svarīgi lietot devu atbilstoši norādījumiem, lai atturētu dzīvnieku no zāļu nolaizīšanas un norīšanas. Ja notiek ievērojama zāļu norīšana, novērota pārejoša gastroenteroloģiska iedarbība, tāda kā pastiprināta siekalošanās, vemšana, mīksta fekālija vai samazināta barības uzņemšana, kas parasti pāriet bez ārstēšanas.

Ārstētos dzīvniekus sargāt no uguns un citiem uzliesmojošiem avotiem vismaz 30 minūtes vai kamēr dzīvnieka apmatojums šķīduma aplikācijas vietā ir izžuvis.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Šīs veterinārās zāles ir bīstamas, ja tās tiek norītas. Uzglabāt veterinārās zāles oriģinālajā iepakojumā, lai bērniem nebūtu tiešas piekļuves šīm veterinārām zālēm. Izlietotās pipetes uzreiz izmest. Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Šīs veterinārās zāles var izraisīt acu kairinājumu. Izvairīties no zāļu saskares ar acīm, tostarp nepieskarties acīm ar rokām. Izvairīties no tiešas saskares ar ārstētajiem dzīvniekiem, līdz aplikācijas vieta ir sausa. Pēc rīkošanās ar šīm zālēm mazgāt rokas, un pēc zāļu saskares ar ādu to nekavējoties mazgāt ar ziepēm un ūdeni. Ja notikusi nejauša nokļūšana acīs, nekavējoties skalot acis ar ūdeni, meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Bērniem nav atļauts spēlēties ar ārstētajiem kaķiem 4 stundas pēc šo zāļu lietošanas. Ieteicams apstrādāt dzīvniekus vakarā. Ārstēšanas dienā neļaut ārstētajiem dzīvniekiem gulēt pie saviem saimniekiem, jo īpaši pie bērniem.

Cilvēkiem ar jutīgu ādu vai zināmu alerģiju pret šāda tipa veterinārajām zālēm ieteicams ar tām rīkoties piesardzīgi.

Šīs veterinārās zāles ir viegli uzliesmojošas. Uzglabāt atstatu no karstuma, dzirkstelēm un atvērtas liesmas vai citiem uzliesmošanas avotiem.

#### Īpaši piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:

Šīs veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo tas var būt bīstami zivīm un citiem ūdens organismiem.

### **3.6. Blakusparādības**

Kaķi:

|                                                                                          |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retāk<br>(1 līdz 10 dzīvniekiem/1 000 ārstētajiem dzīvniekiem):                          | Nieze lietošanas vietā <sup>1</sup> , alopecija lietošanas vietā <sup>2</sup><br>Eritēma <sup>2</sup><br>Siekalošanās <sup>2</sup> |
| Ļoti reti<br>(<1 dzīvniekam/10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, tostarp atsevišķi ziņojumi): | Konvulsijas <sup>3</sup> , ataksija <sup>3</sup><br>Vemšana <sup>3</sup> , diareja <sup>3</sup>                                    |

<sup>1</sup> viegla un pārejoša.

<sup>2</sup> viegla līdz vidēji smaga.

<sup>3</sup> lielākoties pārejoša.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ziņojumus vēlams nosūtīt ar veterinārārsta starpniecību vai nu tirdzniecības atļaujas turētājam vai tā vietējam pārstāvim vai valsts kompetentajai iestādei, izmantojot nacionālo ziņošanas sistēmu. Attiecīgo kontakta informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

### **3.7. Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā**

#### Grūsnība, laktācija un auglība:

Nav pierādīts šo veterināro zāļu drošums grūsnības un laktācijas laikā, kā arī vaislai paredzētiem dzīvniekiem. Tomēr selamektīns tiek uzskatīts par drošu vaislas, grūsniem vai laktējošiem kaķiem. Lai gan nav novērtēts sarolanera drošums vaislas, grūsniem vai laktējošiem kaķiem, laboratoriskajos pētījumos ar sarolaneru žurkām un truši nav pierādīta tā teratogēnā ietekme. Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

### **3.8. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi**

Klīniskajos lauka pētījumos netika novērota šo veterināro zāļu mijiedarbība ar ikdienas praksē lietojamajām veterinārajām zālēm.

### 3.9. Lietošanas veids un devas

Uzpilināšanai.

Veterinārās zāles lietot kā vienas devas vienreizēju lokālu aplikāciju saskaņā ar šo tabulu (atbilst minimālajam daudzumam 6 mg/kg selamektīna un 1 mg/kg sarolanera):

| Kaķa ķermeņa svars (kg) | Pipetes saturs (ml)          | Lietojamo pipešu stiprums un skaits |                             |                            |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                         |                              | 15 mg/2,5 mg (dzeltens uzgalis)     | 30 mg/5 mg (oranžs uzgalis) | 60 mg/10 mg (zaļš uzgalis) |
| ≤ 2,5                   | 0,25                         | 1                                   |                             |                            |
| > 2,5–5                 | 0,5                          |                                     | 1                           |                            |
| > 5–10                  | 1                            |                                     |                             | 1                          |
| > 10                    | Piemērota pipešu kombinācija |                                     |                             |                            |


#### Lietošanas veids

Uzklāt uz ādas pie kakla pamatnes, lāpstiņu priekšpusē. Izņemiet pipeti no aizsargājošā iepakojuma tieši pirms zāļu lietošanas.

Turot pipeti vertikāli, stingri nospiediet vāciņu, lai pārdurtu aplikatora aizdari, tad noņemiet vāciņu.

Pašķiriet apmatojumu uz kaķa kakla, plecu lāpstiņas priekšpusē, lai atsegta nelielu ādas laukumu. Pipetes galu pielieciet tieši pie dzīvnieka ādas, nemasējot.

Spēcīgi saspiediet pipeti 3-4 reizes, lai tās saturu iztukšotu vienā aplikācijas punktā. Izvairieties no zāļu saskares ar pirkstiem.



Aplikācijas vietā var parādīties pārejošs kosmētisks efekts, piemēram, matu savēlšanās vai sacelšanās, taukainums vai sausas, baltas nogulsnes, kas parasti izzūd 24 stundu laikā pēc zāļu lietošanas. Šīs pazīmes neietekmē ne šo veterināro zāļu drošumu, ne iedarbīgumu.

#### Ārstēšanas shēma

##### Blusas un ērces

Optimālai ērcu un blusu invāziju kontrolei lietot šīs veterinārās zāles ar mēneša intervālu un ārstēšanu turpināt visu blusu un/ vai ērcu sezonu, atkarībā no vietējās epidemioloģiskās situācijas.

Pēc šo veterināro zāļu lietošanas pieaugušas blusas uz dzīvnieka tiek nogalinātas 24 stundu laikā, netiek dētas dzīvotspējīgas olniņas un tiek nogalināti arī kāpuri, kas atrodas apkārtējā vidē. Tas aptur

blusu vairošanos un pārtrauc blusu attīstības ciklu, un apkārtējā vidē palīdz kontrolēt esošo blusu invāziju dzīvniekiem pieejamās vietās.

#### Sirdstārpu invāzijas profilaksei

Šīs veterinārās zāles var lietot visu gadu vai vismaz vienu mēnesi pirms dzīvnieka saskares ar odiem, atkārtojot ik pēc mēneša līdz odu sezonas beigām. Pēdējā deva ir jālieto vienu mēnesi pēc pēdējās saskares ar odiem. Ja deva tiek izlaista un ikmēneša intervāls ir pārsniegts, tad nekavējot veterināro zāļu lietošana un ikmēneša lietošanas shēmas atjaunošana samazinās pieaugušu sirdstārpu attīstības iespēju. Ja sirdstārpu slimības profilakses programmā šīs veterinārās zāles tiek aizvietotas ar citām sirdstārpu profilakses veterinārām zālēm, tad to pirmo devu lieto viena mēneša laikā pēc pēdējās iepriekšējo veterināro zāļu devas.

#### Apaltārpu un āktārpu invāziju ārstēšanai

Lietot vienreizēju šo veterināro zāļu devu. Atkārtotas devas un atkārtotas ārstēšanas nepieciešamību nosaka ārstējošais veterinārārsts.

#### Grauzējutu invāzijas ārstēšanai

Lietot vienreizēju šo veterināro zāļu devu.

#### Ausu ērcīšu ārstēšanai

Lietot vienreizēju šo veterināro zāļu devu. Turpmāko dzīvnieka klīnisko izmeklēšanu veikt pēc 30 dienām, jo dzīvniekam var būt nepieciešama atkārtota ārstēšana.

#### Notoedrozes ārstēšanai

Lietot vienreizēju šo veterināro zāļu devu.

### **3.10. Pārdozēšanas simptomi (ārkārtas procedūras un antidoti, ja piemērojami)**

Pēc pieckārtīgas maksimālās devas lietošanas kaķēniem no 8 nedēļu vecuma, veicot 8 secīgas ārstēšanas ar 28 dienu intervālu, netika novērotas nekādas klīniski nozīmīgas blakusparādības, izņemot vienu kaķi, kuram pēc pieckārtīgas maksimālās devas uzņemšanas, novēroja pārejošu jutību pret pieskārieniem, piloerekciju, paplašinātas acu zīlītes un vieglu trīcēšanu, kas pārgāja bez ārstēšanas.

Pēc nejaušas veterināro zāļu pilnas devas norīšanas var novērot pārejošu iedarbību uz kuņģa-zarnu traktu, piemēram, pastiprinātu siekalošanos, mīkstas fekālijas, vemšanu un samazinātu barības uzņemšanu, kas parasti pāriet bez ārstēšanas.

### **3.11. Īpaši lietošanas ierobežojumi un īpaši lietošanas nosacījumi, tostarp antimikrobiālo un pretparazītu veterināro zāļu lietošanas ierobežojumi, lai ierobežotu rezistences veidošanās risku**

Nav piemērojami.

### **3.12. Ierobežojumu periods**

Nav piemērojams.

## **4. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS**

### **4.1. ATĶvet kods: QP54AA55**

### **4.2. Farmakodinamiskās īpašības**

Selamektīns ir pussintētisks avermektīnu grupas savienojums. Selamektīns paralizē un/vai nogalina plašu spektru bezmugurkaulnieku parazītus, traucējot to hlorīda kanālu vadāmību, pārtraucot normālu

nervu impulsu pārņemšanu. Tas kavē nematožu nervu šūnu un posmkāju muskuļu šūnu elektrisko aktivitāti, izraisot to paralīzi un/vai nāvi.

Selamektīnam piemīt adulticīda, ovocīda un larvicīda iedarbība pret blusām. Tāpēc tas efektīvi pārtrauc blusu dzīves ciklu, nonāvējot blusu pieaugušās formas (uz dzīvnieka), novēršot olīņu izšķīlšanos (uz dzīvnieka un tā apkārtējā vidē) un nogalinot blusu kāpurus arī apkārtējā vidē. Ar selamektīnu apstrādātu mājdzīvnieku atkritumi nonāvē blusu olas un kāpurus, kas iepriekš nav bijuši pakļauti selamektīna iedarbībai, un tādējādi palīdz apkārtējā vidē kontrolēt esošo blusu invāziju dzīvniekiem pieejamās vietās. Selamektīns ir aktīvs pret pieaugušām blusām (*Ctenocephalides* spp.), kā arī pret ērcītēm (*Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*), utīm (*Felocola subrostratus*) un kuņģa-zarnu trakta nematodēm (*Toxocara cati*, *Ancylostoma tubaeforme*). Uzturēta arī aktivitāte pret sirdstārpu (*D. immitis*) kāpuriem.

Pret blusām iedarbības sākums ir 24 stundu laikā pēc veterināro zāļu lietošanas un ilgst 5 nedēļas.

Sarolaners ir akaricīds un insekticīds, pieder pie izoksazolīna grupas. Sarolanera galvenais darbības mērķis kukaiņos ir funkcionāli bloķēt ligandu vārtu hlorīdu kanālus (GABA receptorus un glutamāta receptorus). Sarolaners bloķē GABA un glutamāta vārtu hlorīda kanālus kukaiņu un ērcu centrālajā nervu sistēmā. Sarolaneram bloķējot šos receptorus, GABA un glutamāta vārtu jonu kanālos tiek traucēta hlorīda jonu uzņemšana, kas noved pie paaugstinātas nervu stimulācijas un mērķa parazīta nāves. Sarolaners uzrāda augstāku funkcionālo potenciālu bloķēt kukaiņu/ērcu receptorus salīdzinājumā ar zīdītāju receptoriem. Sarolaners nerada mijiedarbību ar zināmajām insekticīdām nikotīna saistīšanās vietām vai citiem GABA insekticīdiem, tādiem kā neonicotinoīdi, fiproles, milbemicīni, avermektīni un ciklodiēni. Sarolaners ir aktīvs pret pieaugušām blusām (*Ctenocephalides* spp.), kā arī dažām ērcu sugām, tādām kā *Dermacentor reticulatus*, *Ixodes hexagonus*, *Ixodes ricinus* un *Rhipicephalus sanguineus*.

Pret blusām (*I. ricinus*) iedarbības sākums ir 24 stundu laikā pēc šo veterināro zāļu lietošanas un ilgst vienu mēnesi.

### **4.3. Farmakokinētiskās īpašības**

Pēc Stronghold Plus lietošanas gan selamektīns, gan sarolaners labi uzsūcas ar bioloģiskās pieejamības vidējām vērtībām attiecīgi 40,5% un 57,9% un izplatās sistēmiski. Pēc šo veterināro zāļu lietošanas uz ādas kaķiem selamektīnam un sarolaneram ir zems klīrenss ar ilgu eliminācijas pusperiodu, attiecīgi 12,5 un 41,5 dienas.

Kaķiem galvenais selamektīna eliminācijas ceļš ir ar fekālijām un lielākā daļa ir sākotnējais savienojums. Selamektīna metabolītu identifikācija fekālijās norādīja, ka metaboliskais klīrenss veicina elimināciju. Galvenais sarolanera eliminācijas ceļš ir sākotnējās molekulas ekskrēcija caur žulti, ko veicina metaboliskais klīrenss.

## **5. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA**

### **5.1. Būtiska nesaderība**

Nav zināma.

### **5.2. Derīguma termiņš**

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 30 mēneši.

### **5.3. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi**

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Neizņemt pipeti no blistera, kamēr neesat gatavs to lietot.

#### **5.4. Tiešā iepakojuma veids un saturs**

Caurspīdīgas polipropilēna vienas devas pipetes, katra atsevišķi iesaiņota alumīnija un alumīnija/PVH blistera iepakojumā.

Stronghold Plus 15 mg/2,5 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem  $\leq 2,5$  kg: 0,25 ml pipetē.

Stronghold Plus 30 mg/5 mg šķīdums pilināšanai uz ādas  $> 2,5$ –5 kg: 0,5 ml pipetē.

Stronghold Plus 60 mg/10 mg šķīdums pilināšanai uz ādas  $> 5$ –10 kg: 1 ml pipetē.

Šīs veterinārās zāles ir pieejamas iepakojumā pa trīs pipetēm (visi pipešu izmēri) un pa sešām pipetēm (visi pipešu izmēri), kartona kastēs. Ne visi iepakojuma lielumi var tikt izplatīti.

#### **5.5. Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai**

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm.

### **6. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS**

Zoetis Belgium

### **7. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURS(-I)**

EU/2/16/204/001-006

### **8. PIRMĀS TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANAS DATUMS**

Pirmās tirdzniecības atļaujas piešķiršanas datums: 09/02/2017.

### **9. VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS**

{MM/GGGG}

### **10. VETERINĀRO ZĀĻU KLASIFIKĀCIJA**

Recepšu veterinārās zāles.

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).



## **II PIELIKUMS**

### **CITI TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS**

Nav.

**III PIELIKUMS**  
**MARKĒJUMS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**

## **A. MARKĒJUMS**

## UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

### KARTONA KASTE

#### 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Stronghold Plus 15 mg/2,5 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ≤ 2,5 kg  
Stronghold Plus 30 mg/5 mg šķīdums pilināšanai uz ādas > 2,5–5 kg  
Stronghold Plus 60 mg/10 mg šķīdums pilināšanai uz ādas > 5-10 kg

#### 2. INFORMĀCIJA PAR AKTĪVAJĀM VIELĀM

15 mg selamektīna/2,5 mg sarolanera/pipete  
30 mg selamektīna/5 mg sarolanera/pipete  
60 mg selamektīna/10 mg sarolanera/pipete

#### 3. IEPAKOJUMA LIELUMS

3 x 0,25 ml  
6 x 0,25 ml  
3 x 0,5 ml  
6 x 0,5 ml  
3 x 1 ml  
6 x 1 ml

#### 4. MĒRĶSUGAS

Kaķi.

#### 5. INDIKĀCIJAS

#### 6. LIETOŠANAS VEIDI

Uzpilināšanai.



#### 7. IEROBEŽOJUMU PERIODS

**8. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Exp. {mēnesis/gads}

**9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.  
Neizņemt pipeti no blistera, kamēr neesat gatavs to lietot.

**10. VĀRDI “PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU”**

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

**11. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”**

Lietošanai dzīvniekiem.

**12. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

**13. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS**

Zoetis Belgium

**14. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURI**

EU/2/16/204/001 (3 x 0,25 ml)  
EU/2/16/204/002 (6 x 0,25 ml)  
EU/2/16/204/003 (3 x 0,5 ml)  
EU/2/16/204/004 (6 x 0,5 ml)  
EU/2/16/204/005 (3 x 1 ml)  
EU/2/16/204/006 (6 x 1 ml)

**15. SĒRIJAS NUMURS**

Lot {numurs}

**UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA**

**BLISTERIS**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Stronghold Plus



**2. AKTĪVO VIELU KVANTITATĪVIE DATI**

≤ 2,5 kg

> 2,5–5 kg

> 5-10 kg

selamektīns/sarolaners

**3. SĒRIJAS NUMURS**

Lot {numurs}

**4. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Exp. {mm/gggg}

**UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA**

**PIPETE**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Stronghold Plus



**2. AKTĪVO VIELU KVANTITATĪVIE DATI**

≤ 2,5 kg

> 2,5–5 kg

> 5–10 kg

**3. SĒRIJAS NUMURS**

Lot {numurs}

**4. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Exp. {mm/gggg}

## **B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**



## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### 1. Veterināro zāļu nosaukums

Stronghold Plus 15 mg/2,5 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem ≤ 2,5 kg

Stronghold Plus 30 mg/5 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem > 2,5–5 kg

Stronghold Plus 60 mg/10 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem > 5-10 kg

### 2. Sastāvs

Katra devas vienība (pipete) nodrošina:

#### Aktīvās vielas:

| Stronghold Plus šķīdums<br>pilināšanai uz ādas | Vienības deva<br>(ml) | selamektīns (mg) | sarolaners (mg) |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Kaķiem ≤ 2,5 kg                                | 0,25                  | 15               | 2,5             |
| Kaķiem > 2,5–5 kg                              | 0,5                   | 30               | 5               |
| Kaķiem > 5-10 kg                               | 1                     | 60               | 10              |

#### Palīgvielas:

Butilhidroksitoluols 0,2 mg/ml.

Dzidrs, bezkrāsas līdz dzeltens šķīdums pilināšanai uz ādas.

### 3. Mērķsugas

Kaķi.

### 4. Lietošanas indikācijas

Kaķiem, kuri slimo vai pakļauti saslimšanas riskam ar jaukta tipa parazitāru invāziju ar ērcēm un blusām, utīm, ērcītēm, kuņģa-zarnu trakta nematodēm vai sirdstārpiem. Šīs veterinārās zāles paredzētas lietošanai tikai tādos gadījumos, kad vienlaicīgi nepieciešama ārstēšana pret ērcēm un vismaz vienu vai vairākiem citiem mērķa parazītiem.

#### Ektoparazīti

- Blusu (*Ctenocephalides* spp.) izraisītas invāzijas ārstēšanai un profilaksei. Šīm veterinārajām zālēm piemīt tūlītēja un pastāvīga blusas nogalinoša iedarbība 5 nedēļu garumā. Šīs veterinārās zāles nogalina pieaugušas blusas, pirms tās izdēj olas, 5 nedēļu garumā. Savas ovicīdās un larvicīdās darbības dēļ šīs veterinārās zāles palīdz apkārtējā vidē kontrolēt esošo blusu invāziju dzīvniekiem pieejamās vietās.
- Šīs veterinārās zāles var tikt lietotas kā daļa no ārstēšanas stratēģijas blusu alerģiskā dermatīta gadījumā.
- Ērcu invāzijas ārstēšanai. Šīm veterinārajām zālēm piemīt tūlītēja un pastāvīga akaricīda iedarbība pret *Ixodes ricinus* un *Ixodes hexagonus* 5 nedēļu garumā, un pret *Dermacentor reticulatus* un *Rhipicephalus sanguineus* 4 nedēļu garumā.
- Ausu ērcīšu (*Otodectes cynotis*) invāzijas ārstēšanai.
- Grauzējutu (*Felicola subrostratus*) invāzijas ārstēšanai.
- Notoedozes (*Notoedres cati*) ārstēšanai.

Ērcēm jāpiesūcas pie dzīvnieka un jāuzsāk baroties, lai tās tiktu pakļautas sarolanera iedarbībai.

## Nematodes

- Pieaugušu apaļtārpu (*Toxocara cati*) un pieaugušu zarnu āķtārpu (*Ancylostoma tubaeforme*) invāzijas ārstēšanai.
- *Dirofilaria immitis* ierosinātas sirdstārpu slimības profilaksei, lietojot reizi mēnesī.

## 5. Kontrindikācijas

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret jebkuru no palīgvielām.

Nelietot kaķiem, kuri vienlaikus slimo ar kādu citu slimību vai, ja tie ir novājināti un ar nepietiekamu ķermeņa svaru (attiecīgi lielumam un vecumam).

## 6. Īpaši brīdinājumi

### Īpaši brīdinājumi:

Saskaņā ar labu veterinārmedicīnisko praksi valstīs, kur ir sastopams slimības pārnēsātājs, pirms šo veterināro zāļu lietošanas profilaktiskiem mērķiem, ir ieteicams visus dzīvniekus no 6 mēnešu vecuma testēt uz pieaugušu sirdstārpu invāzijas esamību.

Šīs veterinārās zāles nav efektīvas pret pieaugušu *D. immitis*. Lietošana dzīvniekiem ar pieaugušu sirdstārpu infekciju nerada drošuma problēmas.

Lai gan tā nav rutīnas prakse, atsevišķos gadījumos atbildīgajam veterinārārstam jāizvērtē iespējamais ieguvums no periodiskas pārbaudes uz sirdstārpu infekciju.

Ērcēm jāsaik baroties no dzīvnieka, lai tās tiktu pakļautas sarolanera iedarbībai, tāpēc nevar izslēgt saslimšanas iespējamību ar ērcu pārnēsātajām infekcijām.

### Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērķsugām:

Šīs veterinārās zāles paredzēts lietot kaķiem no 8 nedēļu vecuma un ar ķermeņa svaru vismaz 1,25 kg.

Šīs veterinārās zāles lieto tikai uz ādas. Nelietot iekšķīgi vai parenterāli.

Nelietot, kad dzīvnieka apmatojums ir mitrs.

Ausu ērcīšu invāzijas ārstēšanai, nelietot tieši auss kanālā.

Ir svarīgi lietot devu atbilstoši norādījumiem, lai atturētu dzīvnieku no zāļu nolaizīšanas un norīšanas. Ja notiek ievērojama zāļu norīšana, novērota pārejoša gastroenteroloģiska iedarbība, tāda kā pastiprināta siekalošanās, vemšana, mīksta fekālija vai samazināta barības uzņemšana, kas parasti pāriet bez ārstēšanas.

Ārstētos dzīvniekus sargāt no uguns un citiem uzliesmojošiem avotiem vismaz 30 minūtes vai kamēr dzīvnieka apmatojums šķīduma aplikācijas vietā ir izžuvis.

### Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Šīs veterinārās zāles ir bīstamas, ja tās tiek norītas. Uzglabāt veterinārās zāles oriģinālajā iepakojumā, lai bērniem nebūtu tiešas piekļuves šīm veterinārām zālēm. Izlietotās pipetes uzreiz izmest. Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Šīs veterinārās zāles var izraisīt acu kairinājumu. Izvairieties no zāļu saskares ar acīm, tostarp nepieskarties acīm ar rokām. Izvairieties no tiešas saskares ar ārstētajiem dzīvniekiem, līdz aplikācijas vieta ir sausa. Pēc rīkošanās ar šīm zālēm mazgāt rokas, un pēc zāļu saskares ar ādu to nekavējoties mazgāt ar ziepēm un ūdeni. Ja notikusi nejauša nokļūšana acīs, nekavējoties skalot acis ar ūdeni, meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Cilvēkiem ar jutīgu ādu vai zināmu alerģiju pret šāda tipa veterinārajām zālēm ieteicams ar tām rīkoties piesardzīgi.

Bērniem nav atļauts spēlēties ar ārstētajiem kaķiem 4 stundas pēc šo zāļu lietošanas. Ieteicams apstrādāt dzīvniekus vakarā. Ārstēšanas dienā neļaut ārstētiem dzīvniekiem gulēt pie saviem saimniekiem, jo īpaši pie bērniem.

Šīs veterinārās zāles ir viegli uzliesmojošas. Uzglabāt atstatu no karstuma, dzirkstelēm un atvērtas liesmas vai citiem uzliesmošanas avotiem.

#### Īpaši piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:

Šīs veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo tas var būt bīstami zivīm un citiem ūdens organismiem.

#### Grūsnība, laktācija un auglība:

Nav pierādīts šo veterināro zāļu drošums grūsnības un laktācijas laikā, kā arī vaislai paredzētiem dzīvniekiem. Tomēr selamektīns tiek uzskatīts par drošu vaislas, grūsnēm vai laktējošiem kaķiem. Lai gan nav novērtēts sarolanera drošums vaislas, grūsnēm vai laktējošiem kaķiem, laboratoriskajos pētījumos ar sarolaneru žurkām un trušiņiem nav pierādīta tā teratogēnā ietekme. Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

#### Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Klīniskajos lauka pētījumos netika novērota šo veterināro zāļu mijiedarbība ar ikdienas praksē lietojamajām veterinārajām zālēm.

#### Pārdozēšana:

Pēc piekārtīgas maksimālās devas lietošanas kaķēniem no 8 nedēļu vecuma, veicot 8 secīgas ārstēšanas ar 28 dienu intervālu, netika novērotas nekādas klīniski nozīmīgas blakusparādības, izņemot vienu kaķi, kuram pēc piekārtīgas maksimālās devas uzņemšanas, novēroja pārejošu jutību pret pieskārieniem, piloerekciju, paplašinātas acu zīlītes un vieglu trīcēšanu, kas pārgāja bez ārstēšanas.

Pēc nejaušas veterināro zāļu pilnas devas norīšanas var novērot pārejošu iedarbību uz kuņģa-zarnu traktu, piemēram, pastiprinātu siekalošanos, mīksts fekālijas, vemšanu un samazinātu barības uzņemšanu, kas parasti pāriet bez ārstēšanas.

#### Būtiska nesaderība:

Nav zināma.

## **7. Blakusparādības**

Kaķi:

|                                                                                          |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retāk<br>(1 līdz 10 dzīvniekiem/1 000 ārstētajiem dzīvniekiem):                          | Nieze lietošanas vietā <sup>1</sup> , alopecija (matu izkrišana) lietošanas vietā <sup>2</sup><br>Eritēma (apsārtums) <sup>2</sup><br>Siekalošanās <sup>2</sup> |
| Ļoti reti<br>(<1 dzīvniekam/10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, tostarp atsevišķi ziņojumi): | Konvulsijas <sup>3</sup> , ataksija (koordinācijas traucējumi) <sup>3</sup><br>Vemšana <sup>3</sup> , diareja <sup>3</sup>                                      |

<sup>1</sup> viegla un pārejoša.

<sup>2</sup> viegla līdz vidēji smaga.

<sup>3</sup> lielākoties pārejoša.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka

zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu. Jūs varat ziņot par jebkurām blakusparādībām arī tirdzniecības atļaujas turētājam vai tirdzniecības atļaujas turētāja vietējam pārstāvim, izmantojot kontaktinformāciju šīs instrukcijas beigās vai nacionālo ziņošanas sistēmu: {informācija par nacionālo ziņošanas sistēmu}.

## 8. Deva katrai dzīvnieku sugai, lietošanas veids un metode

Uzpilināšanai.

Šīs veterinārās zāles lietot kā vienas devas vienreizēju lokālu aplikāciju saskaņā ar šo tabulu (atbilst minimālajam daudzumam 6 mg/kg selamektīna un 1 mg/kg sarolanera).

| Kaķa ķermeņa svars (kg) | Pipetes saturs (ml)          | Lietojamo pipešu stiprums un skaits |                             |                            |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                         |                              | 15 mg/2,5 mg (dzeltens uzgalis)     | 30 mg/5 mg (oranžs uzgalis) | 60 mg/10 mg (zaļš uzgalis) |
| ≤2,5                    | 0,25                         | 1                                   |                             |                            |
| >2,5–5                  | 0,5                          |                                     | 1                           |                            |
| >5-10                   | 1                            |                                     |                             | 1                          |
| >10                     | Piemērota pipešu kombinācija |                                     |                             |                            |

### Blusas un ērces

Optimālai ērcu un blusu invāziju kontrolei lietot šīs veterinārās zāles ar mēneša intervālu un ārstēšanu turpināt visu blusu un/ vai ērcu sezonu, atkarībā no vietējās epidemioloģiskās situācijas.

Pēc šo veterināro zāļu lietošanas pieaugušas blusas uz dzīvnieka tiek nogalinātas 24 stundu laikā, netiek dētas dzīvotspējīgas olaņas un tiek nogalināti arī kāpuri, kas atrodas apkārtējā vidē. Tas aptur blusu vairošanos un pārtrauc blusu attīstības ciklu, un apkārtējā vidē palīdz kontrolēt esošo blusu invāziju dzīvniekiem pieejamās vietās.

### Sirdstārpu invāzijas novēršanai

Šīs veterinārās zāles var lietot visu gadu vai vismaz vienu mēnesi pirms dzīvnieka saskares ar odiem, atkārtojot ik pēc mēneša līdz odu sezonas beigām. Pēdējā deva ir jālieto vienu mēnesi pēc pēdējās saskares ar odiem. Ja deva tiek izlaista un ikmēneša intervāls ir pārsniegts, tad nekavējot veterināro zāļu lietošana un ikmēneša lietošanas shēmas atjaunošana samazinās pieaugušo sirdstārpu attīstības iespēju. Ja sirdstārpu slimības novēršanas programmā šīs veterinārās zāles tiek aizvietotas ar citām sirdstārpu profilakses veterināram zālēm, tad to pirmo devu lieto viena mēneša laikā pēc pēdējās iepriekšējo veterināro zāļu devas.

### Apaltārpu un āķtārpu invāziju ārstēšanai

Lietot vienreizēju šo veterināro zāļu devu. Atkārtotas devas un atkārtotas ārstēšanas nepieciešamību nosaka ārstējošais veterinārārst.

### Grauzējutu invāzijas ārstēšanai

Lietot vienreizēju šo veterināro zāļu devu.

### Ausu ērcīšu ārstēšanai

Lietot vienreizēju šo veterināro zāļu devu. Turpmāko dzīvnieka klīnisko izmeklēšanu veikt pēc 30 dienām, jo dzīvniekam var būt nepieciešama atkārtota ārstēšana.

### Notoedrozes ārstēšanai

Lietot vienreizēju šo veterināro zāļu devu.

## **9. Ieteikumi pareizai lietošanai**

Šīs veterinārās zāles lieto tikai uz ādas. Nelietot iekšķīgi vai parenterāli.

Nelietot, kad dzīvnieka apmatojums ir mitrs.

Ausu ērcīšu invāzijas ārstēšanai, nelietot tieši auss kanālā.


Ir svarīgi lietot devu atbilstoši norādījumiem, lai atturētu dzīvnieku no zāļu nolaizīšanas un norīšanas. Ja notiek ievērojama zāļu norīšana, novērota pārejoša gastroenteroloģiska iedarbība, tāda kā pastiprināta siekalošanās, vemšana, mīkstas fekālijas vai samazināta barības uzņemšana, kas parasti pāriet bez ārstēšanas.

Uzklāt uz ādas pie kakla pamatnes, lāpstiņu priekšpusē. Izņemiet pipeti no aizsargājošā iepakojuma tieši pirms zāļu lietošanas.

Turot pipeti vertikāli, stingri nospiediet vāciņu, lai pārdurtu aplikatora aizdaru, tad noņemiet vāciņu.

Pašķiriet apmatojumu uz kaķa kakla, plecu lāpstiņas priekšpusē, lai atsegta nelielu ādas laukumu. Pipetes galu pielieciet tieši pie dzīvnieka ādas, nemasējot.

Spēcīgi saspiediet pipeti 3-4 reizes, lai tās saturu iztukšotu vienā aplikācijas punktā. Izvairieties no zāļu saskares ar pirkstiem.



Aplikācijas vietā var parādīties pārejošs kosmētisks efekts, piemēram, matu savēlšanās vai sacelšanās, taukainums vai sausas, baltas nogulsnes, kas parasti izzūd 24 stundu laikā pēc zāļu lietošanas. Šīs pazīmes neietekmē ne šo veterināro zāļu drošumu, ne iedarbīgumu.

## **10. Ierobežojumu periods**

Nav piemērojams.

## **11. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Neizņemt pipeti no blistera, kamēr neesat gatavs to lietot.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz kastītes, blistera un pipetes pēc "Exp.". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

## **12. Īpaši norādījumi atkritumu iznīcināšanai**

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt vidi.

Jautājiet savam veterinārārstam vai farmaceitam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm.

## **13. Veterināro zāļu klasifikācija**

Recepšu veterinārās zāles.

## **14. Tirdzniecības atļaujas numuri un iepakojuma lielumi**

EU/2/16/204/001–006

Šīs veterinārās zāles ir pieejamas iepakojumā pa trīs pipetēm (visi pipešu izmēri) un pa sešām pipetēm (visi pipešu izmēri).

Ne visi iepakojuma lielumi var tikt izplatīti.

## **15. Datums, kad lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta**

{MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

## **16. Kontaktinformācija:**

Tirdzniecības atļaujas turētājs un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Zoetis Belgium  
Rue Laid Burniat 1  
1348 Louvain-La-Neuve  
Beļģija

Vietējie pārstāvji un kontaktinformācija, lai ziņotu par iespējamām blakusparādībām:

**België/Belgique/Belgien**  
Tél/Tel: +32 (0) 800 99 189  
[pharmvig-belux@zoetis.com](mailto:pharmvig-belux@zoetis.com)

**Република България**  
Тел: +359 888 51 30 30  
[zoetisromania@zoetis.com](mailto:zoetisromania@zoetis.com)

**Česká republika**  
Tel: +420 257 101 111  
[infovet.cz@zoetis.com](mailto:infovet.cz@zoetis.com)

**Lietuva**  
Tel: +370 610 05088  
[zoetis.lithuania@zoetis.com](mailto:zoetis.lithuania@zoetis.com)

**Luxembourg/Luxemburg**  
Tél/Tel: +32 (2) 746 80 11  
[pharmvig-belux@zoetis.com](mailto:pharmvig-belux@zoetis.com)

**Magyarország**  
Tel.: +36 1 224 5200  
[hungary.info@zoetis.com](mailto:hungary.info@zoetis.com)

**Danmark**

Tlf: +45 70 20 73 05

[adr.scandinavia@zoetis.com](mailto:adr.scandinavia@zoetis.com)**Deutschland**

Tel: +49 30 2020 0049

[tierarzneimittelsicherheit@zoetis.com](mailto:tierarzneimittelsicherheit@zoetis.com)**Eesti**

Tel: +370 610 05088

[zoetis.estonia@zoetis.com](mailto:zoetis.estonia@zoetis.com)**Ελλάδα**

Τηλ: +30 210 6791900

[info@zoetis.com](mailto:info@zoetis.com)**España**

Tel: +34 91 4191900

[regulatory.spain@zoetis.com](mailto:regulatory.spain@zoetis.com)**France**

Tél: +33 (0)800 73 00 65

[contacteznous@zoetis.com](mailto:contacteznous@zoetis.com)**Hrvatska**

Tel: +385 1 6441 462

[pv.westernbalkans@zoetis.com](mailto:pv.westernbalkans@zoetis.com)**Ireland**

Tel: +353 (0) 1 256 9800

[pvsupportireland@zoetis.com](mailto:pvsupportireland@zoetis.com)**Ísland**

Sími: +45 70 20 73 05

[adr.scandinavia@zoetis.com](mailto:adr.scandinavia@zoetis.com)**Italia**

Tel: +39 06 3366 8111

[farmacovigilanza.italia@zoetis.com](mailto:farmacovigilanza.italia@zoetis.com)**Κύπρος**

Τηλ: +30 210 6791900

[info@zoetis.com](mailto:info@zoetis.com)**Latvija**

Tel: +370 610 05088

[zoetis.latvia@zoetis.com](mailto:zoetis.latvia@zoetis.com)**Malta**

Tel: +356 21 465 797

[info@agrimedltd.com](mailto:info@agrimedltd.com)**Nederland**

Tel: +31 (0)10 714 0900

[pharmvig-nl@zoetis.com](mailto:pharmvig-nl@zoetis.com)**Norge**

Tlf: +47 23 29 86 80

[adr.scandinavia@zoetis.com](mailto:adr.scandinavia@zoetis.com)**Österreich**

Tel: +43 (0)1 2701100 100

[tierarzneimittelsicherheit@zoetis.com](mailto:tierarzneimittelsicherheit@zoetis.com)**Polska**

Tel.: +48 22 2234800

[pv.poland@zoetis.com](mailto:pv.poland@zoetis.com)**Portugal**

Tel: +351 21 042 72 00

[zoetis.portugal@zoetis.com](mailto:zoetis.portugal@zoetis.com)**România**

Tel: +40785019479

[zoetisromania@zoetis.com](mailto:zoetisromania@zoetis.com)**Slovenija**

Tel: +385 1 6441 462

[pv.westernbalkans@zoetis.com](mailto:pv.westernbalkans@zoetis.com)**Slovenská republika**

Tel: +420 257 101 111

[infovet.cz@zoetis.com](mailto:infovet.cz@zoetis.com)**Suomi/Finland**

Puh/Tel: +358 10 336 7000

[laaketurva@zoetis.com](mailto:laaketurva@zoetis.com)**Sverige**

Tel: +46 (0) 76 760 0677

[adr.scandinavia@zoetis.com](mailto:adr.scandinavia@zoetis.com)**United Kingdom (Northern Ireland)**

Tel: +353 (0) 1 256 9800

[pvsupportireland@zoetis.com](mailto:pvsupportireland@zoetis.com)**17. Cita informācija**

Selamektīns ir pussintētisks avermektīnu grupas savienojums. Selamektīnam piemīt adulticīda, ovocīda un larvicīda iedarbība pret blusām. Tāpēc tas efektīvi pārtrauc blusu dzīves ciklu, nonāvējot blusu pieaugušās formas (uz dzīvnieka), novēršot olīņu izšķilšanos (uz dzīvnieka un tā apkārtējā vidē) un nogalinot blusu kāpurus arī apkārtējā vidē. Ar selamektīnu apstrādātu mājdzīvnieku atkritumi nonāvē blusu olas un kāpurus, kas iepriekš nav bijuši pakļauti selamektīna iedarbībai, un tādējādi

palīdz apkārtējā vidē kontrolēt esošo blusu invāziju dzīvniekiem pieejamās vietās. Selamektīns ir iedarbīgs pret pieaugušām blusām (*Ctenocephalides* spp.), kā arī pret ērcītēm (*Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*), utīm (*Felocola subrostratus*) un kuņģa-zarnu trakta nematodēm (*Toxocara cati*, *Ancylostoma tubaeforme*). Uzrādīta arī iedarbība pret sirdstārpu (*D. immitis*) kāpuriem.

Pret blusām iedarbības sākums ir 24 stundu laikā pēc veterināro zāļu lietošanas un ilgst 5 nedēļas.

Sarolaners ir akaricīds un insekticīds, pieder pie izoksazolīna grupas. Sarolaners ir iedarbīgs pret pieaugušām blusām (*Ctenocephalides* spp.), kā arī dažām ērcu sugām, tādām *Dermacentor reticulatus*, *Ixodes hexagonus*, *Ixodes ricinus* un *Rhipicephalus sanguineus*.

Pret blusām (*I. ricinus*) iedarbības sākums ir 24 stundu laikā pēc veterināro zāļu lietošanas un ilgst vienu mēnesi.