

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA DE CARTÓN

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Kelacyl 100 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Marbofloxacino 100 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml
250 ml
6 x 100 ml
6 x 250 ml
10 x 100 ml
10 x 250 ml
12 x 100 ml
12 x 250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino (cerdas adultas).

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: vía intramuscular (i.m.), subcutánea (s.c.), intravenosa (i.v.)

Porcino (cerdas adultas): vía intramuscular (i.m.)

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino:

Respiratorio:

- 2 mg/kg durante 3 a 5 días (i.v./i.m./s.c.):
Carne: 6 días.
Leche: 36 horas.
- 8 mg/kg en una única administración (i.m.):

Carne: 3 días.
Leche: 72 horas.

Mastitis:

- 2 mg/kg durante 3 días (i.v./i.m./s.c.):
Carne: 6 días.
Leche: 36 horas.

Porcino (cerdas adultas):
Carne: 4 días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}
Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.
Una vez abierto, fecha límite de utilización...

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en el embalaje original con objeto de protegerlo de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Kela nv

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2727 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**ETIQUETA 100 – 250 ml****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Kelacyl 100 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Marbofloxacino 100 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino (cerdas adultas).

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: vía intramuscular (i.m.), subcutáneo (s.c.), intravenoso (i.v.)

Porcino (cerdas adultas): vía intramuscular (i.m.)

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino:

Respiratorio:

- 2 mg/kg durante 3 a 5 días (i.v./i.m./s.c.):
Carne: 6 días.
Leche: 36 horas.
- 8 mg/kg en una única administración (i.m.):
Carne: 3 días.
Leche: 72 horas.

Mastitis:

- 2 mg/kg durante 3 días (i.v./i.m./s.c.):
Carne: 6 días.
Leche: 36 horas.

Porcino (cerdas adultas):

Carne: 4 días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.
Una vez abierto, fecha límite de utilización...

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en el embalaje original con objeto de protegerlo de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Kela nv

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}