

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Vsebnik 125 ml, 250 ml, 500 ml ali 1 l

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Parofor 140 mg/ml raztopina za uporabo v vodi za pitje, mleku ali mlečnem nadomestku za teleta, ki še ne prežvekujejo in prašiče.
Paromomicin (kot sulfat).

2. NAVEDBA UČINKOVIN

1 ml vsebuje:
paromomicin sulfat 200 mg, ustreza osnovi paromomicina 140 mg ali
140.000 IU aktivnosti paromomicina

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za uporabo v vodi za pitje, mleku ali mlečnem nadomestku

4. VELIKOST PAKIRANJA

125 ml, 250 ml, 500 ml ali 1 l

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Teleta, ki še ne prežvekujejo, prašiči.

6. INDIKACIJE**7. NAČIN IN POT UPORABE**

Za peroralno uporabo.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca:
Teleta, ki še ne prežvekujejo
Meso in organi: 20 dni
Prašiči
Meso in organi: 3 dni

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Rok uporabnosti po prvem odpiranju: 3 meseci. Odprto zdravilo uporabite do...

Vodo za pitje / mleko / mlečni nadomestek z zdravilom je treba osvežiti ali zamenjati vsakih 6 ur (v mleku / mlečnem nadomestku) ali vsakih 24 ur (v vodi).

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Izdelek v pakiranju za prodajo: ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Po prvem odpiranju: ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO
--

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM
--

Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen
Belgija

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0480/002

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot: