

**PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU****KRABÍČKA (injekční lahvička 50 ml a 100 ml)****1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Floron 300 mg/ml injekční roztok

**2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK**

Každý ml obsahuje: Florfenicolum 300 mg

**3. VELIKOST BALENÍ**

50 ml

100 ml

**4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT**

Skot, prasata

**5. INDIKACE****6. CESTY PODÁNÍ**

Skot: Přípravek je třeba podávat intramuskulárně nebo subkutánně do oblasti krční svaloviny.  
Prasata: Přípravek by se měl podávat intramuskulárně do krční svaloviny.

**7. OCHRANNÉ LHŮTY**

Ochranná lhůta:

|          |        |                                                                  |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------|
| Skot:    | Maso:  | 30 dnů po intramuskulární aplikaci                               |
|          | Maso:  | 44 dnů po subkutánní aplikaci                                    |
|          | Mléko: | Nepoužívat u krav, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu. |
| Prasata: | Maso:  | 16 dnů                                                           |

**8. DATUM EXSPIRACE**

Exp. {mm/rrrr}

Po 1. otevření spotřebujte do 28 dnů.

**9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte v původním obalu.  
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“**

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“**

Pouze pro zvířata.

**12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

KRKA

**14. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)**

96/074/02-C

**15. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot {číslo}

**PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU****ETIKETA (injekční lahvička 50 ml a 100 ml)****1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Floron 300 mg/ml injekční roztok

**2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK**

Každý ml obsahuje: Florfenicolum 300 mg

50 ml, 100 ml

**3. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT**

Skot, prasata

**4. CESTY PODÁNÍ**

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

Skot: Přípravek je třeba podávat intramuskulárně nebo subkutánně do oblasti krční svaloviny.

Prasata: Přípravek by se měl podávat intramuskulárně do krční svaloviny.

**5. OCHRANNÉ LHŮTY**

Ochranná lhůta:

|          |        |                                                                  |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------|
| Skot:    | Maso:  | 30 dnů po intramuskulární aplikaci                               |
|          | Maso:  | 44 dnů po subkutánní aplikaci                                    |
|          | Mléko: | Nepoužívat u krav, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu. |
| Prasata: |        |                                                                  |
|          | Maso:  | 16 dnů                                                           |

**6. DATUM EXSPIRACE**

Exp. {mm/rrrr}

Po 1. otevření spotřebujte do 28 dnů, do: ...

**7. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte v původním obalu.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**8. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

KRKA

|                       |
|-----------------------|
| <b>9. ČÍSLO ŠARŽE</b> |
|-----------------------|

Lot {číslo}