

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/97/0634

Levamisol 100

100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda, 19

E-08950 Esplugues de Llobregat (Barselona), Spānija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Levamisol 100

100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām

Levamisolum

3. ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO(AJĀM) VIELU(ĀM) UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM

1 ml šķīduma satur:

Aktīvā viela:

Levamisols (levamizola hidrochlorīda veidā) 100 mg

Papildvielas:

Metil-p-hidroksibenzoāts 1,8 mg

Propil-p-hidroksibenzoāts 0,2 mg

Palīgvielas:

Nātrija metabisulfīts

Dinātrija edetāts

Metil-p-hidroksibenzoāts

Propil-p-hidroksibenzoāts

Trinātrija citrāts

Citronskābes monohidrāts

Ūdens injekcijām

Dzidrs bezkrāsains šķīdums bez suspendētām cietām daļiņām.

4. INDIKĀCIJA(AS)

Liellopiem un aitām:

Parazītožu ārstēšanai, ko izraisījušas kuņģa-zarnu trakta pieaugušas un kāpuru stadijas nematodes (*Haemonchus spp.*, *Ostertagia spp.*, *Cooperia spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Bunostomum spp.*, *Oesophagostomum spp.*) un plaušu nematodes (*Dictyocaulus spp.*).

Cūkām:

Parazītožu ārstēšanai, ko izraisījušas plaušu un kuņģa-zarnu trakta nematodes (*Ascaris suum*, *Strongyloides ransomi*, *Metastrongylus spp.* un *Oesophagostomum spp.*).

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot dzīvniekiem, kas ir novājināti un stresā, kam ir citas slimības vai smagi aknu vai nieru darbības traucējumi.

Nelietot vaislas dzīvniekiem un sivēniem, kuru ķermeņa masa ir mazāka par 10 kg.

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Lai gan praktiski maz sastopama, tomēr izņēmuma gadījumos (īpaši liellopiem, cūkām un aitām) var būt pastiprināta siekalu izdalīšanās, slikta dūša un sāpes vēderā, kas izzūd pašas no sevis. Pēc subkutānas ievadīšanas var būt neliela reakcija injekcijas vietā.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas un cūkas

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Intramuskulārai un subkutānai ievadīšanai

Liellopiem: Vienā devā ievadīt 0,75 ml Levamisol 100 (75 mg levamizola)/10 kg ķermeņa masas. Dzīvniekiem, kuru ķermeņa masa ir lielāka par 300 kg, neievadīt vairāk kā 22,5 ml Levamisol 100 (250 mg levamizola), lai arī cik liela būtu to ķermeņa masa.

Aitām: Vienā devā ievadīt 0,75 ml Levamisol 100 (75 mg levamizola)/10 kg ķermeņa masas. Dzīvniekiem, kuru ķermeņa masa ir lielāka par 65 kg, neievadīt vairāk kā 4,5 ml Levamisol 100 (450 mg levamizola), lai arī cik liela būtu to ķermeņa masa.

Cūkām: Vienā devā ievadīt 0,75 ml Levamisol 100 (75 mg levamizola)/10 kg ķermeņa masas. Dzīvniekiem, kuru ķermeņa masa ir virs 150 kg, ievadīt 3,5 ml Levamisol 100 (350 mg levamizola) uz katriem 50 kg, kas pārsniedz 150 kg.

Nepārsniegt ieteikto devu.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav piemērojami

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas.

Aizliegts lietot laktējošiem dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā!

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā uz iepakojuma pēc

“Derīgs līdz:”.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Neinjicēt vairāk par 15 ml Levamisol 100 vienā un tai pašā injekcijas vietā; pēc ievadīšanas masēt injekcijas vietu. Pirms zemādas injekcijas dezinficēt injekcijas zonu.

Lietošana grūsnības vai laktācijas laikā

Nelietot sievietēm kārtas dzīvniekiem grūsnības pēdējā trimestrī. Nedrīkst lietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu lietošanai cilvēku pārtikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nelietot kopā ar organiskiem fosforu saturošiem savienojumiem un dietilkarbamazīna citrātu 14 dienas pirms un pēc Levamisol 100 ievadīšanas.

Nelietot kopā ar fenotiazīnu, metiridīnu vai prokīnam līdzīgiem savienojumiem.

Pārdozēšana

Pie divreiz lielākas devas par terapeitisko var būt pārdozēšanas simptomi un šādas pazīmes, kas liecina par saindēšanos ar fosfororganiskiem savienojumiem: uzbudināmība, pastiprināta siekalu izdalīšanās, neliela muskuļu trīce, artrīts. Pazīmes parādās 30 minūšu laikā pēc ievadīšanas un izzūd pašas no sevis, lai gan tiek ieteikta simptomātiska ārstēšana.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumus jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām bīstamiem atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

2010. gada 23februāris.

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Levamisols ir tetramizola bioloģiski aktīvs L-izomērs ar lielāku lietošanas drošību nekā teramizolam, un tas ir efektīvs pret šādu nematožu pieaugušo un kāpura stadijas formu liellopu, aitu un cūku plaušās un kuņģa-zarnu traktā:

Iepakojuma izmēri: 100 un 250 ml.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.