

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/NRP/01/1337

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ungezieferband Katze 2,1 g kakla siksna kaķiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena kakla siksna (35 cm) satur:

Aktīvā viela:

Diazinons 2,1 g

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Kakla siksna.

Sarkana, melna vai dzeltena 35 cm gara kakla siksna.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Mērķa sugas

Kaķi.

4.2. Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Blusu (*Ctenocephalides felis*) un/vai ērcu (*Ixodes ricinus*) invāzijas kontrolei kaķiem.

Kakla siksnašas pretektoparazitārā iedarbība ir novērojama 5.-10. dienā no uzlikšanas brīža, un tā ilgst līdz 6 mēnešiem.

4.3. Kontrindikācijas

Nelietot kaķiem līdz 6 mēnešu vecumam.

Nelietot slimiem dzīvniekiem, dzīvniekiem atveseļošanās periodā vai dzīvniekiem ar redzamiem plašiem ādas bojājumiem.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu, vai pret kādu no palīgvielām.

Nelietot dzīvniekiem, kam konstatēta sirds mazspēja, bronhu spazmas, krampji, aknu vai nieru saslimšanas.

4.4. Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai

Nav.

4.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Neļaut dzīvniekiem košļāt kakla siksnu.

Nevar izslēgt atsevišķu ērcu pieķeršanās iespēju pēc kakla siksnašas uzlikšanas. Šī iemesla dēļ nevar pilnībā izslēgt ar ērcēm saistītu slimību pārnesšanas risku, ja apstākļi ir nelabvēlīgi.

Lai palīdzētu izvairīties no blusu atkārtotas invāzijas dzīvnieka guļvietā un vietās, kur dzīvnieks regulāri uzturas, piemēram, paklāji un mīkstās mēbeles, regulāri jāapstrādā ar piemērotu insekticīdu un jātīra ar putekļusūcēju.

Kakla siksna, kas ap dzīvnieka kaklu aplikta pārāk cieši, var izraisīt ādas iekaisumu. Kakla siksna ir ūdensizturīga. Lietus, peldēšanās vai mazgāšanās laikā, kakla siksas terapeitiskā iedarbība nemazinās.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Diazinons ir fosfororganiskais savienojums: nerīkoties ar kaklasiksnu, ja ārsts noteicis, ka nedrīkst strādāt ar antiholinesterāzēm. Personām ar pastiprinātu jutību pret kakla siksas sastāvdaļām vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Ja pēc rīkošanās ar šo kaklasiksnu ir slikta pašsajūta, jāvērsas pie ārsta.

Kaklasiksnu no iepakojuma drīkst izņemt tikai tad, kad esat gatavs to lietot. Glabāt atstatus no pārtikas produktiem.

Pēc kakla siksas uzlikšanas, mazgāt rokas ar ziepēm un aukstu ūdeni.

Neļaut bērniem spēlēties ar kakla siksnu un to košļāt.

Neēst, nedzert un nesmēķēt kakla siksas lietošanas laikā.

Pēc kaklasiksas lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni.

4.6. Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Reti novēro īslaicīgas vietējas ādas reakcijas (matu izkrišana, nieze, apsārtums).

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s));
- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

4.7. Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nelietot kaķenēm grūsnības un laktācijas laikā.

4.8. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nelietot vienlaicīgi ar citiem organiskiem fosfora vai karbamātu savienojumiem.

Nelietot vienlaicīgi ar citiem insekticīdiem.

Nelietot vienlaikus ar organiskā fosfora savienojumiem, morfīnu, teofilīnu, aminofilīnu, lielu daudzumu intravenozā šķīduma, fenotiazīnus saturošām zālēm, pirantela palmoātu.

4.9. Devas un lietošanas veids

Ārīgai lietošanai.

Lietošana: aplikāt vienu kakla siksnu ap kaķa kaklu.

Aplikāt kakla siksnu ap kaķa kaklu un noregulēt tā, lai starp kaklu un kakla siksnu paliek 2-3 cm liela atstarpe. Lieko kakla siksas galu nogriež, ņemot vērā iespējamo dzīvnieka ķermeņa svara pieaugumu.

4.10. Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Simptomi: acu asarošana, siekalošanās, muskuļu krampji, vemšana, refleksu zudums, koma, cianoze.

Neatliekamā darbība: noņemt kakla siksnu un sazināties ar veterinārārstu.

Antidots: atropīns.

4.11. Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nav piemērojams.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: pretektoparazītu līdzekļi vietējai lietošanai.
ATĶ vet kods: QP53AF03.

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Diazinons darbojas kā impulsu pārvades mediatora acetilholīna inhibitors, kas izraisa acetilholīna kumulāciju autonomās nervu sistēmas sinapsēs un holinoreceptoru blokādi. Blokādes rezultātā tiek paralizēta parazīta centrālā nervu sistēma, t.sk. elpošana, kas izraisa parazīta nāvi.

5.2. Farmakokinētiskie dati

Nav datu.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Polivinilhlorīds

Epoksidizēta sojas pupiņu eļļa

Bārija laurāts

Piparmētru eļļa

Pigmenta kvēpi (melns), eritrozīnu E-127 (sarkans) vai titāna dioksīds E-171, dzeltenais pigments 83 un irgalīte dzeltens BAW (dzeltens) – attiecīgajai kakla siksna krāsai.

6.2. Būtiska nesaderība

6.3. Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 4 gadi.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Neatdzesēt vai nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā, cieši noslēgtā iepakojumā.

6.5. Tiešā iepakojuma veids un saturs

Maisiņš vai blisteris satur vienu kakla siksnu. Maisiņveidīgais iepakojums: maisiņš sastāv no vairākām papīra/alumīnija/polietilēna kārtām. Maisiņš ir iepakots kartona kārbā.

Blisterveidīgais iepakojums: blisteris ir polivinilhlorīda folija apvalks, pielīmēts uz apdrukāta blisterkartona. Blisterkartons sastāv no polietilēna un alumīnija kārtām pārklāta papīra.

6.6 Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte
Nīderlande

Tel: +31 0572 348834
Fax: +31 0572 348835
E-pasts: hqb@beaphar.com

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/01/1337

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 24/05/2001
Pēdējās pārreģistrācijas datums: 04/07/2011

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

05/2018

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Bezrecepšu veterinārās zāles.