

B. BIJSLUITER

- 1. Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in handel brengen en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend**
Registratiehouder: Oropharma n.v., Kapellestraat 70, BE-9800 Deinze.
Fabrikant: Laboratoria Smeets, Fotografielaan 42, BE-2610 Wilrijk.
- 2. Benaming van het geneesmiddel**
Tricho Plus®
- 3. Gehalte aan werkza(a)me en overige bestandde(e)l(en)**
Per zakje: Ronidazole 200 mg- Monokaliumhydrogeniumphosph.- lactose q.s. ad 4 g.
- 4. Indicaties**
Behandelen van trichomonosis en Spironucleus-infecties (hexamitiasis) bij duiven, die niet voor humane consumptie bestemd zijn.
Behandelen van trichomonosis, giardiosis en cochlosomosis bij siervogels.
- 5. Contra-indicaties**
Niet toedienen aan duiven die bestemd zijn voor humane consumptie.
- 6. Bijwerkingen**
Geen
- 7. Diersoorten waarvoor het geneesmiddel bestemd is**
Duiven die niet voor humane consumptie bestemd zijn.
- 8. Dosering voor elke diersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)**
10 mg/kg; oraal via drinkwater

Duiven:
Hiervoor wordt 1 zakje TRICHO PLUS opgelost in twee liter drinkwater.
Deze oplossing is geschikt voor de behandeling van ongeveer 40 duiven.
Opname van drinkwater uit andere bronnen, dient tijdens de behandeling te worden vermeden.
De gemiddelde behandelingsduur voor trichomonosis bedraagt vijf dagen, voor Spironucleus-infecties zeven tot tien dagen. Bij ernstige aandoeningen is het aan te raden de behandelingsduur met nogmaals vijf dagen te verlengen.
Gezien herbesmetting van trichomonose vaak voorkomt bij sportduiven tijdens het speelseizoen, wordt aangeraden om de veertien dagen gedurende twee dagen te behandelen. Hiervoor wordt 1 zakje TRICHO PLUS opgelost in twee liter drinkwater.
Ook is het aan te raden om vóór en na het vliegseizoen en tijdens het broeden in de winter 1 zakje TRICHO PLUS in twee liter drinkwater gedurende vijf dagen toe te dienen.

Siervogels:
1 zakje TRICHO PLUS oplossen in vier liter drinkwater. Deze oplossing is geschikt voor de behandeling van ongeveer 80 siervogels.
De behandelingsduur bedraagt gemiddeld 5 dagen. Bij cochlosomosis is een tweede behandelingsperiode twee dagen na de eerste behandelingsperiode aan te raden.
Ook is bij ernstige aandoeningen het wenselijk om de behandelingsduur met vijf dagen te verlengen.
- 9. Aanwijzingen voor een juiste toediening**
TRICHO PLUS dient dagelijks te worden ververst.
- 10. Wachtijd**
TRICHO PLUS is enkel bestemd voor duiven die niet voor humane consumptie bestemd zijn, en voor siervogels.

Consumptie van duiven en siervogels behandeld met TRICHO PLUS kan gevaar opleveren voor de gezondheid van de consument.

11. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C)

12. Speciale waarschuwingen

i) Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij de doeldieren

Alle duiven en siervogels van het hok gelijktijdig behandelen bij besmetting. De drinkpotten grondig reinigen om herinfecties te voorkomen.

Consumptie van duiven behandeld met TRICHO PLUS kan gevaar opleveren voor de gezondheid van de consument.

ii) Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Geen

iii) Overige voorzorgsmaatregelen

Geen

13. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

De nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen opdat niet-gebruikte producten niet in het milieu zouden terecht komen.

14. Datum waarop de bijsluiter voor het laatst herzien is

02/2012.

15. Overige informatie

Diergeneeskundig gebruik

Medisch voorschrift

BE-V149974