

ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА

ЕТИКЕТ

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА -
ЛИСТОВКА**

Флакон от 400 ml

NOROCALCIN 20 CM INJECTION / НОРОКАЛЦИН 20 CM ИНЖЕКТИВЕН

инжекционен разтвор за говеда и овце

Calcium gluconate 66.4 g/400 ml, Boric acid 13.6 g/400 ml, Magnesium hypophosphite hexahydrate
20.0 g/400 ml

**1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ**

Притежател на лиценза за употреба:

„АСКЛЕП - ФАРМА” ООД

гр. София, ж.к. Люлин - 7, бл. 711А, магазин 3

Република България

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down

BT35 6JP

Northern Ireland

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

NOROCALCIN 20 CM INJECTION / НОРОКАЛЦИН 20 CM ИНЖЕКТИВЕН

инжекционен разтвор за говеда и овце

Calcium gluconate 66.4 g/400 ml, Boric acid 13.6 g/400 ml, Magnesium hypophosphite hexahydrate
20.0 g/400 ml

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всеки 400 ml съдържат:

Calcium gluconate 66.4 g

Boric acid 13.6 g

Magnesium hypophosphite hexahydrate 20.0 g

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За третиране на хипокалцемия, комплицирана от дефицит на магнезий, при говеда и овце.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Бързото интравенозно инжектиране може да доведе до появата на сърдечни аритмии, както и до колапс и смърт при говеда с тежка токсемия.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда и овце.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Бавно интравенозно или подкожно.

Говеда: 400-800 ml

Овце: 50-80 ml

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

След подкожно приложение, мястото на инжектиране леко се масажира.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да не се съхранява при температура над 25 °C.

Да се пази от светлина.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 18 месеца.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

При третиране на акутна хипомагнеземия, може също да е необходимо прилагане, по съответния начин на приложение, на разтвор с по-висока концентрация на магнезий.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Разтворите, предназначени за интравенозно инжектиране, трябва да се затоплят до телесна температура и да се вливат бавно.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Случайното самоинжектиране трябва да се избягва.

Бременност:

Може да се прилага по време на бременност.

Лактация:

Може да се прилага по време на лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Не са известни.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Бързото интравенозно инжектиране може да доведе до появата на сърдечни аритмии и сърдечен блок. Следователно, интравенозното инжектиране трябва да бъде извършвано бавно и да бъде спряно при поява на първите признаци на неблагоприятни реакции.

Несъвместимости:

Не са известни.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

04/2016

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не е приложимо.