

ANHANG III

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Kartonschachtel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Kelbomar 100 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF

Jeder ml enthält:

Marbofloxacin 100 mg

3. PACKUNGSGRÖSSEN

100 ml

250 ml

6 x 100 ml

6 x 250 ml

10 x 100 ml

10 x 250 ml

12 x 100 ml

12 x 250 ml

4. ZIELTIERARTEN

Rinder, Schweine (Sauen)

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Rinder: intramuskuläre (i.m.), subkutane (s.c.), intravenöse (i.v.) Anwendung

Schweine (Sauen): intramuskuläre (i.m.) Anwendung

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder:

Atemwegsinfektionen:

- 2 mg/kg über 3-5 Tage (i.v./i.m./s.c.):

Essbare Gewebe: 6 Tage.

Milch: 36 Stunden.

- 8 mg/kg Einzeldosis (i.m.):

Essbare Gewebe: 3 Tage.

Milch: 72 Stunden.

Akute Mastitis:

- 2 mg/kg über 3 Tage (i.v./i.m./s.c.):

Essbare Gewebe: 6 Tage.

Milch: 36 Stunden.

Schweine (Sauen):

Essbare Gewebe: 4 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

9. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Kela nv

14. ZULASSUNGSNRUMMER

BE-V442355

15. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**Etikett 100 – 250 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Kelbomar 100 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF

Jeder ml enthält:
Marbofloxacin 100 mg

3. ZIELTIERARTEN

Rinder, Schweine (Sauen)

4. ART DER ANWENDUNG

Rinder: intramuskuläre (i.m.), subkutane (s.c.), intravenöse (i.v.) Anwendung

Schweine (Sauen): intramuskuläre (i.m.) Anwendung

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder:

Atemwegsinfektionen:

- 2 mg/kg über 3-5 Tage (i.v./i.m./s.c.):

Essbare Gewebe: 6 Tage.

Milch: 36 Stunden.

- 8 mg/kg Einzeldosis (i.m.):

Essbare Gewebe: 3 Tage.

Milch: 72 Stunden.

Akute Mastitis:

- 2 mg/kg über 3 Tage (i.v./i.m./s.c.):

Essbare Gewebe: 6 Tage.

Milch: 36 Stunden.

Schweine (Sauen):

Essbare Gewebe: 4 Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

7. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Kela nv

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}