

## VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

### 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Seclaris DC, 250 mg intramaminė suspensija užtrūkusioms karvėms

### 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename 3 g intramaminiam švirkšte yra:

**veikliosios medžiagos:**

cefalonio (cefalonio dihidrato) 250 mg.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

### 3. VAISTO FORMA

Intramaminė suspensija.  
Šviesus balkšvas ar gelsvas tepalas.

### 4. KLINIKINIAI DUOMENYS

#### 4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Galvijai (užtrūkusios karvės).

#### 4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Karvėms, užtrūkinimo metu sergančioms subklinikiniu mastitu, gydyti ir užtrūkimo laikotarpiu apsaugoti nuo naujų tešmens bakterinių infekcijų, kurias sukelia cefaloniumi jautrūs *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Trueperella pyogenes*, *Escherichia coli* ir *Klebsiella* spp.

#### 4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui cefalosporinams, kitiems beta laktaminiams antibiotikams ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

#### 4.4. Specialieji išpėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

#### 4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Vaisto naudojimą reikia pagrįsti išskirtų bakterijų, paimtų iš kiekvienos užtrūkinamos karvės tešmens ketvirčio (-ių) pieno pavyzdžių, jautrumo tyrimais. Jei to padaryti neįmanoma, gydymą reikia pagrįsti vietiniais (regiono, ūkio) epidemiologiniais duomenimis apie numanomą užsikrėtimą patogenais ir tikslinių bakterijų jautrumą. Veterinarinį vaistą naudojant ne pagal veterinarinio vaisto apraše pateiktus nurodymus, gali padidėti cefaloniumi atsparių bakterijų paplitimas ir sumažėti gydymo kitais beta laktamais veiksmingumas. Užtrūkusių karvių gydymo protokolai turi būti pagrįsti vietinėmis ir nacionalinėmis antimikrobinių medžiagų naudojimo rekomendacijomis ir reguliariai tikrinami veterinarijos gydytojo.

Reikėtų vengti girdyti veršelius pienu, kuriame yra cefalonio liekanų ir jis gali įtakoti antimikrobinį bakterijų atsparumą (pvz. plataus spektro beta laktamazių, ang. ESBL), iki išlaukos pienui pabaigos, išskyrus girdymą krekenomis.

Veterinarinio vaisto veiksmingumas nustatytas tik 4.2 p. „Naudojimo indikacijos“ nurodytiems patogenams. Todėl po užtrūkinimo gali pasireikšti sunkus ūminis mastitas (galimai mirtinas) dėl kitų patogenų rūšių, daugiausia *Pseudomonas aeruginosa*. Siekiant sumažinti šią riziką, turi būti kruopščiai laikomasi geros higienos praktikos.

#### Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Naudojus reikia plauti rankas.

Išvirkšti, įkvėpti, nuryti ar po sąlyčio su oda penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti padidėjusio jautrumo (alerginės) reakcijas. Padidėjęs jautrumas penicilinams gali būti kryžminis cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos į šias medžiagas kartais gali būti sunkios.

Negalima naudoti šio vaisto žinant apie savo padidėjusį jautrumą jam arba jei buvo patarta nedirbti su tokiais vaistais.

Šį vaistą reikia naudoti labai apdairiai ir atsižvelgiant į visas rekomenduojamas atsargumo priemones, norint išvengti jo poveikio.

Jei po sąlyčio pasireiškia tokie simptomai kaip odos išbėrimas, reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį. Veido, lūpų ar akių tynis, pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni simptomai, todėl medicininės pagalbos reikia kreiptis nedelsiant.

Valymo servetėlėse, tiekiamose su vaistu, yra izopropilo alkoholio, kuris kai kuriems žmonėms gali sukelti odos ar akių dirginimą. Naudojant vaistą ir valomasias servetėles, rekomenduojama užsimauti apsaugines pirštines.

#### **4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)**

Labai retais atvejais kai kuriems gyvuliams buvo pastebėtos staigios padidėjusio jautrumo reakcijos (nerimavimas, drebulys, pieno liaukos, akių vokų ir lūpų patinimas). Šios reakcijos gali sukelti mirtį.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

#### **4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu**

Skirtas naudoti paskutinio vaikingumo trimestro metu, kai laktuojančios karvės užtrūkinamos.

Nėra nepalankaus gydymo poveikio vaisiui.

Negalima naudoti karvėms laktacijos metu.

#### **4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos**

Cefalosporinų negalima naudoti tuo pačiu metu su bakteriostatinėmis antimikrobinėmis medžiagomis. Kartu naudojant cefalosporinus ir nefrotoksiškai veikiančius vaistus, gali padidėti toksinis poveikis inkstams.

#### **4.9. Dozės ir naudojimo būdas**

Švirkšti į tešmenį.

Vieno švirkšto turinį reikia sušvirkšti vieną kartą į kiekvieno tešmens ketvirčio spenio kanalą iškart po paskutinio melžimo užtrūkinant. Baigus melžti, reikia gerai nuvalyti ir dezinfekuoti spenio galą pridėta valomąja servetėle. Yra du vaisto naudojimo būdai:

### **1 būdas: švirkšti į tešmenį įvedant antgalio galiuką**

Vienoje rankoje laikant švirkšto cilindrą ir dangtelio pagrindą, reikia pasukti mažą viršutinę dangtelio dalį virš įrantos (dangtelio pagrindas lieka ant švirkšto). Būtina stengtis neužteršti švirkšto antgalio.

### **2 būdas: švirkšti į tešmenį įvedant visą antgalį**

Tvirtai laikant švirkšto cilindrą vienoje rankoje ir nykščiu stumiant išilgai dangtelio kol jis nusispaus, reikia visiškai nuimti švirkšto dangtelį. Būtina stengtis neužteršti švirkšto antgalio.

Švirkšto antgalį reikia įkišti į spenio kanalą ir tvirtai spausti stūmoklį, kol bus sušvirkšta visa vaisto dozė. Viena ranka laikant spenio galą, kita reikia švelniai pamasažuoti tešmenį aukštyne, kad antibiotikas geriau pasklistų ketvirtyje. Sušvirkštus vaistą, spenius rekomenduojama pamerkti į specialų tam skirtą antiseptinį preparatą.

## **4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina**

Tris dienas iš eilės karvėms švirkštus pakartotines dozes, nepastebėta jokių sukeltų nepalankių reakcijų.

## **4.11. Išlauka**

Skerdienai ir subproduktams – 21 para.

Pienui:

96 val. po apsiveršiavimo, jei užtrūkimo laikotarpis yra ilgesnis nei 54 dienos;

58 paros po gydymo, jei užtrūkimo laikotarpis yra 54 dienos ar trumpesnis.

## **5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS**

Farmakoterapinė grupė: kiti beta laktaminiai antibakteriniai vaistai intramaminiam naudojimui, pirmos kartos cefalosporinai.

ATCvet kodas: QJ51DB90.

### **5.1. Farmakodinaminės savybės**

Cefalonis yra pirmos kartos cefalosporinų grupei priklausantis antibakterinis vaistas, kuris veikia slopindamas ląstelės sienelės sintezę (baktericidinis veikimo būdas).

Žinomi trys atsparumo cefalosporinui mechanizmai: sumažėjęs ląstelės sienelės pralaidumas, inaktyvinimas fermentais ir specifinių penicilinų jungimosi vietų nebuvimas. Gramteigiamų bakterijų ir ypač stafilokokų pagrindinis atsparumo cefalosporinams mechanizmas yra dėl peniciliną sujungiančių baltymų pokyčio. Gramneigiamų bakterijų atsparumas gali būti dėl beta laktamazių (plataus ar išplėsto spektro).

Cefalonis veikia jam jautrius *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Trueperella pyogenes*, *Escherichia coli* ir *Klebsiella* spp.

### **5.2. Farmakokinetinės savybės**

Cefalonis ekstensyviai, bet lėtai absorbuojamas tešmenyje ir pirmiausiai išsiskiria su šlapimu. 7–13 % veikliosios medžiagos kasdien išsiskyrė su šlapimu per pirmas tris dienas po vaisto naudojimo, su išmatomis tuo pat metu kasdien išsiskyrė mažiau nei 1 %.

Vidutinė koncentracija kraujyje išlieka pakankamai pastovi maždaug 10 dienų po vaisto naudojimo, kas atitinka lėtą, bet ilgai trunkančią cefalonio absorbciją tešmenyje.

Ilgalaikis cefalonio išsilaikymas užtrūkusios karvės tešmenyje buvo tirtas 10 savaičių laikotarpį po sušvirkštimo. Tešmens sekrete veiksminga cefalonio koncentracija išlieka iki 10 savaičių po sušvirkštimo.

## **6. FARMACINIAI DUOMENYS**

### **6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas**

Aliuminio stearatas,  
skystasis parafinas.

### **6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai**

Nežinoma.

### **6.3. Tinkamumo laikas**

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.

### **6.4. Specialieji laikymo nurodymai**

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

### **6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys**

Balti polietileniniai švirškštai su raudonais polietileningais gaubteliais.

Valymo servetėlės (70 % viskozė / 30 % poliesteris, impregnuotos alkoholiu) popieriniame aliuminio kopolimeru laminuotame maišelyje.

Pakuotės dydžiai

20 intramaminių švirškštų ir 20 valymo servetėlių pakuotė.

72 intramaminių švirškštų ir 72 valymo servetėlių pakuotė.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

### **6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

## **7. REGISTRUOTOJAS**

Ceva Santé Animale  
10 avenue de La Ballastière  
33500 Libourne  
PRANCŪZIJA

## **8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)**

LT/2/17/2426/001-002

## **9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA**

2017-10-26

**10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA**

2018-11-30

**DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI**

Nėra.

## ŽENKLINIMAS

### DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

20 ir 72 švirkštų ir valymo servetėlių pakuotė

#### 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Seclaris DC, 250 mg intramaminė suspensija užtrūkusioms karvėms  
Cefalonis (dihidratas)

#### 2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Kiekviename 3 g intramaminiam švirkšte yra 250 mg cefalonio (dihidrato).

#### 3. VAISTO FORMA

Intramaminė suspensija.

#### 4. PAKUOTĖS DYDIS

20 švirkštų+valymo servetėlių  
72 švirkštai+valymo servetėlės

#### 5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai (užtrūkusios karvės).

#### 6. INDIKACIJA (-OS)

#### 7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti į tešmenį.  
Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

#### 8. IŠLAUKA

##### Išlauka

Skerdienai ir subproduktams – 21 para.

Pienui: 96 val. po apsiveršavimo, jei užtrūkimo laikotarpis yra ilgesnis nei 54 dienos;  
58 paros po gydymo, jei užtrūkimo laikotarpis yra 54 dienos ar trumpesnis.

#### 9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Kartais penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti stiprias alergines reakcijas. Įspėjimus naudotojui skaityti informaciniame lapelyje.

**10. TINKAMUMO DATA**

EXP {mėnuo/metai}  
Atidarius sunaudoti nedelsiant.

**11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS**

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

**12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ  
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI  
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

**14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“**

Saugoti nuo vaikų.

**15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Ceva Santé Animale  
10 avenue de La Ballastière  
33500 Libourne  
PRANCŪZIJA

**16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)**

LT/2/17/2426/001  
LT/2/17/2426/002

**17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS**

Lot {numeris}

**MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŖŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ**

**3 g ŖvirkŖtas**

**1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Seclaris DC, 250 mg intramaminė suspensija užtrūkusioms karvėms  
*Cefalonium (ut dihydratum)*

**2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŖIAGOS (-Ų) KIEKIS**

Cefalonio (dihidrato) 250 mg.

**3. KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)**

3 g

**4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)**

ŖvirkŖti į teŖmenį.

**5. IŖSLAUKA**

**IŖslauka**

Skerdienai ir subproduktams – 21 para.

Pienui: 96 val. po apsiverŖiavimo, jei užtrūkimo laikotarpis > 54 dienos;

58 paras po gydymo, jei užtrūkimo laikotarpis ≤ 54 dienos.

**6. SERIJOS NUMERIS**

Lot

**7. TINKAMUMO DATA**

EXP

**8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“**

Ad us. vet.



**INFORMACINIS LAPELIS**  
**Seclaris DC, 250 mg intramaminė suspensija užtrūkusioms karvėms**

**1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Registruotojas

Ceva Santé Animale  
10 avenue de La Ballastière  
33500 Libourne  
PRANCŪZIJA

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Lohmann Pharma Herstellung GmbH  
Heinz-Lohmann-Strasse 5  
Cuxhaven – Niedersachsen- 27472  
VOKIETIJA

**2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Seclaris DC, 250 mg intramaminė suspensija užtrūkusioms karvėms  
Cefalonio dihidratas

**3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS**

Kiekviename 3 g intramaminiam švirksčiui yra 250 mg cefalonio (dihidrato).  
Šviesus balkšvas ar gelsvas tepalas.

**4. INDIKACIJA (-OS)**

Karvėms, užtrūkinimo metu sergančioms subklinikinio mastitu, gydyti ir užtrūkimo laikotarpiu apsaugoti nuo naujų tešmens bakterinių infekcijų, kurias sukelia cefalonui jautrūs *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Trueperella pyogenes*, *Escherichia coli* ir *Klebsiella* spp.

**5. KONTRAINDIKACIJOS**

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui cefalosporinams, kitiems beta laktaminiams antibiotikams ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

**6. NEPALANKIOS REAKCIJOS**

Labai retais atvejais kai kuriems gyvuliams buvo pastebėtos staigios padidėjusio jautrumo reakcijos (nerimavimas, drebulys, pieno liaukos, akių vokų ir lūpų patinimas). Šios reakcijos gali sukelti mirtį. Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet koki šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

## **7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)**

Galvijai (užtrūkusios karvės).

## **8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI**

Švirkšti į tešmenį.

Vieno švirkšto turinį reikia sušvirkšti vieną kartą į kiekvieno tešmens ketvirčio spenio kanalą iškart po paskutinio melžimo užtrūkinant.

## **9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO**

Baigus melžti, reikia gerai nuvalyti ir dezinfekuoti spenio galą pridėta valomąja servetėle. Yra du vaisto naudojimo būdai:

### **1 būdas: švirkšti į tešmenį įvedant antgalio galiuką**

Vienoje rankoje laikant švirkšto cilindą ir dangtelio pagrindą, reikia pasukti mažą viršutinę dangtelio dalį virš įrantos (dangtelio pagrindas lieka ant švirkšto). Būtina stengtis neužteršti švirkšto antgalio.

### **2 būdas: švirkšti į tešmenį įvedant visą antgalį**

Tvirtai laikant švirkšto cilindą vienoje rankoje ir nykščiu stumiant išilgai dangtelio kol jis nusispaus, reikia visiškai nuimti švirkšto dangtelį. Būtina stengtis neužteršti švirkšto antgalio.

Švirkšto antgalį reikia įkišti į spenio kanalą ir tvirtai spausti stūmoklį, kol bus sušvirkšta visa vaisto dozė. Viena ranka laikant spenio galą, kita reikia švelniai pamasažuoti tešmenį aukštyne, kad antibiotikas geriau pasklistų ketvirtyje. Sušvirkštus vaistą, spenius rekomenduojama pamerkti į specialų tam skirtą antiseptinį preparatą.

## **10. IŠLAUKA**

Skerdienai ir subproduktams – 21 para.

Pienui:

96 val. po apsiveršiavimo, jei užtrūkimo laikotarpis yra ilgesnis nei 54 dienos;

58 paros po gydymo, jei užtrūkimo laikotarpis yra 54 dienos ar trumpesnis.

## **11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI**

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės ir švirkšto po „EXP“. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

## **12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI**

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Vaisto naudojimą reikia pagrįsti išskirtų bakterijų, paimtų iš kiekvienos užtrūkinamos karvės tešmens ketvirčio (-ių) pieno pavyzdžių, jautrumo tyrimais. Jei to padaryti neįmanoma, gydymą reikia pagrįsti

vietiniais (regiono, ūkio) epidemiologiniais duomenimis apie numanomą užsikrėtimą patogenais ir tikslinių bakterijų jautrumą. Veterinarinį vaistą naudojant ne pagal veterinarinio vaisto apraše pateiktus nurodymus, gali padidėti cefaloniumų atsparių bakterijų paplitimas ir sumažėti gydymo kitais beta laktamais veiksmingumas. Užtrūkusių karvių gydymo protokolai turi būti pagrįsti vietinėmis ir nacionalinėmis antimikrobinų medžiagų naudojimo rekomendacijomis ir reguliariai tikrinami veterinarijos gydytojo.

Reikėtų vengti girdyti veršelius pienu, kuriame yra cefaloniumų liekanų ir jis gali įtakoti antimikrobinę bakterijų atsparumą (pvz. plataus spektro beta laktamazių, ang. ESBL), iki išlaukos pienui pabaigos, išskyrus girdymą krekenomis.

Veterinarinio vaisto veiksmingumas nustatytas tik p. „Naudojimo indikacijos“ nurodytiems patogenams. Todėl po užtrūkimo gali pasireikšti sunkus ūminis mastitas (galimai mirtinas) dėl kitų patogenų rūšių, daugiausia *Pseudomonas aeruginosa*. Siekiant sumažinti šią riziką, turi būti kruopščiai laikomasi geros higienos praktikos.

#### Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojančiams vaistą gyvūnams

Naudojus reikia plauti rankas.

Išvirkšti, įkvėpti, nuryti ar po sąlyčio su oda penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti padidėjusio jautrumo (alerginės) reakcijas. Padidėjęs jautrumas penicilinams gali būti kryžminis cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos į šias medžiagas kartais gali būti sunkios.

Negalima naudoti šio vaisto žinant apie savo padidėjusį jautrumą jam arba jei buvo patarta nedirbti su tokiais vaistais.

Šį vaistą reikia naudoti labai apdairiai ir atsizvengiant į visas rekomenduojamas atsargumo priemones, norint išvengti jo poveikio.

Jei po sąlyčio pasireiškia tokie simptomai kaip odos išbėrimas, reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį. Veido, lūpų ar akių tynis, pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni simptomai, todėl medicininės pagalbos reikia kreiptis nedelsiant.

Valymo servetėlėse, tiekiamose su vaistu, yra izopropilo alkoholio, kuris kai kuriems žmonėms gali sukelti odos ar akių dirginimą. Naudojant vaistą ir valomasias servetėles rekomenduojama užsimauti apsaugines pirštines.

#### Vaikingumas ir laktacija

Skirtas naudoti paskutinio vaikingumo trimestro metu, kai laktuojančios karvės užtrūkinamos.

Nėra nepalankaus gydymo poveikio vaisiui.

Negalima naudoti karvėms laktacijos metu.

#### Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Cefalosporinų negalima naudoti tuo pačiu metu su bakteriostatinėmis antimikrobinėmis medžiagomis. Kartu naudojant cefalosporinus ir nefrotoksiškai veikiančius vaistus, gali padidėti toksinis poveikis inkstams.

#### Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Tris dienas iš eilės karvėms švirkštus pakartotines dozes nepastebėta jokių sukeltų nepalankių reakcijų.

#### Nesuderinamumai

Nežinoma.

### **13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

#### **14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA**

2018-11-30

#### **15. KITA INFORMACIJA**

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Balti polietileniniai švirškštai su raudonais polietileniniais gaubteliais.

Valymo servetėlės (70 % viskozė / 30 % poliesteris, impregnuotos alkoholiu) popieriniame aliuminio kopolimeru laminuotame maišelyje.

Pakuotės dydžiai

20 intramaminių švirškštų ir 20 valymo servetėlių pakuotė.

72 intramaminių švirškštų ir 72 valymo servetėlių pakuotė.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.