

ЕТИКЕТ / ЛИСТОВКА:
PEDERIPRA SPRAY /ПЕДЕРИПРА СПРЕЙ

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170- AMER (Girona) SPAIN
Телефон: +34 972 430660
Факс: +34 972 430661
Електронна поща: hipra@hipra.com

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всеки ml съдържа:

Активна субстанция:

Chlortetracycline (hydrochloride) 20 mg

Експципиенти до..... 1,0 ml

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

270 ml

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Хирургически рани.

Повърхностни рани.

Помощно средство при лекуването на копитния гнилец и други инфекции в областта на копитата и крайниците, причинени от чувствителни към хлортетрациклин микроорганизми.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към тетрациклини.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Локални кожни реакции.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, коне, овце, кози, свине, птици, зайци, кучета и котки.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ

Локално приложение със спрей.
Да се разклати преди употреба.
Предпазливо напръскайте засегнатото място от 1 до 2 секунди от разстояние 20 cm.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Не използвайте продукта повече от 10 последователни дни.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи: нула дни.
Мляко: нула часа.
В случай на незабавно клане, изрежете мястото на приложение.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Да не се съхранява при температура над 25 °C.
Да се съхранява на сухо място.
Да се пази от пряка слънчева светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Няма.

Специални предпазни мерки при употреба:

Да не се пръска в очите.

Преди да приложите продукта, почистете от нечистотии и загнили тъкани мястото, което ще лекувате.

Да се избягва всякакъв контакт с третираното място до 5 минути след нанасянето на продукта.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Да се избягва всякакъв контакт с продукта или неговото инхалиране.

Съдържанието на флакона е под налягане - да не се оставя на пряка слънчева светлина, на температура над 45 °C и да не се изхвърля в огън, дори когато опаковката е празна.

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене:

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налични данни.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Интоксикация от свръхдоза е много малко вероятно да настъпи поради формата на приемане на продукта. При продължително лечение, могат да се появят кожни възпаления при животни със свръхчувствителност. Те ще намаляят прогресивно след прекратяване на лечението.

Несъвместимости:

Не са известни.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожете остатъчните материали в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО
--

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

16. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

17. НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

0022-1249-05.11.2009

18. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА
--

13/10/2014

19. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.