

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**KARTONSKA ŠKATLA****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Receptal raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

Učinkovina:

buserelin acetat 0,0042 mg (kar ustreza 0,004 mg buserelina)

Pomožne snovi:

benzilalkohol 20 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

1 x 10 ml

5 x 10 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Krave, kobile, svinje (mladice) in kunčje samice

5. INDIKACIJE**Krave:**

- zdravljenje neplodnosti zaradi folikularnih cist,
- povečanje odstotka oploditev; po injiciranju med umetnim osemenjevanjem ali v lutealni fazi po umetnem osemenjevanju,
- sinhronizacija estrusa in ovulacije (omogoča umetno osemenjevanje ob točno določenem času), ob sočasnem dajanju prostaglandina F_{2α} ali progestogena.

Kobile:

- indukcija ovulacije, ko je zrel folikel; za časovno sinhronizacijo ovulacije s parjenjem,
- povečanje odstotka oploditev po dajanju v pozni lutealni fazi po parjenju ali umetni osemenitvi.

Svinje: (mladice):

- indukcija ovulacije (aplikacija proti koncu folikularne faze)

Kunčje samice:

- indukcija ovulacije,
- povečanje odstotka oploditev.

6. POTI UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7. KARENCA

Karenca:

Meso in organi: Nič dni.

Mleko: Nič dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh pri temperaturi pod 25°C.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte na temnem in suhem mestu pri temperaturi pod 25°C.

Zaščitite pred svetlobo.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Intervet International B.V.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0292/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

VIALA/NALEPKA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Receptal

2. NAVEDBA UČINKOVIN

buserelin 0,004 mg/ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/lilll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh pri temperaturi pod 25°C.