

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel (10 ml, 5 x 10 ml, 6 x 10 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Mepidor 20 mg/ml Injektionslösung

Mepivacainhydrochlorid

2. WIRKSTOFF(E)

Mepivacainhydrochlorid 20 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 ml

5 x 10 ml

6 x 10 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Pferd

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intraartikuläre und epidurale Anwendung.

7. WARTEZEITEN**Wartezeiten:**

Essbare Gewebe: 3 Tage

Milch: 72 Stunden

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen verabreicht werden.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS
--

VetViva Richter (logo)

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z.Nr.: 838072

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

10 ml Durchstechflasche aus Typ-I-Glas mit Brombutyl-Gummistopfen und Aluminiumbördelkappe

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Mepidor

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Mepivacainhydrochlorid 20 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

10 ml

VetViva Richter (logo)