

ЛИСТОВКА:

Иверпразин таблетки за кучета и котки

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба и производител, отговорен за освобождаване на партидата:

„Голашфарма“ ООД
гр.Сапарева баня 2650, Област Кюстендил
ул. „Победа“ № 33
Република България
Телефон: +359 888 300 755
E-mail: golashpharma@abv.bg

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Иверпразин таблетки за кучета и котки

Ivermectin 0.2 mg
Praziquantel 50 mg

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всяка таблетка от 600 mg съдържа:

Активни субстанции:

Ivermectin 0.2 mg
Praziquantel 50.0 mg

Експципенти:

Starlac (Lactose monohydrate 85%; Maydis amyllum 15%)	500 mg
Magnesium Stearate	29.80 mg
Silica, colloidal anhydrous	20 mg

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение при инвазия с цестоиди и нематоди, особено при смесени паразитни инвазии.

При кучета:

Ивермектинът действа антинематодно при кучешка дирофиляриоза чрез предотвратяване на съзряването на незрелите (прекардиачни) стадии (L3, L4) на *Dirofilaria immitis* до един месец (30 дни) след инвазия. Действа антинематодно и срещу *Toxocara canis* (възрастни), *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis* (възрастни), *Ancylostoma caninum* (L4 и възрастни), *Ancylostoma braziliense*, *Uncinaria stenocephala* (L4 и възрастни), *Strongyloides stercoralis*.

Празиквантелът действа антицестодно срещу *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis*, *Taenia multiceps*, *T. hydatigena*, *T. ovis*, *T. pisiformis*, *T. taeniaeformis*, *Dipylidium caninum* (зрели и незрели форми), *Diphyllobothrium erinacei*, *Mesocestoides corti*.

При котки:

Ивермектинът действа антинематодно при дирофиляриоза при котки, като унищожава ларвите на *Dirofilaria immitis* до един месец (30 дни) след инвазия. Действа антинематодно и срещу *Toxocara cati*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma braziliense*, *Uncinaria stenocephala*, *Aelurostrongylus abstrusus*, *Strongyloides stercoralis*.

Празиквантелът действа антицистодно срещу *Echinococcus granulosus* (полово зрели), *Echinococcus multilocularis*, *Taenia multiceps*, *T. hydatigena*, *T. pisiformis*, *T. taeniaeformis*, *Dipylidium caninum* (зрели и незрели форми), *Mesocestoides corti*.

Иверпразин таблетки не е ефикасен срещу възрастните форми на *D. immitis*. Инвазираните с диروفилария кучета и котки трябва да бъдат третирани за премахване на възрастните диروفиларии и микрофилариите преди започване на програма с Иверпразин таблетки. Продуктът не може да гарантира премахването на всички микрофиларии.

Двете активни субстанции на ВМП взаимно допълват действието си и създават възможност да се получи разширен противопаразитен ефект.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при кученца и котенца на възраст по-малка от шест седмици.

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции, или към някой от ексципиентите.

Да не се използва при кучета, свръхчувствителни към ивермектин (от породите шелти, коли, староанглийско овчарско куче и техните поколения, или кръстоски).

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Рядко, при необгрижвани и изнемощели животни, са наблюдавани повръщане или диария в рамките на 24 часа след прилагането на продукта в препоръчаните дози.

При кучета от породите шелти, коли, староанглийско овчарско куче и техните поколения или кръстоски са наблюдавани системни симптоми (сънливост), неврологични симптоми (мидриаза, депресия, мускулни тремори и атаксия, пареза, залежаване, превъзбуденост, ступор) и/или стомашно-чревни симптоми (повръщане, диария, анорексия и саливация) кома и смърт.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета и котки.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

За перорално приложение.

Кучета:

По 1 таблетка на 10 kg т.м. (0.02 mg/ kg т.м. ивермектин и 5.0 mg/ kg т.м. празиквантел) еднократно перорално, на едномесечни интервали.

За кучета над 45 kg да не се прилагат повече от четири таблетки като еднократна доза.

Котки:

По 1/4 таблетка на 2 kg т.м. (0.02 mg/ kg т.м. ивермектин и 5.0 mg/ kg т.м. празиквантел) еднократно перорално, на едномесечни интервали.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Третираниите животни трябва да бъдат наблюдавани в продължение на няколко минути, след прилагане на дозата, за да се гарантира, че е приета напълно. Иверпразин таблетки трябва да се прилага на интервали от 30 дни през топлия сезон на годината, когато комарите (вектори), потенциални носители на диروفиларийни ларви са активни. Началната доза трябва да се

прилага в рамките на един месец (30 дни) след първия контакт на животните с комари. Крайната доза трябва да се прилага в рамките на 30 дни след последния контакт с комари. При замяна на друг продукт, прилаган за превенция на диروفиларията, първата доза на Иверпразин таблетки трябва да се прилага в рамките на 30 дни след прилагане на последната доза от предшестващия продукт.

Ако интервалът между отделните дози надвишава 30 дни, ефикасността на ивермектина може да бъде намалена.

За оптимална ефикасност таблетките трябва да се прилагат веднъж месечно – на същия или приблизително същия ден от следващия месец. Ако лечението се забави с няколко дни или повече, незабавното приложение на Иверпразин таблетки и възобновяването на препоръчания режим на дозиране ще сведе до минимум възможността за развитие на възрастни диروفиларии.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Да се съхранява в оригинална опаковка.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Да не се комбинират третиране с Иверпразин таблетки и третиране с имунологични ВМП. Третирането с Иверпразин таблетки не трябва да се провежда в рамките на 28 дни преди или след третирането с имунологичен ВМП.

Лечението на кучета с висок брой циркулиращи микрофиларии понякога може да доведе до появата на реакции на свръхчувствителност, като бледи лигавици, повръщане, треперене, затруднено дишане или прекомерно отделяне на слюнка. Тези реакции са свързани с освобождаването на протеини от мъртви или умиращи микрофиларии и не са директен токсичен ефект на продукта.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Хора с установена свръхчувствителност към ивермектин или празиквантел трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

При прилагане на продукта да не се яде, пие или пуши.

След прилагане ръцете да се измият с вода и сапун.

Бременност:

Може да се прилага по време на бременност.

Лактация:

Може да се прилага по време на лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Да не се комбинират третиране с Иверпразин таблетки и третиране с имунологични ВМП.

Третирането с Иверпразин таблетки не трябва да се провежда в рамките на 28 дни преди или след третирането с имунологичен ВМП.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

При предозирание са наблюдавани повръщане или диария, които отзвучават в рамките на 24 часа.

Индексът на безопасност на празиквантел при кучетата и котките е много висок и затова предозирането на тази активна субстанция е рядко.

При прилагане на ивермектин в многократно завишени дози, кучетата от чувствителните породи проявяват неблагоприятни реакции, които включват: мидриаза, депресия, атаксия, тремор, саливация, пареза, залежаване, превъзбуденост, ступор, кома и смърт.

Клинични проучвания, включващи повече от 3000 дози от продукт с активна субстанция ивермектин при котки, в рамките на 24 часа на лечение са наблюдавани повръщане в > 0.3% и диария при > 0.2% от случаите.

При интоксикация след предозирание се предизвиква незабавно повръщане и/ или се прилага активен въглен за минимизиране на резорбцията.

При случайно предозирание незабавно да се потърси ветеринарен лекар.

Основни несъвместимости:

Да не се комбинират третиране с Иверпразин таблетки и третиране с имунологични ВМП.

Третирането с Иверпразин таблетки не трябва да се провежда в рамките на 28 дни преди или след третирането с имунологичен ВМП.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

01/2022

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Блистер от PVC/Al с по 6 таблетки в блистер.

Размери на опаковката:

-картонена кутия с пигментно покритие с 1 блистер от PVC/Al (6 броя таблетки);

-картонена кутия с пигментно покритие с 10 блистера от PVC/Al (60 броя таблетки).

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДАСКАЛОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР