

PRILOG I.

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA PROIZVODA

1. NAZIV VETERINARSKOG LIJEKA

EVICTO 15 mg otopina za nakapavanje za pse i mačke ≤ 2,5 kg
EVICTO 30 mg otopina za nakapavanje za pse 2,6 – 5,0 kg
EVICTO 45 mg otopina za nakapavanje za mačke 2,6 – 7,5 kg
EVICTO 60 mg otopina za nakapavanje za mačke 7,6 – 10,0 kg
EVICTO 60 mg otopina za nakapavanje za pse 5,1 – 10,0 kg
EVICTO 120 mg otopina za nakapavanje za pse 10,1 – 20,0 kg
EVICTO 240 mg otopina za nakapavanje za pse 20,1 – 40,0 kg
EVICTO 360 mg otopina za nakapavanje za pse 40,1 – 60,0 kg

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka doza (pipeta) sadržava:

Djelatne tvari:

EVICTO 15 mg za pse i mačke	60 mg/mL otopina	Selamektin	15 mg
EVICTO 30 mg za pse	120 mg/mL otopina	Selamektin	30 mg
EVICTO 45 mg za mačke	60 mg/mL otopina	Selamektin	45 mg
EVICTO 60 mg za mačke	60 mg/mL otopina	Selamektin	60 mg
EVICTO 60 mg za pse	120 mg/mL otopina	Selamektin	60 mg
EVICTO 120 mg za pse	120 mg/mL otopina	Selamektin	120 mg
EVICTO 240 mg za pse	120 mg/mL otopina	Selamektin	240 mg
EVICTO 360 mg za pse	120 mg/mL otopina	Selamektin	360 mg

Pomoćne tvari:

Kvalitativni sastav pomoćnih tvari i drugih sastojaka	Kvantitativni sastav ako su te informacije bitne za pravilnu primjenu veterinarskog lijeka
Butilhidroksitoluen	0,8 mg/mL
Dipropilen glikol metil eter	
Izopropilni alkohol	

Bezbojna do žuta otopina.

3. KLINIČKI PODATCI

3.1 Ciljne vrste životinja

Psi i mačke.

3.2 Indikacije za primjenu za svaku ciljnu vrstu životinja

Psi i mačke:

- Liječenje i prevencija infestacije buhama uzrokovane sa *Ctenocephalides* spp. kroz mjesec dana, nakon jednokratne primjene. Veterinarski lijek djeluje na odrasle oblike, ličinke i jajašca. Djeluje na jajašca kroz 3 tjedna nakon primjene. Zbog smanjenja populacije buha, mjesečna primjena kod gravidnih životinja i životinja koje doje mladunčad će pomoći kod sprječavanja infestacije mladunčadi buhama do sedmog tjedna starosti. Veterinarski lijek se može koristiti i kao dio strategije liječenja alergijskog dermatitisa izazvanog buhama, ali zbog svojeg djelovanja na ličinke i jajašca, može se

koristiti i kao pomoć u rješavanju nazočnosti buha u prostorima kojim životinja ima pristup.

- Prevencija bolesti izazvane srčanim crvima uzrokovane sa *Dirofilaria immitis* kroz mjesečnu primjenu. Veterinarski lijek se neškodljivo može primijeniti životinjama koje su već infestirane odraslim oblicima srčanih crva, no, preporučuje se, u skladu s dobrom veterinarskom praksom, da sve životinja starije od 6 mjeseci, a koje žive na prostorima na kojima je poznato da ima prenosnika srčanih crva, prije primjene ovog veterinarskog lijeka budu testirane na nazočnost odraslih oblika srčanih crva. Također se preporučuje da se pse povremeno testira na nazočnost srčanih crva kao dio strategije borbe protiv srčanog crva, čak i kada se veterinarski lijek redovito mjesečno primjenjuje. Veterinarski lijek nije učinkovit protiv odraslih oblika *D. immitis*.
- Liječenje ušnih šugaraca (*Otodectes cynotis*).

Mačke:

- Liječenje infestacije paušima (*Felicola subrostratus*).
- Liječenje infestacije odraslim crijevnim oblicima (*Toxocara cati*).
- Liječenje infestacije odraslim crijevnim kukastim crvima (*Ancylostoma tubaeforme*).

Psi:

- Liječenje infestacije paušima (*Trichodectes canis*).
- Liječenje sarkoptes šuge (uzrokovane sa *Sarcoptes scabiei*).
- Liječenje invazije odraslim crijevnim oblicima (*Toxocara canis*).

3.3 Kontraindikacije

Ne primjenjivati u životinja mlađih od 6 tjedana.

Ne primjenjivati u bolesnih mačaka i mačaka koje su iscrpljene i mršave (obzirom na veličinu i dob).

Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar ili na bilo koju pomoćnu tvar.

3.4 Posebna upozorenja

Životinje je moguće okupati 2 sata nakon primjene ovog veterinarskog lijeka bez opasnosti od gubitka učinkovitosti.

Ne primjenjivati kada je životinjska dlaka mokra, no ipak uporaba šampona na životinji 2 ili više sati nakon primjene neće umanjiti učinkovitost veterinarskog lijeka.

Kod terapije ušnih šugaraca, ne primjenjivati veterinarski lijek direktno u ušni kanal.

3.5 Posebne mjere opreza prilikom primjene

Posebne mjere opreza za neškodljivu primjenu u ciljnih vrsta životinja:

Ovaj veterinarski lijek primjenjuje se isključivo na površinu kože. Ne primjenjivati kroz usta ili parenteralno.

Držati životinje udaljene od vatre ili drugih zapaljivih izvora najmanje 30 minuta od primjene ili dok se dlaka u potpunosti ne osuši.

Vrlo je važno da veterinarski lijek bude točno doziran po uputi kako bi se u najvećoj mjeri smanjila količina veterinarskog lijeka koju životinja može polizati. Ako životinja polize veću količinu veterinarskog lijeka može se, kod mačaka, rijetko, pojaviti kratkotrajno pojačano slinjenje.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarski lijek u životinja:

Ovaj veterinarski lijek je jako zapaljiv; držati dalje od izvora topline, iskrenja, otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Ne pušiti, jesti i piti dok rukujete ovim veterinarskim lijekom.

Ovaj veterinarski lijek nadražuje kožu i oči. Nakon rukovanja oprati ruke. U slučaju dodira veterinarskog lijeka s kožom, odmah oprati kožu s tekućom vodom i sapunom. U slučaju nehotičnog kontakta s očima, odmah isprati vodom i potražiti savjet liječnika te mu pokazati uputu o veterinarskom lijeku ili etiketu.

Izbjegavajte direktan dodir sa životinjama dok se mjesto primjene u potpunosti ne osuši. Na dan primjene, djeci ne treba dozvoliti da rukuju s tretiranim životinjama, a životinjama ne treba dozvoliti da spavaju s vlasnicima, posebno s djecom. Potrošene pipete odmah ukloniti i ne ih ostavljati unutar pogleda i dohvata djece.

Osobe preosjetljive na selamektin trebaju oprezno primjenjivati veterinarski lijek.

Posebne mjere opreza za zaštitu okoliša:

Ne dopuštati životinjama na kojima je primijenjen ovaj veterinarski lijek da se kupaju u otvorenim vodama najmanje 2 sata nakon primjene.

3.6 Štetni događaji

Mačke:

Rijetko (1 do 10 životinja/ 10 000 tretiranih životinja):	Alopecija na mjestu primjene ^{1,2} , promjena dlake na mjestu primjene ³ Hipersalivacija ⁴
Vrlo rijetko (< 1 životinja / 10 000 tretiranih životinja, uključujući izolirane slučajeve):	Nadraženost na mjestu primjene ^{1,5} Neurološki znaci ⁶ (npr. epileptički napadaj)

Psi:

Rijetko (1 do 10 životinja/ 10 000 tretiranih životinja):	Promjena dlake na mjestu primjene ³
Vrlo rijetko (< 1 životinja / 10 000 tretiranih životinja, uključujući izolirane slučajeve):	Neurološki znaci ⁶ (npr. epileptički napadaj)

¹ Obično prolazi sama, ali u nekim slučajevima može biti potrebno primijeniti simptomatsko liječenje.

² Blaga i prolazna.

³ Lokalno prolazno sljepljivanje dlake na mjestu primjene i/ili povremena pojava male količine bijelog praha koji obično nestaje unutar 24 sata od primjene terapije i ne utječe na neškodljivost ili učinkovitost veterinarskog lijeka.

⁴ Kratkotrajna, ako životinja poliže veću količinu.

⁵ Prolazna i fokalna.

⁶ Reverzibilni kao i kod ostalih makrocikličkih laktona.

Važno je prijaviti štetne događaje. Time se omogućuje kontinuirano praćenje neškodljivosti veterinarskog lijeka. Prijave treba poslati, po mogućnosti putem veterinara, nositelju odobrenja za stavljanje u promet ili njegovom lokalnom predstavniku ili nacionalnom nadležnom tijelu putem nacionalnog sustava za prijavljivanje. Odgovarajuće podatke za kontakt možete pronaći u uputi o veterinarskom lijeku.

3.7 Primjena tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja

Graviditet i laktacija:

Može se primijeniti tijekom graviditeta i laktacije.

Plodnost:

Može se primijeniti u rasplodnih životinja.

3.8 Interakcija s drugim veterinarskim lijekovima i drugi oblici interakcije

Nisu poznate.

3.9 Putovi primjene i doziranje

Nakapavanjem.

Ovaj veterinarski lijek treba primjenjivati jednokratno jednu dozu primjenjujući najmanje 6 mg/kg selamektina. Ako postoji istovremena infestacija ili infekcija kod iste životinje, a za koju je potrebna primjena veterinarskog lijeka, samo jednu dozu ovog veterinarskog lijeka u preporučenoj količini od 6 mg/kg treba primijeniti u bilo koje vrijeme. Dužina primjene za svakog parazita je pokazana u tablici dolje.

Primijeniti u skladu sa sljedećom tablicom:

Mačke (kg)	Proizvod	Mg selamektina	Jačina (mg/ml)	Primijenjena količina (nominalna veličina pipete, ml)
≤ 2,5	1 pipeta Evicto 15 mg za pse i mačke ≤ 2,5 kg	15	60	0,25
2,6-7,5	1 pipeta Evicto 45 mg za mačke 2,6-7,5 kg	45	60	0,75
7,6-10,0	1 pipeta Evicto 60 mg za mačke 7,6-10,0 kg	60	60	1,0
> 10	Odgovarajuća kombinacija pipeta	Odgovarajuća kombinacija pipeta	60	Odgovarajuća kombinacija pipeta

Psi (kg)	Proizvod	Mg selamektina	Jačina (mg/ml)	Primijenjena količina (nominalna veličina pipete, ml)
≤ 2,5	1 pipeta Evicto 15 mg za pse i mačke ≤ 2,5 kg	15	60	0,25
2,6-5,0	1 pipeta Evicto 30 mg za pse 2,6-5,0 kg	30	120	0,25
5,1-10,0	1 pipeta Evicto 60 mg za pse 5,1-10,0 kg	60	120	0,5
10,1-20,0	1 pipeta Evicto 120 mg za pse 10,1-20,0 kg	120	120	1,0
20,1-40,0	1 pipeta Evicto 240 mg za pse 20,1-40,0 kg	240	120	2,0
40,1-60,0	1 pipeta Evicto 360 mg za pse 40,1-60,0 kg	360	120	3,0

> 60	Odgovarajuća kombinacija pipeta	Odgovarajuća kombinacija pipeta	60/120	Odgovarajuća kombinacija pipeta
------	---------------------------------	---------------------------------	--------	---------------------------------

Liječenje i prevencija buha (psi i mačke):

Koristeći pravilno upute za primjenu ovog veterinarskog lijeka, odrasle buhe na životinji ugibaju, više neće proizvoditi jajašca sposobna za život, a ličinke (nazočne samo na mjestima gdje životinja boravi) također ugibaju. Na ovaj način se zaustavlja razmnožavanje buha, prekida se životni ciklus buha i može pomoći u suzbijanju postojećih infestacija buhama u prostoru u kojem životinja boravi.

Za prevenciju infestacije buhama, ovaj veterinarski lijek treba primjenjivati u mjesečnim intervalima tijekom sezone buha s početkom oko mjesec dana prije početka aktivnosti buha. Zbog smanjenja količine buha, mjesečna primjena ovog veterinarskog lijeka kod gravidnih i životinja u laktaciji pomoći će spriječiti infestaciju buhama u leglu do sedam tjedana starosti.

Ako se koristi kao dio strategije liječenja alergijskog dermatitisa izazvanog buhama, ovaj veterinarski lijek treba primjenjivati u razmacima od mjesec dana.

Prevencija bolesti srčanog crva (psi i mačke):

Ovaj veterinarski lijek se može primjenjivati tijekom cijele godine ili barem unutar mjeseca u kojem će životinja prvi puta doći u dodir s komarcima, pa do kraja sezone izloženosti komarcima u razmacima od mjesec dana.

Posljednja doza mora biti primijenjena unutar jednog mjeseca od posljednje izloženosti komarcima. Ako je redovita primjena propuštena ili je mjesečni interval prekoračen, veterinarski lijek treba odmah primijeniti, a mjesečnu primjenu nastaviti u pravilnim razmacima, kako bi se razvoj odraslih oblika srčanog crva sveo na najmanju moguću mjeru. Ako trenutni veterinarski lijek kojim se vrši prevencija srčanog crva zamjenjujemo ovim veterinarskim lijekom, tada prva doza ovog veterinarskog lijeka mora biti primijenjena unutar jednog mjeseca od posljednje doze prethodnog veterinarskog lijeka.

Liječenje infestacije oblicima (psi i mačke):

Primijeniti jednu dozu ovog veterinarskog lijeka.

Liječenje infestacije paušima (psi i mačke):

Primijeniti jednu dozu ovog veterinarskog lijeka.

Liječenje infestacije ušnim šugarcima (mačke):

Primijeniti jednu dozu ovog veterinarskog lijeka.

Liječenje ušnih šugaraca (psi):

Primijeniti jednu dozu ovog veterinarskog lijeka. Vanjski ušni kanal treba nježno očistiti za vrijeme liječenja. Preporučuje se veterinarski pregled ušiju 30 dana nakon primjene, jer je kod nekih životinja potrebno ponoviti primjenu.


Liječenje infestacije kukastim crvima (mačke):

Primijeniti jednu dozu ovog veterinarskog lijeka.

Liječenje sarkoptes šuge (psi):

Za potpuno uklanjanje šugaraca sa životinje, potrebno je primijeniti jednu dozu ovog veterinarskog lijeka tijekom dva mjeseca uzastopno.

Primijeniti na kožu na bazi vrata, ispred lopatica.



Kako primijeniti:

Izvaditi pipetu veterinarskog lijeka iz zaštitnog pakiranja.

1 – Držeći pipetu uspravno, uklonite poklopac.

2 – Okrenuti poklopac i drugu stranu poklopca vratiti na pipetu. Pritisnuti poklopac prema dolje kako bi otvorili pipetu.

Ukloniti poklopac prije primjene.

3 – Razmaknuti dlaku na bazi vrata, ispred lopatica tako da koža postane vidljiva.

Staviti vrh pipete veterinarskog lijeka izravno na kožu, bez masaže. Pritisnuti pipetu i isprazniti njen sadržaj na jedno mjesto. Izbjegavati dodir veterinarskog lijeka i prstiju.

3.10 Simptomi predoziranja (i, ako je primjenjivo, hitni postupci i antidoti)

Nisu primijećeni neželjeni učinci niti nakon primjene 10 puta veće doze selamektina od preporučene. Također, nisu primijećeni neželjeni učinci niti nakon primjene 3 puta veće doze selamektina od preporučene, kod infestacije odraslim oblicima srčanog crva kod pasa i mačaka. Selamektin je, isto tako, primijenjen u 3 puta većoj dozi od preporučene rasplodnim mužjacima i ženkama pasa i mačaka, uključujući gravidne i ženke u laktaciji te u 5 puta većoj dozi od preporučene škotskim ovčarima (engl. *collies*) osjetljivim na ivermektin. Neželjeni učinci nisu primijećeni.

3.11 Posebna ograničenja za primjenu i posebni uvjeti primjene, uključujući ograničenja primjene antimikrobnih i antiparazitskih veterinarskih lijekova kako bi se ograničio rizik od razvoja rezistencije

Nije primjenjivo.

3.12 Karencije

Nije primjenjivo.

4. FARMAKOLOŠKI PODATCI

4.1 ATCvet kôd: QP54AA05.

4.2 Farmakodinamika

Selamektin je polusintetički proizvod iz skupine avermektina. Selamektin paralizira i/ili ubija široki spektar bezkralježnih parazita ometajući normalnu provodljivost njihovih kloridnih kanala, što dovodi do poremećaja u normalnom provođenju živčanih signala. Ovaj učinak koči električnu aktivnost živčanih stanica oblića i mišićnim stanicama člankonožaca, a što dalje vodi u njihovu paralizu i/ili smrt.

Selamektin ubija jajašca, larve i odrasle oblike buha. To znači da učinkovito prekida životni ciklus buha ubijajući odrasle buhe (na životinji), sprečavajući polaganje jajašaca (na životinji i u okolini životinje) i ubijajući ličinke (u okolini životinje). Stare stanice kože i prašina s kućnih ljubimaca na kojima je primijenjen selamektin, ubijaju jajašca i ličinke buha koje prethodno nisu bile izložene selamektinu, te tako pomažu kontroli infestacije buhama u prostorima kojima životinja ima pristup.

Ima učinak i protiv ličinki srčanog crva.

4.3 Farmakokinetika

Nakon primjene nakapavanjem, selamektin se upija kroz kožu i najvišu koncentraciju u krvnoj plazmi doseže za 1-3 dana nakon primjene kod pasa i mačaka.

Nakon primjene i upijanja kroz kožu, selamektin se širi kroz organizam putem krvotoka i polako se izlučuje iz plazme pasa i mačaka kroz 30 dana nakon primjene jedne doze od 6 mg/kg. Produženo djelovanje i sporo izlučivanje selamektina iz plazme odražavaju se u vrijednostima završnog poluvremena eliminacije od 8 odnosno, 11 dana kod mačaka i pasa. Sustavna nazočnost selamektina u plazmi i odsutnost opsežnog metabolizma pruža učinkovitu koncentraciju selamektina tijekom cijelog intervala između doza (30 dana).

5. FARMACEUTSKI PODATCI

5.1 Glavne inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

5.2 Rok valjanosti

Rok valjanosti veterinarskog lijeka kad je zapakiran za prodaju: 3 godine

5.3. Posebne mjere čuvanja

Čuvati u neotvorenoj vrećici na suhom radi zaštite od svjetla i vlage.
Ovaj veterinarski lijek nije potrebno čuvati na određenoj temperaturi.

5.4 Vrsta i sastav unutarnjeg pakiranja

Veterinarski lijek dolazi u pakiranju od 1, 4 i 24 pipete (sve veličine pipeta). Veterinarski lijek je u polipropilenskoj pipeti s jednom dozom, umotanoj u aluminijsku vrećicu.

1 pipeta EVICTO 15 mg za pse i mačke sadržava 0,25 mL otopine od 60 mg/mL

1 pipeta EVICTO 45 mg za mačke sadržava 0,75 mL otopine od 60 mg/mL

1 pipeta EVICTO 60 mg za mačke sadržava 1,0 mL otopine od 60 mg/mL

1 pipeta EVICTO 30 mg za pse sadržava 0,25 mL otopine od 120 mg/mL

1 pipeta EVICTO 60 mg za pse sadržava 0,5 mL otopine od 120 mg/mL

1 pipeta EVICTO 120 mg za pse sadržava 1,0 mL otopine od 120 mg/mL

1 pipeta EVICTO 240 mg za pse sadržava 2,0 mL otopine od 120 mg/mL

1 pipeta EVICTO 360 mg za pse sadržava 3,0 mL otopine od 120 mg/mL

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

5.5 Posebne mjere opreza u pogledu zbrinjavanja neiskorištenih veterinarskih lijekova ili otpadnih materijala nastalih primjenom takvih proizvoda

Veterinarski lijekovi ne smiju se odlagati u otpadne vode ili kućni otpad.

Veterinarski lijek ne smije dospjeti u vodene tokove jer selamektin može biti opasan za ribe i druge vodene organizme.

Koristite programe vraćanja proizvoda za sve neiskorištene veterinarske lijekove ili otpadne materijale nastale njihovom primjenom u skladu s lokalnim propisima i svim nacionalnim sustavima prikupljanja primjenjivima na dotični veterinarski lijek.

6. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

VIRBAC

7. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/19/242/001-024

8. DATUM PRVOG ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 19/07/2019

9. DATUM POSLJEDNJE REVIZIJE SAŽETKA OPISA SVOJSTAVA

{DD/MM/GGGG}

10. KLASIFIKACIJA VETERINARSKIH LIJEKOVA

Veterinarski lijek izdaje se na veterinarski recept.

Detaljne informacije o ovom veterinarskom lijeku dostupne su u Unijinoj bazi podataka o proizvodima (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary/hr>).

PRILOG II.

OSTALI UVJETI I ZAHTJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Nema.

PRILOG III.

OZNAČIVANJE I UPUTA O VETERINARSKOM LIJEKU

A. OZNAČIVANJE

PODATCI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA 15 MG (1, 4 I 24 PIPETE)

1. NAZIV VETERINARSKOG LIJEKA

Evicto 15 mg otopina za nakapavanje

2. DJELATNE TVARI

Selamektin 15 mg/pipeta

3. VELIČINA PAKIRANJA

1 pipeta
4 pipete
24 pipete

x 0,25 mL

4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mačke i psi ≤ 2.5 kg

5. INDIKACIJE

6. PUTOVI PRIMJENE

Nakapavanjem.

7. KARENCIJE

8. ROK VALJANOSTI

Exp. {mm/gggg}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u neotvorenoj vrećici na suhom radi zaštite od svjetla i vlage.

10. RIJEČI „PRIJE PRIMJENE PROČITAJTE UPUTU O VETERINARSKOM LIJEKU”

Prije primjene pročitajte uputu o veterinarskom lijeku.

11. RIJEČI „SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

12. RIJEČI „ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

13. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

VIRBAC

14. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/19/242/001

EU/2/19/242/002

EU/2/19/242/003

15. BROJ SERIJE

Lot {broj}

PODATCI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA 30 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg (1, 4 I 24 PIPETE)

1. NAZIV VETERINARSKOG LIJEKA

Evicto 30 mg otopina za nakapavanje
Evicto 60 mg otopina za nakapavanje
Evicto 120 mg otopina za nakapavanje
Evicto 240 mg otopina za nakapavanje
Evicto 360 mg otopina za nakapavanje

2. DJELATNE TVARI

Selamektin 30 mg/pipeta
Selamektin 60 mg/pipeta
Selamektin 120 mg/pipeta
Selamektin 240 mg/pipeta
Selamektin 360 mg/pipeta

3. VELIČINA PAKIRANJA

1 pipeta
4 pipete
24 pipete

x 0,25 mL
x 0,5 mL
x 1,0 mL
x 2,0 mL
x 3,0 mL

4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi 2,6–5,0 kg
Psi 5,1–10,0 kg
Psi 10,1–20,0 kg
Psi 20,1–40,0 kg
Psi 40,1–60,0 kg

5. INDIKACIJE

6. PUTOVI PRIMJENE

Nakapavanjem.

7. KARENCIJE

8. ROK VALJANOSTI

Exp. {mm/gggg}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u neotvorenoj vrećici na suhom radi zaštite od svjetla i vlage.

10. RIJEČI „PRIJE PRIMJENE PROČITAJTE UPUTU O VETERINARSKOM LIJEKU”

Prije primjene pročitajte uputu o veterinarskom lijeku.

11. RIJEČI „SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

12. RIJEČI „ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

13. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

VIRBAC

14. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/19/242/010

EU/2/19/242/011

EU/2/19/242/012

EU/2/19/242/013

EU/2/19/242/014

EU/2/19/242/015

EU/2/19/242/016

EU/2/19/242/017

EU/2/19/242/018

EU/2/19/242/019

EU/2/19/242/020

EU/2/19/242/021

EU/2/19/242/022

EU/2/19/242/023

EU/2/19/242/024

15. BROJ SERIJE

Lot {broj}

PODATCI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA 45 mg, 60 mg (1, 4 I 24 PIPETE)

1. NAZIV VETERINARSKOG LIJEKA

Evicto 45 mg otopina za nakapavanje
Evicto 60 mg otopina za nakapavanje

2. DJELATNE TVARI

Selamektin 45 mg/pipeta
Selamektin 60 mg/pipeta

3. VELIČINA PAKIRANJA

1 pipeta
4 pipete
24 pipete

x 0,75 mL
x 1,0 mL

4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Mačke 2,6–7,5 kg
Mačke 7,6–10,0 kg

5. INDIKACIJE

6. PUTOVI PRIMJENE

Nakapavanjem.

7. KARENCIJE

8. ROK VALJANOSTI

Exp. {mm/gggg}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u neotvorenoj vrećici na suhom radi zaštite od svjetla i vlage.

10. RIJEČI „PRIJE PRIMJENE PROČITAJTE UPUTU O VETERINARSKOM LIJEKU”

Prije primjene pročitajte uputu o veterinarskom lijeku.

11. RIJEČI “SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA”

Samo za primjenu na životinjama.

12. RIJEČI “ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

13. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

VIRBAC

14. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/19/242/004

EU/2/19/242/005

EU/2/19/242/006

EU/2/19/242/007

EU/2/19/242/008

EU/2/19/242/009

15. BROJ SERIJE

Lot {broj}

**OSNOVNI PODATCI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM
PAKIRANJIMA**

Vrećice 15 mg, 30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg

1. NAZIV VETERINARSKOG LIJEKA

Evicto



≤ 2,5 kg

2,6–5,0 kg

2,6–7,5 kg

7,6–10,0 kg

5,1–10,0 kg

10,1–20,0 kg

20,1–40,0 kg

40,1–60,0 kg

2. KVANTITATIVNI PODATCI O DJELATNIM TVARIMA

15 mg

30 mg

45 mg

60 mg

120 mg

240 mg

360 mg

3. BROJ SERIJE

Lot {broj}

4. ROK VALJANOSTI

Exp. {mm/gggg}

B. UPUTA O VETERINARSKOM LIJEKU

UPUTA O VETERINARSKOM LIJEKU

1. Naziv veterinarskog lijeka

Evicto 15 mg otopina za nakapavanje za pse i mačke $\leq 2,5$ kg
Evicto 30 mg otopina za nakapavanje za pse 2,6 – 5,0 kg
Evicto 45 mg otopina za nakapavanje za mačke 2,6 – 7,5 kg
Evicto 60 mg otopina za nakapavanje za mačke 7,6 – 10,0 kg
Evicto 60 mg otopina za nakapavanje za pse 5,1 – 10,0 kg
Evicto 120 mg otopina za nakapavanje za pse 10,1 – 20,0 kg
Evicto 240 mg otopina za nakapavanje za pse 20,1 – 40,0 kg
Evicto 360 mg otopina za nakapavanje za pse 40,1 – 60,0 kg

2. Sastav

Svaka doza (pipeta) sadržava:

Djelatne tvari:

Evicto 15 mg za pse i mačke	60 mg/mL otopina	Selamektin	15 mg
Evicto 30 mg za pse	120 mg/mL otopina	Selamektin	30 mg
Evicto 45 mg za mačke	60 mg/mL otopina	Selamektin	45 mg
Evicto 60 mg za mačke	60 mg/mL otopina	Selamektin	60 mg
Evicto 60 mg za pse	120 mg/mL otopina	Selamektin	60 mg
Evicto 120 mg za pse	120 mg/mL otopina	Selamektin	120 mg
Evicto 240 mg za pse	120 mg/mL otopina	Selamektin	240 mg
Evicto 360 mg za pse	120 mg/mL otopina	Selamektin	360 mg

Pomoćne tvari:

Butilhidroksitoluen 0,8 mg/mL

Bezbojna do žuta otopina.

3. Ciljne vrste životinja

Psi i mačke



4. Indikacije za primjenu

Psi i mačke:

- Liječenje i prevencija infestacije buhama uzrokovane sa *Ctenocephalides* spp. kroz mjesec dana, nakon jednokratne primjene. Veterinarski lijek djeluje na odrasle oblike, larve i jajašca. Djeluje na jajašca kroz 3 tjedna nakon primjene. Zbog smanjenja populacije buha, mjesečna primjena kod gravidnih životinja i životinja koje doje mladunčad će pomoći kod sprječavanja infestacije mladunčadi buhama do sedmog tjedna starosti. Veterinarski lijek se može koristiti i kao dio strategije liječenja alergijskog dermatitisa izazvanog buhama, ali zbog svojeg djelovanja na ličinke i jajašca, može se koristiti i kao pomoć u rješavanju nazočnosti buha u prostorima kojim životinja ima pristup.

- Prevencija bolesti izazvane srčanim crvima uzrokovane sa *Dirofilaria immitis* kroz mjesečnu primjenu. Veterinarski lijek se neškodljivo može primijeniti životinjama koje su već infestirane odraslim oblicima srčanih crva, no, preporučuje se, u skladu s dobrom veterinarskom praksom, da sve životinja starije od 6 mjeseci, a koje žive na prostorima na kojima je poznato da ima prenosioca srčanih crva, prije primjene ovog veterinarskog lijeka budu testirane na nazočnost odraslih oblika srčanih crva. Također se preporučuje da se pse povremeno testira na nazočnost srčanih crva kao dio strategije borbe protiv srčanog crva, čak i kada se veterinarski lijek redovito mjesečno primjenjuje. Veterinarski lijek nije učinkovit protiv odraslih oblika *D. immitis*.
- Liječenje ušnih šugaraca (*Otodectes cynotis*).

Mačke:

- Liječenje infestacije mačijom paušima (*Felicola subrostratus*).
- Liječenje infestacije odraslim crijevnim oblicima (*Toxocara cati*).
- Liječenje infestacije s odraslim kukastim crvima (*Ancylostoma tubaeforme*).

Psi:

- Liječenje infestacije psećom paušima (*Trichodectes canis*).
- Liječenje sarkoptes šuge (uzrokovane sa *Sarcoptes scabiei*).
- Liječenje invazije odraslim crijevnim oblicima (*Toxocara canis*).

5. Kontraindikacije

Ne primjenjivati u životinja mlađih od 6 tjedana. Ne primjenjivati u bolesnih mačaka i mačaka koje su iscrpljene i mršave (obzirom na veličinu i dob). Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar ili na bilo koju pomoćnu tvar.

6. Posebna upozorenja

Posebna upozorenja:

Životinje je moguće okupati 2 sata nakon primjene ovog veterinarskog lijeka bez opasnosti od gubitka učinkovitosti.

Ne primjenjivati kada je životinjska dlaka mokra, no ipak uporaba šampona na životinji 2 ili više sati nakon primjene neće umanjiti učinkovitost veterinarskog lijeka.

Kod terapije ušnih šugaraca, ne primjenjivati veterinarski lijek direktno u ušni kanal.

Posebne mjere opreza za neškodljivu primjenu u ciljnih vrsta životinja:

Ovaj veterinarski lijek primjenjuje se isključivo na površinu kože. Ne primjenjivati kroz usta ili parenteralno.

Držati životinje udaljene od vatre ili drugih zapaljivih izvora najmanje 30 minuta od primjene ili dok se dlaka u potpunosti ne osuši.

Vrlo je važno da veterinarski lijek bude točno doziran po uputi kako bi se u najvećoj mjeri smanjila količina veterinarskog lijeka koju životinja može polizati. Ako životinja polize veću količinu veterinarskog lijeka može se, kod mačaka, rijetko, pojaviti kratkotrajno pojačano slinjenje.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarski lijek u životinja:

Ovaj veterinarski lijek je jako zapaljiv; držati dalje od izvora topline, iskrenja, otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Ne pušiti, jesti i piti dok rukujete ovim veterinarskim lijekom.

Ovaj veterinarski lijek nadražuje kožu i oči. Nakon rukovanja oprati ruke. U slučaju dodira veterinarskog lijeka s kožom, odmah oprati kožu vodom i sapunom. U slučaju nehotičnog kontakta s očima, odmah isprati vodom i potražiti savjet liječnika te mu pokazati uputu o veterinarskom lijeku ili etiketu.

Izbjegavajte direktan dodir sa životinjama dok se mjesto primjene u potpunosti ne osuši. Na dan primjene, djeci ne treba dozvoliti da rukuju s tretiranim životinjama, a životinjama ne treba dozvoliti da spavaju s vlasnicima, posebno s djecom. Potrošene pipete treba odmah ukloniti i ne ostavljati ih unutar pogleda i dohvata djece.

Osobe preosjetljive na selamektin trebaju oprezno primjenjivati veterinarski lijek.

Posebne mjere opreza za zaštitu okoliša:

Ne dopuštati životinjama na kojima je primijenjen ovaj veterinarski lijek da se kupaju u otvorenim vodama najmanje 2 sata nakon primjene.

Graviditet i laktacija:

Može se primijeniti tijekom graviditeta i laktacije.

Plodnost:

Može se primijeniti u rasplodnih životinja.

Interakcija s drugim veterinarskim lijekovima i drugi oblici interakcije:

Nisu poznate.

Predoziranje:

Nisu primijećeni neželjeni učinci niti nakon primjene 10 puta veće doze selamektina od preporučene. Također, nisu primijećeni neželjeni učinci niti nakon primjene 3 puta veće doze selamektina od preporučene, kod infestacije odraslim oblicima srčanog crva u pasa i mačaka. Selamektin je, isto tako, primijenjen u 3 puta većoj dozi od preporučene rasplodnim mužjacima i ženkama pasa i mačaka, uključujući gravidne i ženke u laktaciji te u 5 puta većoj dozi od preporučene škotskim ovčarima (engl. *collies*) osjetljivim na ivermektin. Neželjeni učinci nisu primijećeni.

7. Štetni događaji

Mačke:

Rijetko (1 do 10 životinja/ 10 000 tretiranih životinja):
alopecija (gubitak dlake) na mjestu primjene ^{1,2} , promjena dlake na mjestu primjene ³ hipersalivacija (pojačano slinjenje) ⁴
Vrlo rijetko (< 1 životinja / 10 000 tretiranih životinja, uključujući izolirane slučajeve):
nadraženosť na mjestu primjene ^{1,5} neurološki znaci ⁶ (npr. epileptički napadaj)

Psi:

Rijetko (1 do 10 životinja/ 10 000 tretiranih životinja):
promjena dlake na mjestu primjene ³
Vrlo rijetko (< 1 životinja / 10 000 tretiranih životinja, uključujući izolirane slučajeve):

neurološki znaci⁶ (npr. epileptički napadaj)

¹ Obično prolazi sama, ali u nekim slučajevima može biti potrebno primijeniti simptomatsko liječenje.

² Blaga i prolazna.

³ Lokalno prolazno sljepljivanje dlake na mjestu primjene i/ili povremena pojava male količine bijelog praha koji obično nestaje unutar 24 sata od primjene terapije i ne utječe na neškodljivost ili učinkovitost veterinarskog lijeka.

⁴ Kratkotrajna, ako životinja poliže veću količinu.

⁵ Prolazna i fokalna.

⁶ Reverzibilni kao i kod ostalih makrocikličkih laktona.

Važno je prijaviti štetne događaje. Time se omogućuje kontinuirano praćenje neškodljivosti proizvoda. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, čak i onu koja nije navedena u ovoj uputi o veterinarskom lijeku, ili mislite da veterinarski lijek nije djelovao, obratite se prvo veterinaru. Štetne događaje možete prijaviti i nositelju odobrenja za stavljanje u promet ili njegovom lokalnom predstavniku koristeći se podacima za kontakt na kraju ove upute ili putem nacionalnog sustava za prijavljivanje: {podatci o nacionalnom sustavu}

8. Doziranje za svaku ciljnu vrstu životinja, putovi i način primjene

Nakapavanjem.

Primijeniti na kožu na bazi vrata, ispred lopatica.

Ovaj veterinarski lijek treba primjenjivati jednokratno jednu dozu primjenjujući najmanje 6 mg/kg selamektina. Ako postoji istovremena infestacija ili infekcija kod iste životinje, a za koju je potrebna primjena veterinarskog lijeka, samo jednu dozu ovog veterinarskog lijeka u preporučenoj količini od 6 mg/kg treba primijeniti u bilo koje vrijeme. Dužina primjene za svakog parazita je pokazana u tablici dolje.

Primjenjivati veterinarski lijek prema tablici:

Mačke (kg)	Proizvod	Mg selamektina	Jačina (mg/ml)	Primijenjena količina (nominalna veličina pipete, ml)
≤ 2,5	1 pipeta Evicto 15 mg za pse i mačke ≤ 2,5 kg	15	60	0,25
2,6-7,5	1 pipeta Evicto 45 mg za mačke 2,6-7,5 kg	45	60	0,75
7,6-10,0	1 pipeta Evicto 60 mg za mačke 7,6-10,0 kg	60	60	1,0
> 10	Odgovarajuća kombinacija pipeta	Odgovarajuća kombinacija pipeta	60	Odgovarajuća kombinacija pipeta

Psi (kg)	Proizvod	Mg selamektina	Jačina (mg/ml)	Primijenjena količina (nominalna veličina pipete, ml)
≤ 2,5	1 pipeta Evicto 15 mg za pse i mačke ≤ 2,5 kg	15	60	0,25
2,6-5,0	1 pipeta Evicto 30 mg za pse 2,6-5,0 kg	30	120	0,25
5,1-10,0	1 pipeta Evicto 60 mg za pse 5,1-10,0 kg	60	120	0,5
10,1-20,0	1 pipeta Evicto 120 mg	120	120	1,0

	za pse 10,1-20,0 kg			
20,1-40,0	1 pipeta Evicto 240 mg za pse 20,1-40,0 kg	240	120	2,0
40,1-60,0	1 pipeta Evicto 360 mg za pse 40,1-60,0 kg	360	120	3,0
> 60	Odgovarajuća kombinacija pipeta	Odgovarajuća kombinacija pipeta	60/120	Odgovarajuća kombinacija pipeta

Liječenje i prevencija buha (psi i mačke):

Životinje starije od 6 tjedana:

Koristeći pravilno upute za primjenu ovog veterinarskog lijeka, odrasle buhe na životinji ugibaju, više neće proizvoditi jajašca sposobna za život. Na ovaj način se zaustavlja razmnožavanje buha, prekida se životni ciklus buha i može pomoći u suzbijanju postojećih infestacija buhama u prostoru u kojem životinja boravi.

Za prevenciju infestacije buhama, ovaj veterinarski lijek treba primjenjivati u mjesečnim intervalima tijekom sezone buha s početkom oko mjesec dana prije početka aktivnosti buha. Time se osigurava da su buhe na životinji ubijene, neće se proizvoditi jajašca sposobna za život, a ličinke (nazočne samo na mjestima gdje životinja boravi) također ugibaju. Na ovaj način se prekida životni ciklus buha i sprečavaju se infestacije.

Ako se koristi kao dio strategije liječenja alergijskog dermatitisa izazvanog buhama, ovaj veterinarski lijek treba primjenjivati u razmacima od mjesec dana.

Liječenje gravidnih i životinja u laktaciji kako bi se spriječila infestacija buhama štenadi i mačića:

Zbog smanjenja količine buha, mjesečna primjena ovog veterinarskog lijeka kod gravidnih i životinja u laktaciji pomoći će spriječiti infestaciju buhama u leglu do sedam tjedana starosti.

Prevencija bolesti srčanog crva (psi i mačke):

Ovaj veterinarski lijek se može primjenjivati tijekom cijele godine ili barem unutar mjeseca u kojem će životinja prvi puta doći u dodir s komarcima, pa do kraja sezone izloženosti komarcima u razmacima od mjesec dana. Posljednja doza mora biti primijenjena unutar jednog mjeseca od posljednje izloženosti komarcima. Ako je redovita primjena propuštena ili je mjesečni interval prekoračen, veterinarski lijek treba odmah primijeniti, a mjesečnu primjenu nastaviti u pravilnim razmacima, kako bi se razvoj odraslih oblika srčanog crva sveo na najmanju moguću mjeru. Ako trenutni veterinarski lijek kojim se vrši prevencija srčanog crva zamjenjujemo ovim veterinarskim lijekom, tada prva doza ovog veterinarskog lijeka mora biti primijenjena unutar jednog mjeseca od posljednje doze prethodnog veterinarskog lijeka.

Liječenje infestacije oblicima (psi i mačke):

Primijeniti jednu dozu ovog veterinarskog lijeka.

Liječenje infestacije paušima (psi i mačke):

Primijeniti jednu dozu ovog veterinarskog lijeka.

Liječenje infestacije ušnim šugarcima (mačke):

Primijeniti jednu dozu ovog veterinarskog lijeka.

Liječenje ušnih šugaraca (psi):

Primijeniti jednu dozu ovog veterinarskog lijeka. Vanjski ušni kanal treba nježno očistiti pri svakoj primjeni. Preporučuje se veterinarski pregled ušiju 30 dana nakon primjene, jer je kod nekih životinja potrebno ponoviti primjenu.


Liječenje infestacije kukastim crvima (mačke):

Primijeniti jednu dozu ovog veterinarskog lijeka.

Liječenje sarkoptes šuge (psi):

Za potpuno uklanjanje šugaraca sa životinje, potrebno je primijeniti jednu dozu ovog veterinarskog lijeka tijekom dva mjeseca uzastopno.

9. Savjeti za ispravnu primjenu



Izvaditi pipetu iz zaštitnog pakiranja.

1 – Držeći pipetu uspravno, uklonite poklopac.

2 – Okrenuti poklopac i drugu stranu poklopca vratiti na pipetu.

Pritisnuti poklopac prema dolje kako bi otvorili pipetu.

Ukloniti poklopac prije primjene.

3 – Razmaknuti dlaku na bazi vrata, ispred lopatica tako da koža postane vidljiva.

Staviti vrh pipete izravno na kožu, bez masaže.

Pritisnuti pipetu i isprazniti njen sadržaj na jedno mjesto. Izbjegavati dodir veterinarskog lijeka i prstiju.

10. Karencije

Nije primjenjivo.

11. Posebne mjere čuvanja

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati u neotvorenoj vrećici na suhom radi zaštite od svjetla i vlage.

Ovaj veterinarski lijek nije potrebno čuvati na određenoj temperaturi.

Ne koristite ovaj veterinarski lijek nakon isteka roka valjanosti naznačenog na pipeti, vrećici i kutiji, nakon Exp. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

12. Posebne mjere za zbrinjavanje

Veterinarski lijekovi ne smiju se odlagati u otpadne vode ili kućni otpad.

Ovaj veterinarski lijek ne smije dospjeti u vodene tokove jer selamektin može biti opasan za ribe i druge vodene organizme.

Koristite programe vraćanja proizvoda za sve neiskorištene veterinarske lijekove ili otpadne materijale nastale njihovom primjenom u skladu s lokalnim propisima i svim nacionalnim sustavima prikupljanja. Te bi mjere trebale pomoći u zaštiti okoliša.

Pitajte veterinara ili ljekarnika kako odlagati veterinarske lijekove koji vam više nisu potrebni.

13. Klasifikacija veterinarskih lijekova

Veterinarski lijek izdaje se na veterinarski recept.

14. Brojevi odobrenja za stavljanje u promet i veličine pakiranja

EU/2/19/242/001-024

1 pipeta Evicto 15 mg za pse i mačke sadržava 0,25 mL otopine od 60 mg/mL
1 pipeta Evicto 45 mg za mačke sadržava 0,75 mL otopine od 60 mg/mL
1 pipeta Evicto 60 mg za mačke sadržava 1,0 mL otopine od 60 mg/mL
1 pipeta Evicto 30 mg za pse sadržava 0,25 mL otopine od 120 mg/mL
1 pipeta Evicto 60 mg za pse sadržava 0,5 mL otopine od 120 mg/mL
1 pipeta Evicto 120 mg za pse sadržava 1,0 mL otopine od 120 mg/mL
1 pipeta Evicto 240 mg za pse sadržava 2,0 mL otopine od 120 mg/mL
1 pipeta Evicto 360 mg za pse sadržava 3,0 mL otopine od 120 mg/mL

Veterinarski lijek dolazi u pakiranju od 1, 4 i 24 pipete (sve veličine pipeta).
Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

15. Datum posljednje revizije upute o veterinarskom lijeku

{DD/MM/GGGG}

Detaljne informacije o ovom veterinarskom lijeku dostupne su u Unijinoj bazi podataka o proizvodima (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary/hr>).

16. Podatci za kontakt:

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet i proizvođač odgovoran za puštanje serije u promet:

VIRBAC
1^{ère} avenue 2065m LID
06516 Carros
Francuska

Lokalni predstavnici i podatci za kontakt za prijavu sumnji na štetne događaje:

Za sve informacije o ovom veterinarskom lijeku možete se obratiti lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u promet.

België/Belgique/Belgien
VIRBAC BELGIUM NV
Esperantolaan 4
BE-3001 Leuven
Tél/Tel : +32-(0)16 387 260
phv@virbac.be

Република България
САМ БС ЕООД
Бул. "Д-р Петър Дертлиев" 25, Търговски
център Лабиринт, ет. 5, офис САМ БС ЕООД
BG София 1335
Тел: +359 2 810 0173
sambs@sambs.bg

Česká republika
VIRBAC Czech Republic s.r.o.
Žitavského 496
CZ 156 00 Praha 5
Tel: +420 608 836 529

Danmark
VIRBAC Danmark A/S
Profilvej 1
DK-6000 Kolding
Tlf.: +45 75521244
virbac@virbac.dk

Deutschland
VIRBAC Tierarzneimittel GmbH
Rögen 20
DE-23843 Bad Oldesloe
Tel: 49 (4531) 805 111

Eesti
OÜ ZOOVETVARU
Uusaru 5
EE-76505 Saue/Harjumaa
Tel: + 372 56480207
pv@zoovet.eu

Ελλάδα
VIRBAC HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
13^ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
EL-14452, Μεταμόρφωση
Τηλ: +30 210 6219520
info@virbac.gr

España
VIRBAC ESPAÑA SA
Angel Guimerá 179-181
ES-08950 Esplugues de Llobregat

Lietuva
OÜ ZOOVETVARU
Uusaru 5
76505 Saue/Harjumaa
Estija
Tel: + 372 56480207
pv@zoovet.eu

Luxembourg/Luxemburg
VIRBAC BELGIUM NV
Esperantolaan 4
3001 Leuven
Belgique / Belgien
Tél/Tel: +32-(0)16 387 260
info@virbac.be

Magyarország
VIRBAC HUNGARY KFT
Dózsa György út 84. B épület
HU-1068 Budapest
Tel.: +36703387177
akos.csoman@virbac.hu

Malta
VIRBAC
1^{ère} avenue 2065 m LID
06516 Carros
Franza
Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

Nederland
VIRBAC NEDERLAND BV
Hermesweg 15
NL-3771 ND-Barneveld
Tel: 31-(0) 342 427 127
phv@virbac.nl

Norge
VIRBAC Danmark A/S
Profilvej 1
6000 Kolding
Danmark
Tlf: + 45 75521244
virbac@virbac.dk

Österreich
VIRBAC Österreich GmbH
Hildebrandgasse 27
AT-1180 Wien
Tel: +43-(0)1-218 34 26-0

Polska
VIRBAC Sp. z o.o.
ul. Puławska 314
PL – 02-819 Warszawa

(Barcelona)
Tel: + 34 93 470 79 40

France

VIRBAC France
13^e rue LID
FR-06517 Carros
Tél : 0 800 73 09 10

Hrvatska

CENTRALNA VETERINARSKA AGENCIJA
d.o.o. (CVA)
Prve Ravnice 2e,
HR-10000 Zagreb
Tel: + 385 91 46 55 112
cva@cva.hr

Ireland

VIRBAC IRELAND
McInerney & Saunders
38, Main Street
Swords, Co Dublin
K67E0A2-IE
Tel: +44 (0)-1359 243243

Ísland

VIRBAC
1^{ère} avenue 2065 m LID
06516 Carros
Frakkland
Simi: + 33-(0)4 92 08 73 00

Italia

VIRBAC S.r.l
Via Ettore Bugatti, 15
IT-20142 Milano
Tel: +39 02 40 92 47 1

Κύπρος

VET2VETSUPPLIES LTD
Γαλλιαίου 60
CY-3011 Λεμεσός
Τηλ: + 357 96116730
info@vet2vetsupplies.com

Latvija

OÜ ZOOVETVARU
Uusaru 5
76505 Saue/Harjumaa
Igaunija
Tel: + 372 56480207
pv@zoovet.eu

Tel.: + 48 22 855 40 46

Portugal

VIRBAC de Portugal Laboratórios, Lda.
Rua do Centro Empresarial
Edif.13-Piso 1- Escrit.3
Quinta da Beloura
PT-2710-693 Sintra
Tel: +351 219 245 020

România

Altius SA
Str. Zăgazului nr. 21-25, Corp A, et 8 si 8A
Ap. A.8.2, sect 1, București, cod 014261 – RO
Tel: + 40 21 310 88 80

Slovenija

MEDICAL INTERTRADE d.o.o.
Brodišče 12,
SI-1236 Trzin
Tel: + 386 1 2529 113
farmakovigilanca@medical-intertrade.si

Slovenská republika

VIRBAC Czech Republic s.r.o.
Žitavského 496
156 00 Praha 5
Česká republika
Tel: +420 608 836 529

Suomi/Finland

BIOFARM OY
Yrittäjätie 20
FI-03600 Karkkila
Puh/Tel: +358-9-225 2560
haittavaikutukset@biofarm.fi

Sverige

VIRBAC Danmark A/S Filial Sverige
Box 1027
SE-171 21 Solna
Tel: +45 75521244
virbac@virbac.dk

United Kingdom (Northern Ireland)

VIRBAC IRELAND
McInerney & Saunders
38, Main Street
Swords, Co Dublin
K67E0A2
Republic Of Ireland
Tel: +44 (0)-1359 243243