

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

RILEXINE TS 375 mg - Suspension zur intramammären Anwendung für Rinder
Cefalexin

2. WIRKSTOFF(E)

1 Euterinjektor enthält:
Cefalexin (als Cefalexin-Benzathin) 375 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Suspension zur intramammären Anwendung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

4 oder 12 Injektoren mit Reinigtüchern

5. ZIELTIERART(EN)

Rinder (trockenstehende Milchkühe)

6. ART(EN) DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
Zur intramammären Anwendung.

Zusatzinformation zur Anwendung der variablen Zitzenkanüle

Durch die variable Zitzenkanüle kann der Anwender wahlweise zwischen zwei verschiedenen Kanülenlängen bzw. Instillationsmöglichkeiten wählen. Die Anwendung erfolgt gemäß nachfolgender Gebrauchsinformation:

A) Lange Kanüle

1. Schutzkappe an Teil b fassen und
durch seitliches Abbiegen lösen.

B) Kurze Kanüle

1. Schutzkappe an Teil a fassen und
durch Drehen lösen.

2. Gesamte Schutzkappe (Teil a und Teil b) abziehen.
3. Kanüle auf voller Länge in die Zitzenzisterne einführen.

2. Teil a der Schutzkappe abziehen.
3. Nur das kurze Kanülenstück in den Zitzenkanal einführen.

7. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en):

Essbare Gewebe: 4 Tage

Milch: Applikation früher als 42 Tage vor dem Abkalben: 12 Stunden ab Laktationsbeginn.

Applikation innerhalb von 42 Tagen vor dem Abkalben: 42,5 Tage ab Verabreichung.

8. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

9. VERFALLDATUM

Verw.bis {MM/JJJJ}>

10. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 30°C lagern.

Vor Licht schützen.

11. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

12. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Rezept- und apothekenpflichtig.

13. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

14. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS
--

Virbac

1^{ère} Avenue – 2065 m – L.I.D.

06516 Carros

Frankreich

Vertrieb: Virbac Österreich GmbH - A-1180 Wien

15. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z. Nr.: 8-00199

16. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

Behältnis (10 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

RILEXINE TS 375 mg - Suspension zur intramammären Anwendung für Rinder

2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

Cefalexin (als Cefalexin-Benzathin) 375 mg

3. INHALT (GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL)

1 Euterinjektor (8 g)

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Zur intramammären Anwendung.

Zur Anwendung während des Trockenstellens.

Vor Gebrauch schütteln.

5. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en):

Essbare Gewebe: 4 Tage

Milch: Applikation früher als 42 Tage vor dem Abkalben: 12 Stunden ab Laktationsbeginn.

Applikation innerhalb von 42 Tagen vor dem Abkalben: 42,5 Tage ab Verabreichung.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verw.bis {MM/JJJJ}>

8. VERMERK "FÜR TIERE"

Für Tiere.