

**B. PACKUNGSBEILAGE**

**1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST**

Registrierungsinhaber: Oropharma n.v., Kapellestraat 70, BE-9800 Deinze.

Hersteller: Laboratoria Smeets, Fotografielaan 42, BE-2610 Wilrijk.

**2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Trichocure®

**3. ARZNEILICH WIRKSAME(R) BESTANDTEIL(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

Ein Tablette enthält: Ronidazole 5 mg - Natr. benzoas - Silica colloid. anhydr. - Maydis amylum q.s. ad 100 mg.

**4. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

Behandlung von Trichomonosis bei Tauben, die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

**5. GEGENANZEIGEN**

Das Produkt nicht zu verwenden bei Tauben die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

**6. NEBENWIRKUNGEN**

Bei der Verabreichung von Ronidazol an Sporttauben wurden keine spezifischen Nebenwirkungen festgestellt.

**7. ZIELTIERART(EN)**

Tauben, die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

**8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**

10 mg / kg. 1 Tablette pro Taube nach dem Füttern unmittelbar in den Schnabel bringen. Bei schwerem Befall 2 Tage später noch mal wiederholen. Eventuell nach einer Woche noch mal wiederholen.

*Systematische Behandlung:*

1 Tablette (10 mg/kg) TRICHOCURE pro Taube unmittelbar in den Schnabel bringen:

- nach einem Preisflug mit langfristigem Aufenthalt in den Tragekörben
- beim Ankauf
- während der Flugsaison: jede 14 Tage
- bei der Entwöhnung des Jungen.

**9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**

1 Tablette TRICHOCURE pro Taube unmittelbar in den Schnabel bringen nach dem Füttern.

**10. WARTEZEIT**

Nur zu verwenden bei Tauben die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Der Verzehr von Tauben behandelt mit Trichocure kann Probleme für die Gesundheit des Konsumenten verursachen.

**11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Bei Zimmertemperatur lagern (15 - 25°C).

**12. BESONDERE WARNHINWEISE**

**i) Spezielle Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei den für eine Behandlung geeigneten Tieren**

TRICHOCURE ist stets nach dem Füttern zu verabreichen, um eine langfristige Wirkung zu erzielen. Die Trinknäpfe sind gründlich zu reinigen, um erneute Infektionen zu verhindern. Bei einer Infektion sind alle Tauben des Taubenschlags gleichzeitig zu behandeln. Der Verzehr von Tauben, die mit TRICHOCURE behandelt wurden, kann eine Gefahr für die Gesundheit des Konsumenten darstellen.

**ii) Spezielle Vorsorgemaßnahmen, die von demjenigen zu ergreifen sind, der das Heilmittel den Tieren verabreicht**

Keine.

**iii) Sonstige Vorsorgemaßnahmen**

Keine.

**13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Man soll die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen nehmen, so dass nicht-angewendete-Produkten nicht in die Umwelt hinkommen.

**14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

02/2012.

**15. WEITERE ANGABEN**

Tierärztliche Verwendung  
Rezeptpflichtig

BE-V168332