

Gebrauchsinformation

furazolidon-t
Kapseln
12,5 mg

Hartkapseln für Brieftauben

MIT Gesundheit GmbH

Gebrauchsinformation

furazolidon-t
Kapseln
12,5 mg

Hartkapseln für Brieftauben

MIT Gesundheit GmbH

Gebrauchsinformation

furazolidon-t
Kapseln
12,5 mg

Hartkapseln für Brieftauben

MIT Gesundheit GmbH

Gebrauchsinformation

Name und Anschrift des

Zulassungsinhabers

MIT Gesundheit GmbH, Thaerstraße 4a,
D-47533 Kleve

Bezeichnung des Tierarzneimittels

furazolidon-t **12,5 mg**
Hartkapseln für Brieftauben

Wirkstoff und sonstige Bestandteile

1 Hartkapsel enthält:
Wirkstoff: Furazolidon 12,5 mg

Anwendungsgebiete

Zur Behandlung von Infektionen des Magen-Darm-Traktes, hervorgerufen durch *Escherichia coli* bei Brieftauben. Die Anwendung von **furazolidon-t** Kapseln sollte unter Berücksichtigung eines Antibiogramms erfolgen.

Gebrauchsinformation

Name und Anschrift des

Zulassungsinhabers

MIT Gesundheit GmbH, Thaerstraße 4a,
D-47533 Kleve

Bezeichnung des Tierarzneimittels

furazolidon-t **12,5 mg**
Hartkapseln für Brieftauben

Wirkstoff und sonstige Bestandteile

1 Hartkapsel enthält:
Wirkstoff: Furazolidon 12,5 mg

Anwendungsgebiete

Zur Behandlung von Infektionen des Magen-Darm-Traktes, hervorgerufen durch *Escherichia coli* bei Brieftauben. Die Anwendung von **furazolidon-t** Kapseln sollte unter Berücksichtigung eines Antibiogramms erfolgen.

Gebrauchsinformation

Name und Anschrift des

Zulassungsinhabers

MIT Gesundheit GmbH, Thaerstraße 4a,
D-47533 Kleve

Bezeichnung des Tierarzneimittels

furazolidon-t **12,5 mg**
Hartkapseln für Brieftauben

Wirkstoff und sonstige Bestandteile

1 Hartkapsel enthält:
Wirkstoff: Furazolidon 12,5 mg

Anwendungsgebiete

Zur Behandlung von Infektionen des Magen-Darm-Traktes, hervorgerufen durch *Escherichia coli* bei Brieftauben. Die Anwendung von **furazolidon-t** Kapseln sollte unter Berücksichtigung eines Antibiogramms erfolgen.

Gegenanzeigen

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. Nicht bei Resistenzen gegenüber 5-Nitrofuranen und 5-Nitroimidazolen anwenden.

Nicht während der Legezeit anwenden. Wegen speziesspezifischer Überempfindlichkeit nicht bei Wasservögeln anwenden.

Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierart

Brieftaube

Gegenanzeigen

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. Nicht bei Resistenzen gegenüber 5-Nitrofuranen und 5-Nitroimidazolen anwenden.

Nicht während der Legezeit anwenden. Wegen speziesspezifischer Überempfindlichkeit nicht bei Wasservögeln anwenden.

Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierart

Brieftaube

Gegenanzeigen

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. Nicht bei Resistenzen gegenüber 5-Nitrofuranen und 5-Nitroimidazolen anwenden.

Nicht während der Legezeit anwenden. Wegen speziesspezifischer Überempfindlichkeit nicht bei Wasservögeln anwenden.

Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierart

Brieftaube

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Hartkapseln zum Eingeben
25 mg Furazolidon / kg Körpergewicht pro Tag entsprechend 1 **furazolidon-t** Kapsel pro Brieftaube (ca. 500 g Körpergewicht) pro Tag.

Um eine bessere Aufnahme der Kapsel zu gewährleisten, wird empfohlen, diese unmittelbar vor der Eingabe in Öl (z. B. Paraffinöl, Speiseöl) zu tauchen. Behandlungsdauer: 5 - 7 Tage
Sollte nach spätestens 3 Behandlungstagen keine deutliche Besserung des Krankheitszustandes eingetreten sein, ist eine Überprüfung der Diagnose und ggf. eine Therapieumstellung durchzuführen.

Hinweise für die richtige Anwendung

Keine Angaben.

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Hartkapseln zum Eingeben
25 mg Furazolidon / kg Körpergewicht pro Tag entsprechend 1 **furazolidon-t** Kapsel pro Brieftaube (ca. 500 g Körpergewicht) pro Tag.

Um eine bessere Aufnahme der Kapsel zu gewährleisten, wird empfohlen, diese unmittelbar vor der Eingabe in Öl (z. B. Paraffinöl, Speiseöl) zu tauchen. Behandlungsdauer: 5 - 7 Tage
Sollte nach spätestens 3 Behandlungstagen keine deutliche Besserung des Krankheitszustandes eingetreten sein, ist eine Überprüfung der Diagnose und ggf. eine Therapieumstellung durchzuführen.

Hinweise für die richtige Anwendung

Keine Angaben.

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Hartkapseln zum Eingeben
25 mg Furazolidon / kg Körpergewicht pro Tag entsprechend 1 **furazolidon-t** Kapsel pro Brieftaube (ca. 500 g Körpergewicht) pro Tag.

Um eine bessere Aufnahme der Kapsel zu gewährleisten, wird empfohlen, diese unmittelbar vor der Eingabe in Öl (z. B. Paraffinöl, Speiseöl) zu tauchen. Behandlungsdauer: 5 - 7 Tage
Sollte nach spätestens 3 Behandlungstagen keine deutliche Besserung des Krankheitszustandes eingetreten sein, ist eine Überprüfung der Diagnose und ggf. eine Therapieumstellung durchzuführen.

Hinweise für die richtige Anwendung

Keine Angaben.

Wartezeit

Entfällt.

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Besondere Warnhinweise

Nicht während der Legezeit anwenden. Wechselwirkungen:

Verstärkung neurotoxischer Wirkungen durch Amprolium und Dinitolamid.

Wartezeit

Entfällt.

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Besondere Warnhinweise

Nicht während der Legezeit anwenden. Wechselwirkungen:

Verstärkung neurotoxischer Wirkungen durch Amprolium und Dinitolamid.

Wartezeit

Entfällt.

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Besondere Warnhinweise

Nicht während der Legezeit anwenden. Wechselwirkungen:

Verstärkung neurotoxischer Wirkungen durch Amprolium und Dinitolamid.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung nicht verwendeter Arzneimittel oder von Abfallmaterialien

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Zulassungsnummer

6671384.00.00

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage

Juni 2025

Weitere Angaben

Packungsgröße: 100 Hartkapseln

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung nicht verwendeter Arzneimittel oder von Abfallmaterialien

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Zulassungsnummer

6671384.00.00

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage

Juni 2025

Weitere Angaben

Packungsgröße: 100 Hartkapseln

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung nicht verwendeter Arzneimittel oder von Abfallmaterialien

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Zulassungsnummer

6671384.00.00

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage

Juni 2025

Weitere Angaben

Packungsgröße: 100 Hartkapseln

Furazolidon-t 12,5 mg

Hartkapseln für Brieftauben

Anwendungsgebiete

Zur Behandlung von Infektionen des Magen-Darm-Traktes, hervorgerufen durch Escherichia coli bei Brieftauben. Die Anwendung von Furazolidon-t Kapseln sollte unter der Berücksichtigung eines Antibiotogramms erfolgen. Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Zusammensetzung

1 Hartkapsel enthält:

Wirkstoff: Furazolidon 12,5 mg

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Hartkapseln zum Eingeben.

25 mg Furazolidon/kg Körpergewicht/Tag entsprechend 1 Furazolidon-t Kapsel pro Brieftaube (ca. 500 g Körpergewicht) pro Tag.

Um eine bessere Aufnahme der Kapseln zu gewährleisten, wird empfohlen, diese unmittelbar vor der Eingabe in Öl (z.B. Paraffinöl, Speiseöl) zu tauchen.

Behandlungsdauer: 5-7 Tage.

Sollte nach spätestens 3 Behandlungstagen keine deutliche Besserung des Krankheitszustandes eingetreten sein, ist eine Überprüfung der Diagnose und ggf. eine Therapieumstellung durchzuführen.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Wartezeit

Entfällt. Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Hinweis:

Für Tiere

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Inhalt: 100 Hartkapseln

Ch.-B.:

Verwendbar bis:

Verschreibungspflichtig

Zul.-Nr.: 6671384.00.00

Vorgeschriebene Dosierung:

MIT Gesundheit GmbH

Thaerstraße 4a

D-47533 Kleeve

**Beschriftung
Blister
Geändert in**

furazolidon-t

Für Brieftauben

Ch.-B.:

Verwendbar bis:

MIT Gesundheit GmbH