

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panacur 222 mg/g granule
Fenbendazolum

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Fenbendazolum 222 mg/g

3. LÉKOVÁ FORMA

Granule

4. VELIKOST BALENÍ

10 x 10 g

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně a skot

6. INDIKACE

Širokospektrální anthelmintikum k léčbě napadení dospělci a larválními stádii nematodů gastrointestinálního a respiračního traktu. Přípravek s ovicidním účinkem na vajíčka hlístic.

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání, zamícháním do krmiva.
Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Ochranné lhůty:

Skot: Maso: 12 dní

Mléko: 6 dní

Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu.

Nepoužívat u klisen, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)**10. DATUM EXSPIRACE**

EXP: {měsíc/rok}

Po zamíchání do krmiva spotřebovat ihned.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nizozemsko

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

10/042/76-S/C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č. šarže: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

sáček

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panacur 222 mg/g granule
Fenbendazolum

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Fenbendazolum 222 mg/g

3. LÉKOVÁ FORMA

Granule

4. VELIKOST BALENÍ

10 g

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně a skot

6. INDIKACE

Širokospektrální anthelmintikum k léčbě napadení dospělci a larválními stádii nematodů gastrointestinálního a respiračního traktu. Přípravek s ovicidním účinkem na vajíčka hlístic.

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání, zamícháním do krmiva.

Koně: obecná dávka je 7,5 mg fenbendazolu /kg ž.hm. (5 g přípravku / 150 kg ž. hm.)
jednorázově.

Při hubení encystovaných larev malých strongylů u koní se přípravek aplikuje v dávce 10 mg fenbendazolu/kg ž.hm. (10 g přípravku / 220 kg ž.hm.) po dobu 5 následujících dnů.

Při léčbě průjmů u hříbat způsobených *Strongyloides westeri* se doporučuje raději použít přípravek Panacur 100 mg/ml perorální suspenze v dávce 50 mg fenbendazolu / kg ž.hm. (5 ml suspenze / 10 kg ž.hm.)

Skot: obecná dávka je 7,5 mg fenbendazolu / kg ž.hm. (5 g přípravku/150 kg ž. hm.)
jednorázově.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Ochranné lhůty:

Skot: Maso: 12 dní

Mléko: 6 dní

Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu.

Nepoužívat u klisen, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Přípravek se nesmí používat po uplynutí vyznačené doby použitelnosti.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Po zamíchání do krmiva spotřebovat ihned.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

10/042/76-S/C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č. šarže: {číslo}