

## BIPACKSEDEL FÖR

### Toltarox vet 50 mg/ml oral suspension för svin

- NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA**

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningsats:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

- DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN**

Toltarox vet 50 mg/ml oral suspension för svin  
toltrazuril

- DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER**

1 ml tjock vit suspension innehåller 50 mg toltrazuril med 2,1 mg natriumbensoat (E211) och 2,1 mg natriumpropionat (E281).

- ANVÄNDNINGSSOMRÅDE(N)**

Förebyggande av kliniska tecken på koccidios hos spädgris (3 – 5 dagar gamla) orsakad av tarmparasiten *Iso spor a suis*, i besättningar där tarmparasiten tidigare förekommit.

- KONTRAIKATIONER**

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot några hjälpämnen.

- BIVERKNINGAR**

Inga kända.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

- DJURSLAG**

Svin (spädgris 3 – 5 dagar gamla).

- DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)**

Varje spädgris behandlas med en engångsdos på 20 mg toltrazuril per kg kroppsvikt under 3:e – 5:e levnadsdygnet, vilket motsvarar 0,4 ml oral suspension per kg kroppsvikt.

## 9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

För oral användning.

Individuell djurbehandling.

Eftersom behandling av spädgris sker individuellt och med små volymer, rekommenderas att en doseringsspruta med en noggrannhet på 0,1 ml används.

Den orala suspensionen måste omskakas före användning.

Behandling under ett sjukdomsutbrott har begränsad effekt, eftersom skada på tunntarmen redan uppstått.

## 10. KARENSTID

Kött och slaktbiprodukter: 77 dagar.

## 11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet i öppnad förpackning: 12 månader.

## 12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

### **Varningar och försiktighet för varje enskild art**

Som med alla antiparasitmedel, kan frekvent och upprepad användning av antiprotozoermedel från samma klass leda till resistensutveckling.

### **Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner**

Inga kända, t.ex. det förekommer inga interaktioner när produkten kombineras med järnsupplement.

### **Överdoser (symptom, nödgärder, antidoter), om nödvändigt**

Tre gånger normaldosen tolereras väl hos spädgris utan symptom på överdosering.

### **Inkompatibiliteter**

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

### **Speciella försiktighetsåtgärder som måste tas av personen som administrerar veterinärläkemedlet till djuren**

Skölj omedelbart bort stänk på huden eller i ögonen med vatten.

## 13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

#### **14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES**

2026-03-01

#### **15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**

Toltarox vet finns tillgängligt i flaskor på 250 ml och 1000 ml.

250 ml levereras i en kartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning:

KRKA Sverige AB  
Götgatan 78, box 24