

BIJSLUITER

Albiotic, oplossing voor intramammair gebruik, voor lacterende koeien

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen :

Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen
België

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte

Biovet Joint Stock Company
39, Petar Rakov Str.
4550 Peshtera
Bulgarije

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Albiotic, oplossing voor intramammair gebruik, voor lacterende koeien

3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Werkzame bestanddelen:

Lincomycini hydrochloridum (= *Lincomycinum* 330 mg) – *Neomycini sulfas* (= *Neomycinum* 100 mg)

Hulpstoffen:

Dinatrii edetas - Aqua ad iniectabilia q.s. ad 10 ml.

4. INDICATIE(S)

Behandeling van mastitis bij lacterende koeien, veroorzaakt door staphylococcen (zowel penicillinase-als niet-penicillinase-producerende stammen), inclusief *Staphylococcus aureus*; streptococcen, o.m. *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae* en *Streptococcus uberis*; en door coliforme bacteriën, inclusief *Escherichia coli*, gevoelig aan lincomycine en/of neomycine.

5. CONTRA-INDICATIE(S)

Niet gebruiken bij dieren die overgevoelig zijn aan lincomycine of neomycine.

6. BIJWERKINGEN

Geen bekend

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Lacterende koeien.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK.

Eén injector van 10 ml per aangetast kwartier, driemaal met een interval van 12 uur.

Wijze van toediening: intramammair, met de nodige voorzorgen i.v.m. de asepsis.

Indien nodig, de tepel(s) of de ganse uier grondig wassen met warm water en een geschikt antisepticum, en grondig afdrogen. Het kwartier volledig uitmelken. De tepeltip ontsmetten met een alcoholdoekje of een ander aangepast desinfectans. Gebruik een nieuw doekje voor elke tepel. Het dopje van de plastic canule verwijderen. Breng de top van de canule in het tepelkanaal. De zuiger volledig neerdrukken om de volledige inhoud van de injector in te brengen, en vervolgens het kwartier zacht masseren om het product tot in de uiercyste te brengen. Na infusie wordt aangeraden alle tepels met een goedgekeurde tepeldip te ontsmetten.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Geen.

10. WACHTTIJD(EN)

Melk: 84 uren

Vlees en Slachtafval : 3 dagen

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHIFTEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Niet bewaren boven 30 °C. Beschermen tegen bevriezing.

Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)*Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren*

De selectie van antibioticaresistentie evolueert bij sommige pathogenen: het gebruik van het product zou moeten gebaseerd zijn op gevoeligheidstesten.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Personen met een overgevoeligheid voor lincosamines of aminoglycosiden wordt aangeraden handschoenen te gebruiken bij de manipulatie van de injector.

Dracht en lactatie

Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Antagonisme met macroliden zou kunnen voorkomen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Het product wordt goed verdragen bij lacterende melkkoeien. Bij accidentele overdosering zijn er geen lokale noch systemische reacties te verwachten; elk teken dat zou kunnen wijzen op mogelijke bijwerkingen moet aan de behandelende dierenarts gemeld worden.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

November 2019

15. OVERIGE INFORMATIE

BE-V202517

Polyethyleen injectoren van 10 ml en alcoholdoekjes om de tepels te ontsmetten.

Doos met 3 x 10 ml, 12 x 10 ml, 24 x 10 ml en 96 x 10 ml.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Op diergeneeskundig voorschrift