

I PRIEDAS
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Nobilis ND C2, liofilizatas akių ir nosies suspensijai ruošti vištomis

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Atskiestos vakcinos dozėje:

veikliosios medžiagos:

gyvo nusilpninto C2 padermės Niukaslo ligos viruso (NDV): 5,7–7,5 log₁₀ EID₅₀*.

*EID₅₀ = 50 % embrionų užkrečianti dozė: viruso titras, reikalingas infekuoti 50 % užkrėstų embrionų.

Pagalbinės medžiagos:

Kokybinė pagalbinių medžiagų ir kitų sudedamųjų medžiagų sudėtis
Sorbitolis
Hidrolizuota želatina
Kasos fermentais apdorotas kazeinas
Dinatrio fosfatas dihidratas
Injekcinis vanduo

Liofilizatas:

Flakonai: baltos arba balkšvos spalvos peletė.

Indeliai: baltas arba balkšvas, daugiausia rutulio formos.

3. KLINIKINĖ INFORMACIJA

3.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Vištos.

3.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Viščiukams aktyviai imunizuoti nuo Niukaslo ligos viruso, norint sumažinti klinikinius požymius ir gaištamumą.

Imuniteto pradžia: 2 sav. po gyvūnų, kurių serologinio tyrimo rezultatai neigiami, vakcinavimo.

Imuniteto trukmė: 5 sav. po gyvūnų, kurių serologinio tyrimo rezultatai neigiami, vakcinavimo.

Nustatyta, kad gyvūnams, turintiems motininių antikūnų, apsauga susidaro praėjus 2 sav. po vakcinavimo.

Imuniteto trukmė priklauso nuo vakcinavimo programos.

3.3. Kontraindikacijos

Negalima vakcinuoti kliniškai sergančių (ypač kvėpavimo takų ligomis) arba streso paveiktų paukščių.

3.4. Specialieji įspėjimai

Vakcinuoti tik sveikus gyvūnus.

3.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims

10 d. po vakcinacijos vakcininis virusas gali plisti tarp nevakcinuotų paukščių. Išplitęs virusas nesukelia klinikinių požymių, tačiau nevakcinuotiems paukščiams gali sukelti serokonversiją.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Vakcina gali būti patogeniška žmonėms. Kadangi ši vakcina paruošta su gyvais, nusilpnintais virusais, reikia imtis atitinkamų priemonių, kad būtų išvengta vakcinės naudotojų ir kitų žmonių, kurie bendradarbiauja šiame procese, užteršimo.

Jeigu naudojama purškiant, dirbant su veterinariniu vaistu reikia dėvėti asmenines apsaugos priemones, kurias sudaro kaukės su akių apsauga.

Po vakcinavimo reikia plauti rankas ir įrangą.

Specialiosios aplinkos apsaugos atsargumo priemonės

Netaikytinos.

3.6. Nepageidaujamos reakcijos

Vištos:

Labai dažna (> 1 iš 10 gydytų gyvūnų)	Galvos purtymas – elgesio sutrikimas ¹ , mirksėjimas ¹ .
--	---

¹ Gali būti pastebimas, kai ledo šaltumo vakcina naudojama į akį ar šnervę lašinimo būdu.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamas reakcijas. Tai leidžia nuolat stebėti veterinarinio vaisto saugumą. Pranešimus, pageidautina, turėtų siųsti veterinarijos gydytojas registruotojui arba nacionalinei kompetentingai institucijai per nacionalinę pranešimų teikimo sistemą. Žr. atitinkamus kontaktinius duomenis pakuotės lapelyje.

3.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Dedantys kiaušinius paukščiai

Negalima naudoti paukščiams kiaušinių dėjimo metu ir 4 sav. iki kiaušinių dėjimo pradžios.

3.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad šią vakciną galima naudoti vienadieniams viščiukams tą pačią dieną, bet negalima maišyti su Innovax-ILT arba gyvomis Nobilis vakcinomis nuo rinotracheito (11/94 padermė). Mareko ligos (CVI988-FC126 padermės) arba infekcinio bronchito (IB Ma5 padermės) vakcinoms yra suderinamos su Nobilis ND C2, kai nemaišomos ir naudojamos pirmą dieną. Mareko ir IB Ma5 vakcinų veiksmingumas nebuvo tirtas.

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad gyvą Nobilis vakciną nuo infekcinės bursos ligos (D78 padermė) galima naudoti 7 d. po vakcinavimo Nobilis ND C2.

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad Nobilis ND C2 galima naudoti vienadieniams viščiukams, kurie yra vakcinuoti Innovax-ND-IBD arba švirkščiant po oda, arba švirkščiant *in ovo*.

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad Nobilis ND C2 galima naudoti vienadieniams viščiukams, kurie yra vakcinuoti Innovax-ND-ILT arba švirkščiant po oda, arba švirkščiant *in ovo*.

Nėra duomenų apie šios vakcinės saugumą ir veiksmingumą naudojant su kitu veterinariniu vaistu, išskyrus anksčiau minėtus produktus. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito veterinarinio vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

3.9. Dozės ir naudojimo būdas

Naudojimui į akį ar šnervę lašinant į šnervę ar akį arba purškiant stambiais lašais.

Reikia vakcinuoti vieną kartą, skiriant po vieną dozę kiekvienam viščiukui nuo 1 d. amžiaus.

Vakcina gali būti tiekiamą kaip liofilizuota peletė stikliniame flakone arba kaip liofilizuoti rutuliukai indeliuose. Jei vaistas yra indeliuose, vaisto negalima naudoti, jeigu indelio turinys yra rusvas ir limpa prie talpyklės, nes tai rodo, kad talpyklės sandarumas buvo pažeistas. Atidarius kiekvienos talpyklės turinys turi būti sunaudotas nedelsiant ir visiškai. Atskiesta suspensija atrodo skaidri.

Naudojimas į akį ar šnervę

Vakciną reikia atskiesti reikiamu kiekiu tinkamo skiediklio ir lašinti standartizuotu lašintuvu (kurio lašelių dydis yra žinomas ir vienodas). Skiedimui galima naudoti sterilų distiliuotą vandenį arba fosfatinį buferizuotą fiziologinį tirpalą. Skiediklio kiekis reikalingas lašų į akį ar šnervę naudojimui priklauso nuo dozių skaičiaus ir lašelių dydžio, tačiau rekomenduojama 1 000 dozių vakciną skiesti maždaug 35 ml skiediklio. Vieną lašą reikia lašinti į vieną šnervę arba į vieną akį. Prieš paleidžiant paukštį, reikia įsitikinti, kad paukštis lašą šnervėje įkvėpė.

Naudojimas purškiant stambiais lašais

Vakciną reikia atskiesti švariame vėsiam vandenyje, į kurį galima pridėti 2 % nugriebto pieno. Flakonų reikia atkimšti po vandeniu, o indelio (-ių) turinys turi būti supiltas į vandenį. Negalima naudoti chloruoto vandens. Abiem atvejais prieš naudojant reikia gerai išmaišyti vandenį su vakcina. Geriausia, kad purškimo aparatas būtų naudojamas tik vakcinavimo tikslais. Skiediklio kiekis atskiedimui turi būti pakankamas, kad jo užtektų vienodai apipurkšti visus paukščius. Tai priklauso nuo vakcinuojamų paukščių amžiaus ir laikymo sąlygų, tačiau rekomenduojama 1 000 dozių vakciną skiesti 250–500 ml vandens. Paukščius purkštuvu reikia tolygiai apipurkšti vakciną suspensija 30–40 cm atstumu, geriausia, kai paukščiai tupi susiglaudę prieblandoje. Jei įmanoma, patartina sumažinti ar sustabdyti ventiliaciją, kad būtų išvengta purškalo nuostolių. Vandens ir purškimo aparate neturi būti nuosėdų, rūdžių ir dezinfekantų arba antiseptikų pėdsakų, idealiau atveju jie turėtų būti naudojami tik vakcinavimo tikslais.

Vakcinavimo programa

Vakcina galima vakcinuoti viščiukus nuo 1 d. amžiaus. Kadangi po vakcinavimo imunitetas trunka neilgai, reikalinga išplėstinė vakcinavimo programa. Norint išlaikyti reikiamą imuniteto lygį, praėjus 2–3 sav. po vakcinavimo šia vakcina, rekomenduojama paukščius revakcinuoti gyva vakcina, kurios sudėtyje yra imunogeniškesnė Clone 30 padermė.

3.10. Perdozavimo simptomai (pirmosios pagalbos priemonės ir priešnuodžiai, jei būtina)

Dešimt kartų didesnė nei maksimali dozė, vakcinuojant rekomenduojamais būdais, nesukelia kitų požymių nei vienkartinė dozė.

3.11. Specialieji naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos, įskaitant antimikrobinių ir antiparazitinių veterinarinių vaistų naudojimo apribojimus, kuriais siekiama apriboti atsparumo išsivystymo riziką

Netaikytinos.

3.12. Išlauka

0 parų.

4. IMUNOLOGINĖS SAVYBĖS

4.1. ATCvet kodas: QI01AD06.

Viščiukams stimuliuoti aktyvaus imuniteto Niukaslo ligai susidarymą.

Nusilpninta C2 padermė yra lentogeninė ir mažai patogeniška, todėl tinka vakcinuoti viščiukams nuo 1 d. amžiaus.

Pirminio vakcinavimo Nobilis ND C2 veiksmingumas įrodytas antrą kartą vakcinavus viščiukus gyva NDV vakcina, kurios sudėtyje yra imunogeniškesnė Clone 30 padermė.

5. FARMACINIAI DUOMENYS

5.1. Pagrindiniai nesuderinamumai

Negalima maišyti su jokių kitų veterinarinių vaistų.

5.2. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.

Tinkamumo laikas, atskiedus pagal nurodymus, – 3 val.

5.3. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti šaldytuve (2– 8 °C).

Negalima sušaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

Atskiedus laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

5.4. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Stiklinis flakonas (I arba II tipo hidrolitinio stiklo), užkimštas halogenbutilinės gumos kamštelio ir apgaubtas metaliniu gaubtelio.

Užsandarintas aliuminio laminato indelis su polipropileno (indelis) ir polipropileno-polietileno (dangtelis) kontaktiniu sluoksniu.

Pakuočių dydžiai

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 1 arba 10 flakonas (-ų) po 500 dozių, 1 000 dozių, 2 500 dozių, 5 000 dozių, 10 000 dozių arba 25 000 dozių.

PET plastikinės dėžutės, kuriose yra 12 indelių po 1 000 dozių, 2 500 dozių, 5 000 dozių arba 10 000 dozių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

5.5. Specialiosios nesunaudotų veterinarinių vaistų ar su jų naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas.

6. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Intervet International B.V.

7. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/05/1684/001-016

8. REGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2005-08-16.

9. PASKUTINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠO PERŽIŪROS DATA

2025-10-28

10. VETERINARINIŲ VAISTŲ KLASIFIKACIJA

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

III PRIEDAS
ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS**KARTONINĖ DĖŽUTĖ (FLAKONAI), kurioje yra 1 arba 10 liofilizato flakonų**
PET PLASTIKINĖ DĖŽUTĖ (INDELIAI), kurioje yra 12 liofilizato indelių**1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Nobilis ND C2, liofilizatas akių ir nosies suspensijai ruošti

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)Gyvas nusilpnintas C2 padermės Niukaslų ligos virusas (NDV): 5,7–7,5 log₁₀ EID₅₀*/dozėje.*EID₅₀: 50% embrionų užkrečianti dozė.**3. PAKUOTĖS DYDIS**500 dozių
1 000 dozių
2 500 dozių
5 000 dozių
10 000 dozių
25 000 dozių
10 x 500 dozių
10 x 1 000 dozių
10 x 2 500 dozių
10 x 5 000 dozių
10 x 10 000 dozių
10 x 25 000 dozių
12 x 1 000 dozių
12 x 2 500 dozių
12 x 5 000 dozių
12 x 10 000 dozių**4. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)**

Vištos.

5. INDIKACIJA (-OS)**6. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)**

Naudojimas į akį ar šnervę (įsk. purškimą).

7. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

8. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}

Atskiedus sunaudoti per 3 val.

9. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Laikyti šaldytuve. Negalima sušaldyti. Saugoti nuo šviesos.

Atskiedus laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

10. NUORODA „PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYTI PAKUOTĖS LAPELĮ“

Prieš naudojimą perskaityti pakuotės lapelį.

11. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

12. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

13. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Intervet International B.V.

14. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/05/1684/001
LT/2/05/1684/002
LT/2/05/1684/003
LT/2/05/1684/004
LT/2/05/1684/005
LT/2/05/1684/006
LT/2/05/1684/007
LT/2/05/1684/008
LT/2/05/1684/009
LT/2/05/1684/010
LT/2/05/1684/011
LT/2/05/1684/012
LT/2/05/1684/013
LT/2/05/1684/014
LT/2/05/1684/015
LT/2/05/1684/016

15. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

**MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
STIKLINIO FLAKONO ETIKETĖ – 10 ml liofilizato flakonas**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Nobilis ND C2



2. VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ KIEKYBINĖ INFORMACIJA

500 dozių
1 000 dozių
2 500 dozių
5 000 dozių
10 000 dozių
25 000 dozių

5,7–7,5 log₁₀ EID₅₀ NDV, C2/dozėje

3. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

4. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
ETIKETĖ – Liofilizato indeliai

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Nobilis ND C2



2. VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ KIEKYBINĖ INFORMACIJA

1 000 dozių
2 500 dozių
5 000 dozių
10 000 dozių

Gyvas NDV, C2

3. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

4. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}

B. PAKUOTĖS LAPELIS

PAKUOTĖS LAPELIS

1. Veterinarinio vaisto pavadinimas

Nobilis ND C2, liofilizatas akių ir nosies suspensijai ruošti vištoms

2. Sudėtis

Atskiestos vakcinės dozėje:

veikliosios medžiagos:

Gyvo nusilpninto C2 padermės Niukaslo ligos viruso (NDV): 5,7–7,5 log₁₀ EID₅₀*.

*EID₅₀ = 50 % embrionų užkrečianti dozė: viruso titras, reikalingas infekuoti 50 % užkrėstų embrionų.

Liofilizatas:

Flakonai: baltos arba balkšvos spalvos peletė.

Indeliai: baltas arba balkšvas, daugiausia rutulio formos.

3. Paskirties gyvūnų rūšys

Vištos.

4. Naudojimo indikacijos

Viščiukams aktyviai imunizuoti nuo Niukaslo ligos viruso, norint sumažinti klinikinius požymius ir gaištamumą.

Imuniteto pradžia: 2 sav. po gyvūnų, kurių serologinio tyrimo rezultatai neigiami, vakcinavimo.

Imuniteto trukmė: 5 sav. po gyvūnų, kurių serologinio tyrimo rezultatai neigiami, vakcinavimo.

Nustatyta, kad gyvūnams, turintiems motininių antikūnų, apsauga susidaro praėjus 2 sav. po vakcinavimo.

Imuniteto trukmė priklauso nuo vakcinavimo programos.

5. Kontraindikacijos

Negalima vakcinuoti kliniškai sergančių (ypač kvėpavimo takų ligomis) arba streso paveiktų paukščių.

6. Specialieji įspėjimai

Specialieji įspėjimai

Vakcinuoti tik sveikus gyvūnus.

Specialiosios atsargumo priemonės, siekiant užtikrinti saugų naudojimą paskirties rūšių gyvūnams

10 d. po vakcinacijos vakcininis virusas gali plisti tarp nevakcinuotų paukščių. Išplitęs virusas nesukelia klinikinių požymių, tačiau nevakcinuotiems paukščiams gali sukelti serokonversiją.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Vakcina gali būti patogeniška žmonėms. Kadangi ši vakcina paruošta su gyvais, nusilpnintais virusais, reikia imtis atitinkamų priemonių, kad būtų išvengta vakcinos naudotojų ir kitų žmonių, kurie bendradarbiauja šiame procese, užteršimo.

Jeigu naudojama purškiant, dirbant su veterinariniu vaistu reikia dėvėti asmenines apsaugos priemones, kurias sudaro kaukės su akių apsauga.

Po vakcinavimo reikia plauti rankas ir įrangą.

Dedantys kiaušinius paukščiai

Negalima naudoti paukščiams kiaušinių dėjimo metu ir 4 sav. iki kiaušinių dėjimo pradžios.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad Innovax-ILT arba gyvą Nobilis vakciną nuo rinotracheito (11/94 padermė) galima naudoti vienadieniams viščiukams tą pačią dieną, bet negalima maišyti su Nobilis ND C2.

Mareko ligos (CVI988-FC126 padermės) arba infekcinio bronchito (IB Ma5 padermės) vakcinos yra suderinamos su Nobilis ND C2, kai nemaišomos ir naudojamos pirmą dieną. Mareko ir IB Ma5 vakcinų veiksmingumas nebuvo tirtas.

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad gyvą Nobilis vakciną nuo infekcinės bursos ligos (D78 padermė) galima naudoti 7 d. po vakcinavimo Nobilis ND C2.

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad Nobilis ND C2 galima naudoti vienadieniams viščiukams, kurie yra vakcinuoti Innovax-ND-IBD arba švirkščiant po oda, arba švirkščiant *in ovo*.

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad Nobilis ND C2 galima naudoti vienadieniams viščiukams, kurie yra vakcinuoti Innovax-ND-ILT arba švirkščiant po oda, arba švirkščiant *in ovo*.

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą naudojant su kitu veterinariniu vaistu, išskyrus anksčiau minėtus produktus. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito veterinarinio vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

Perdozavimas

Dešimt kartų didesnė nei maksimali dozė, vakcinuojant rekomenduojamais būdais, nesukelia kitų požymių nei vienkartinė dozė.

Specialūs naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos:

Netaikytinos.

Pagrindiniai nesuderinamumai:

Negalima maišyti su jokių kitų veterinariniu vaistu.

7. Nepageidaujamos reakcijos

Vištos:

Labai dažna (> 1 iš 10 gydytų gyvūnų)	Galvos purtymas – elgesio sutrikimas ¹ , mirkšėjimas ¹ .
--	---

¹ Gali būti pastebimas, kai ledo šaltumo vakcina naudojama į akį ar šnervę lašinimo būdu.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamas reakcijas. Tai leidžia nuolat stebėti vaisto saugumą. Pastebėjus bet kokią šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, pirmiausia būtina informuoti veterinarinės gydytoją. Apie bet kokias nepageidaujamas reakcijas taip pat galite pranešti registruotojui naudodamiesi šio lapelio pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba perduodami informaciją per savo nacionalinę pranešimų sistemą:

<https://vmvt.lrv.lt/lt/fb/>

8. Dozės, naudojimo būdai ir metodas kiekvienai rūšiai

Naudojimui į akį ar šnervę lašinant į šnervę ar akį arba purškiant stambiais lašais.
Reikia vakcinuoti vieną kartą, skiriant po vieną dozę kiekvienam viščiukui nuo 1 d. amžiaus.

Vakcinavimo programa

Vakcina galima vakcinuoti viščiukus nuo 1 d. amžiaus. Kadangi po vakcinavimo imunitetas trunka neilgai, reikalinga išplėstinė vakcinavimo programa. Norint išlaikyti reikiamą imuniteto lygį, praėjus 2–3 sav. po vakcinavimo šia vakcina, rekomenduojama paukščius revakcinuoti gyva vakcina, kurios sudėtyje yra imunogeniškesnė Clone 30 padermė.

9. Nuorodos dėl tinkamo naudojimo

Vakcina gali būti tiekama kaip liofilizuota peletė stikliniame flakone arba kaip liofilizuoti rutuliukai indeliuose. Jei vaistas yra indeliuose, vaisto negalima naudoti, jeigu indelio turinys yra rusvas ir limpa prie talpyklės, nes tai rodo, kad talpyklės sandarumas buvo pažeistas. Atidarius kiekvienos talpyklės turinys turi būti sunaudotas nedelsiant ir visiškai. Atskiesta suspensija atrodo skaidri.

Naudojimas į akį ar šnervę

Vakciną reikia atskiesti reikiamu kiekiu tinkamo skiediklio ir lašinti standartizuotu lašintuvu (kurio lašelių dydis yra žinomas ir vienodas). Skiedimui galima naudoti sterilų distiliuotą vandenį arba fosfatinį buferizuotą fiziologinį tirpalą. Skiediklio kiekis reikalingas lašų į akį ar šnervę naudojimui priklauso nuo dozių skaičiaus ir lašelių dydžio, tačiau rekomenduojama 1 000 dozių vakciną skiesti maždaug 35 ml skiediklio. Vieną lašą reikia lašinti į vieną šnervę arba į vieną akį. Prieš paleidžiant paukštį, reikia įsitikinti, kad paukštis lašą šnervėje įkvėpė.

Naudojimas purškiant stambiais lašais

Vakciną reikia atskiesti švariame vėsiam vandenyje, į kurį galima pridėti 2 % nugriebto pieno. Flakonus reikia atkimšti po vandeniu, o indelio (-ių) turinys turi būti supiltas į vandenį. Negalima naudoti chloruoto vandens. Abiem atvejais prieš naudojant reikia gerai išmaišyti vandenį su vakcina. Geriausia, kad purškimo aparatas būtų naudojamas tik vakcinavimo tikslais. Skiediklio kiekis atskiedimui turi būti pakankamas, kad jo užtektų vienodai apipurkšti visus paukščius. Tai priklauso nuo vakcinuojamų paukščių amžiaus ir laikymo sąlygų, tačiau rekomenduojama 1 000 dozių vakciną skiesti 250–500 ml vandens. Paukščius purkštuvu reikia tolygiai apipurkšti vakciną suspensija 30–40 cm atstumu, geriausia, kai paukščiai tupi susiglaudę prieblandoje. Jei įmanoma, patartina sumažinti ar sustabdyti ventiliaciją, kad būtų išvengta purškalo nuostolių. Vandens ir purškimo aparate neturi būti nuosėdų, rūdžių ir dezinfekantų arba antiseptikų pėdsakų, idealiau atveju jie turėtų būti naudojami tik vakcinavimo tikslais.

10. Išlauka

0 parų.

11. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti šaldytuve (2–8 °C).

Negalima sušaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

Atskiedus laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Tinkamumo laikas, atskiedus pagal nurodymus, – 3 val.

12. Specialiosios atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas. Šios priemonės turi padėti apsaugoti aplinką.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais.

13. Veterinarinių vaistų klasifikacija

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. Registracijos numeriai ir pakuočių dydžiai

LT/2/05/1684/001-016

Pakuočių dydžiai

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 1 arba 10 flakonas (-ų) po 500 dozių, 1 000 dozių, 2 500 dozių, 5 000 dozių, 10 000 dozių arba 25 000 dozių.

PET plastikinės dėžutės, kuriose yra 12 indelių po 1 000 dozių, 2 500 dozių, 5 000 dozių arba 10 000 dozių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

15. Pakuotės lapelio paskutinės peržiūros data

2025-10-28

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktiniai duomenys

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą ir kontaktiniai duomenys, skirti pranešti apie įtariamą nepageidaujamą reakciją:

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Nyderlandai
Tel: + 37052196111

17. Kita informacija

Nusilpninta C2 padermė yra lentogeninė ir mažai patogeniška, todėl tinka vakcinuoti viščiukams nuo 1 d. amžiaus. Pirminio vakcinavimo vakcina Nobilis ND C2 veiksmingumas įrodytas antrą kartą vakcinavus viščiukus gyva NDV vakcina, kurios sudėtyje yra imunogeniškesnė Clone 30 padermė.

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.
