

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Fiprotec Spray, 2,5 mg/ml, odos purškalas (tirpalas) katėms ir šunims

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename ml yra:

veikliosios medžiagos:

fipronilo 2,5 mg;

pagalbinių medžiagų:

išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Odos purškalas (tirpalas), skaidrus, bespalvis skystis.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Katės ir šunys.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Šunims ir katėms, užsikrėtusioms blusomis (*Ctenocephalides* spp.) ir kraujasiurbėmis erkėmis (*Ixodes* spp., įskaitant *Ixodes ricinus*) gydyti ir užsikrėtimo profilaktikai.

Plaukagraužiais užsikrėtusiems šunims (*Trichodectes canis*) ir katėms (*Felicola subrostratus*) gydyti.

Insekticidinis veiksmingumas nuo pakartotinio užsikrėtimo suaugusiomis blusomis katėms išlieka iki 2 mėnesių, o šunims – iki 3 mėnesių, priklausomai nuo aplinkos užkrėtumo.

Veterinarinis vaistas pasižymi nuolatiniu akaricidiniu veiksmingumu erkėms iki vieno mėnesio, priklausomai nuo aplinkos užkrėtumo.

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti sergantiems (sisteminėmis ligomis, karščiuojantiems ir t. t.) ar sveikstantiems gyvūnams.

Negalima naudoti triušiams, nes galimos nepalankios reakcijos ar net mirtis.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

4.4. Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Didžiausiam veiksmingumui užtikrinti, nerekomenduojama gyvūnų maudyti ar prausti su šampūnu dvi dienas prieš apipurškiant ir dvi dienas po to. Buvo įrodyta, kad maudymas ar prausimas su šampūnu iki keturių kartų per du mėnesius neturi reikšmingos įtakos liekamajam veterinarinio vaisto veiksmingumui. Jei su šampūnu prausiama dažniau, rekomenduojama gyvūną apipurkšti kas mėnesį. Reikėtų apsvarstyti galimybę, kad kiti tame pačiame namų ūkyje esantys gyvūnai gali pakartotinai užsikrėsti blusomis, erkėmis ir utelėmis, ir prireikus juos reikia gydyti atitinkamu produktu.

Gyvūnų blusos dažnai veisiasi gyvūnų krepšiuose, patiesaluose ir įprastose poilsio vietose, pvz., kilimuose ar minkštuose balduose. Jei užsikrėtimas didelis prieš pradedant taikyti kontrolės priemonės, reikia apdoroti šiuos daiktus tinkamu insekticidu ir reguliariai išsiurbti. Gali būti prisisiurbusių pavienių erkių, todėl esant nepalankioms sąlygoms, negalima visiškai atmesti užkrečiamų ligų perdavimo tikimybės.

Veterinarinis vaistas netinka tiesiogiai purkšti į aplinką.

Atsižvelgiant į purkštuku išpurškiamą tūrį (0,5 ml vienu paspaudimu), veterinarinis vaistas puikiai tinka iki 5–10 kg sveriančioms katėms ir šunims, atsižvelgiant į plaukų ilgį (taip pat žr. 4.9 p.), bet netinka vidutinio dydžio ir dideliems šunims.

4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Svarbu pasirūpinti, kad apipurkšti gyvūnai vienas kito nelaižytų.

Negalima viršyti rekomenduojamos dozės.

Vengti vaisto patekimo į gyvūno akis. Netyčia patekus į akis, reikia nedelsiant jas kruopščiai praplauti vandeniu.

Negalima purkšti tiesiai ant pažeistos odos.

Gydytiems gyvūnams reikia leisti nudžiūti gerai vėdinamoje patalpoje.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Negalima uždaryti gyvūnų ankštoje erdvėje arba nešyklėje, kol jų kailis visiškai neišdžiūvo.

Veterinarinio vaisto nerekomenduojama naudoti kitoms rūšims nei katės ir šunys gydyti, nes nėra specifinių duomenų apie jo toleravimą ir veiksmingumą.

Galima saugiai gydyti šuniukus ir kačiukus nuo 2 dienų amžiaus.

Apipurkštus gyvūnus bent 30 minučių po apipurškimo ir kol kailis visiškai išdžius reikia laikyti atokiau nuo ugnies ir kitų karščio šaltinių bei paviršių, kuriuos gali paveikti purškalas su alkoholiu.

Negalima purkšti į atvirą liepsną ar ant įkaitusių medžiagų.

Tik odos naudojimui.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Veterinarinis vaistas gali dirginti gleivinę ir akis, todėl reikia saugotis, kad jo nepatektų į burną ar akis.

Sergantys astma žmonės arba kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas insekticidams arba alkoholiui, turėtų vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu. Reikia saugotis, kad vaisto nepatektų ant pirštų. Taip nutikus, reikia nusiplauti rankas su muilu ir vandeniu. Atsiradus dirginimui, reikia kreiptis į gydytoją.

Vaistui atsitiktinai patekus į akis, reikia jas kruopščiai praskalauti paprastu vandeniu.

Apipurkštų gyvūnų negalima liesti ir vaikams negalima leisti su jais žaisti tol, kol jų kailis neišdžiūvęs. Todėl nerekomenduojama gyvūnus purkšti dieną, o geriau tai daryti anksti vakare ir neleisti tik apipurkštiems gyvūnams miegoti su šeiminingais, ypač vaikais.

Apipurkšti gyvūnus reikia lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

Purškalo negalima įkvėpti. Purškiant negalima rūkyti, gerti ar valgyti.

Gydant gyvūnus, reikia mūvėti PVC arba nitrilo pirštines. Rekomenduojama dėvėti vandeniui nepralaidžią prijuostę rūbams apsaugoti.

Jei drabužiai smarkiai sudrėksta nuo veterinarinio vaisto, juos reikia nusivilkti ir išskalbti prieš vėl dėvint.

Panaudojus pirštines, jas reikia išmesti ir nusiplauti rankas su muilu bei vandeniu. Nedelsdami nuplaukite pusrus nuo odos vandeniu ir muilu. Jei atsiranda dirginimas, kreipkitės į gydytoją.

Kelių gyvūnų gydymas. Gera ventiliacija yra itin svarbi, kuomet išpurškiami keli gyvūnai. Gydant keletą gyvūnų, juos reikia apipurkšti lauke arba sumažinti susikaupusių garų kiekį išvedant gyvūnus iš purškimo patalpos, kol išgaruos alkoholis, bei pasirūpinti, kad purškimo patalpa būtų gerai vėdinama tarp atskirų purškimų. Be to, reikia pasirūpinti, kad patalpa, kurioje gyvūnai paliekami išdžiūti, būtų gerai vėdinama ir nelaikyti toje pačioje patalpoje kelių tik ką apipurkštų gyvūnų.

Kitos atsargumo priemonės

Fipronilas gali neigiamai veikti vandens organizmus.

2 dienas po purškimo negalima leisti šunims plaukioti vandens telkiniuose (žr. 6.6 p.).

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Jei gyvūnas laižosi, galimas trumpalaikis itin intensyvus seilėtekis, daugiausiai dėl nešiklio savybių. Tarp pranešimų apie labai retas įtariamą nepalankias reakcijas po veterinarinio vaisto naudojimo, gauta duomenų apie laikinas odos reakcijas: paraudimą, niežulį ir plaukų išslinkimą. Po naudojimo išimtiniais atvejais pastebėtas itin gausus seilėtekis, grįžtamieji neurologiniai reiškiniai (padidėjęs jautrumas, depresija, nerviniai reiškiniai), vėmimas ar kvėpavimo sutrikimai.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Laboratoriniais tyrimais su žiurkėmis ir triušiais nenustatytas teratogeninis fipronilo poveikis.

Gydant kales laktacijos metu, vaistą šuniukai toleruoja labai gerai.

Nėra duomenų apie vaikingų ar žindančių kačių gydymą.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Negalima naudoti su kitomis gydymo nuo blusų priemonėmis, naudojamomis tiesiai ant gyvūno.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Naudojimo būdas: purkštukas odos naudojimui.

Dozavimas. Svarbu sudrėkinti kailį iki odos. Atsižvelgiant į plaukų ilgį, reikia purkšti 3–6 ml tirpalo 1 kg kūno svorio (7,5–15 mg veikliosios medžiagos 1 kg kūno svorio), t. y. 6–12 purkštuko paspaudimų 1 kg kūno svorio iš 100 ml buteliuko.

100 ml buteliuko užtenka:

- maždaug 3–6 kartus apipurkšti 5 kg sveriantį šunį, priklausomai nuo plaukų ilgio,
- maždaug 8 kartus apipurkšti 4 kg sveriančią trumpaplaukę katę,
- maždaug 2 kartus apipurkšti 8 kg sveriantį ilgaplaukį šunį.

Naudojimo metodas.

Apipurkšti visą gyvūno kūną iš maždaug 10–20 cm atstumo.

Purkšti reikia prieš plauką ir įsitikinti, kad visas gyvūno kailis yra sudrėkęs. Kailį reikia pašiaušti, ypač jei gyvūnas ilgaplaukis, kad veterinarinis vaistas prasiskverbtų iki odos.

Purškiant galvos sritį arba jaunos ar nervingus gyvūnus, galima užpurkšti ant rankos su pirštine ir įtrinti veterinarinį vaistą į kailį. Leisti gyvūnui išdžiūti natūraliai. Negalima sausinti rankšluosčiu.

Savybės. Sudėtyje yra plėvelę sudarančios medžiagos, todėl apipurškus susidaro plėvelė, suteikianti kailiui blizgesio.

Nesant saugumo tyrimų, minimalus intervalas tarp apipurškimų yra 4 savaitės.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Nepalankių reakcijų pasireiškimo rizika (žr. 4.6 p.) gali padidėti perdozavus, todėl gyvūnus gydyti visada reikia nustatyta gyvūno kūno svorį atitinkančia doze.

Perdozavus reikia taikyti tinkamą simptominių gydymą.

4.11. Išlauka

Netaikytina.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: vietinio naudojimo ektoparazitocidinės medžiagos, įskaitant insekticidus, fipronilas.

ATCvet kodas: QP53AX15.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Fipronilas yra insekticidinė ir akaricidinė medžiaga, priklausanti fenilpirazolų šeimai. Jis slopina GASR kompleksą, jungiasi su chloridų kanalėliais ir taip blokuoja priešsinapsinį ir postsinapsinį chloridų jonų perdavimą per membraną. Tai vabzdžiams ir voragyviams sukelia nevaldomą centrines nervų sistemos aktyvumą ir mirtį.

Fipronilas pasižymi insekticidiniu ir akaricidiniu poveikiu šunų ir kačių blusoms (*Ctenocephalides* spp.), erkėms (*Ixodes* spp.) ir utėlėms (*Trichodectes canis* bei *Felicola subrostratus*).

5.2. Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Užpurškus ant šuns kailio ir odos, į odą absorbuojamas labai nedidelis arba nereikšmingas fipronilo kiekis.

Pasiskirstymas

Fipronilas labai ilgai išlieka ant kailio (vidutiniškai $52,5 \pm 11,5$ dienos), atsižvelgiant į tai, kad nustatymo metodo kiekybinio įvertinimo ribinė vertė yra $0,25 \mu\text{g/g}$.

Tai galima paaiškinti tuo, kad fipronilas gerai tirpsta riebaluose ir kaupiasi riebalų liaukose. Iš riebalų liaukų (saugyklos) fipronilo kiekis ant odos nuolat papildomas.

Biotransformacija

Naudojant visų rūšių gyvūnams, fipronilas daugiausiai metabolizuojamas į jo sulfono darinį (RM1602), kuris taip pat pasižymi insekticidinėmis ir akaricidinėmis savybėmis.

Ant šunų kailio po purškimo aptinkamas RM1602 gali būti aiškintinas jo buvimu pradinėje žaliavoje.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Kopovidonas K28,
izopropilo alkoholis,
išgrynintas vanduo.

6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.
Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 1 metai.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Labai degus.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūroje.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

100 ml didelio tankio polietileno buteliukas su purkštuku, išpurškiančiu 0,5 ml vienu paspaudimu (mažo tankio polietileno įmerkiamas vamzdelis).

6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Fipronilas gali būti kenksmingas vandens organizmams. Negalima užteršti tvenkinių, vandentakių ar griovių veterinariniu vaistu ar tuščiomis jo pakuotėmis.

7. REGISTRUOTOJAS

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX, Raalte
NYDERLANDAI
Tel. +31 572 348 834
Faks. +31 572 348 835
El. p. hqb@beaphar.com

8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/17/2414/001

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2017-09-22
Perregistravimo data 2022-12-27

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2022-12-27

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

DTPE buteliukas (100 ml)

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Fiprotec Spray, 2,5 mg/ml, odos purškalas (tirpalas)
Fipronilas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Fipronilo 2,5 mg/ml

3. VAISTO FORMA

Odos purškalas (tirpalas)

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės ir šunys.

6. INDIKACIJA (-OS)

Šunims ir katėms, užsikrėtusioms blusomis (*Ctenocephalides* spp.) ir kraujasiurbėmis erkėmis (*Ixodes* spp., įskaitant *Ixodes ricinus*) gydyti ir užsikrėtimo profilaktikai.
Plaukagraužiais užsikrėtusiems šunims (*Trichodectes canis*) ir katėms (*Felicola subrostratus*) gydyti.

Insekticidinis veiksmingumas nuo pakartotinio užsikrėtimo suaugusiomis blusomis katėms išlieka iki 2 mėnesių, o šunims – iki 3 mėnesių, priklausomai nuo aplinkos užkrėstumo.
Veterinarinis vaistas pasižymi nuolatinio akaricidiniu veiksmingumu erkėms iki vieno mėnesio, priklausomai nuo aplinkos užkrėstumo.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

Purkšti 3–6 ml tirpalo 1 kg kūno svorio. 100 ml buteliuko užtenka:

- maždaug 3–6 kartus apipurkšti 5 kg sveriantį šunį, priklausomai nuo plaukų ilgio,
- maždaug 8 kartus apipurkšti 4 kg sveriančią trumpaplaukę katę,
- maždaug 2 kartus apipurkšti 8 kg sveriantį ilgaplaukį šunį.

8. IŠLAUKA

Netaikytina.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}
Atidarius sunaudoti per 1 metus.

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Labai degus.
Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

**12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX, Raalte
NYDERLANDAI

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/17/2414/001

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs {numeris}

INFORMACINIS LAPELIS
Fiprotec Spray, 2,5 mg/ml, odos purškalas (tirpalas) katėms ir šunims

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX, Raalte
NYDERLANDAI
Tel. +31 572 348 834

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Beaphar B.V.
Oude Linderteseweg 9
8102 EV, Raalte
NYDERLANDAI

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Fiprotec Spray, 2,5 mg/ml, odos purškalas (tirpalas) katėms ir šunims
Fipronilas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Kiekviename ml šio skaidraus ir bespalvio skysčio yra: fipronilo 2,5 mg.

4. INDIKACIJA (-OS)

Šunims ir katėms, užsikrėtusioms blusomis (*Ctenocephalides* spp.) ir kraujasiurbėmis erkėmis (*Ixodes* spp., įskaitant *Ixodes ricinus*) gydyti ir užsikrėtimo profilaktikai.

Plaukagraužiais užsikrėtusiems šunims (*Trichodectes canis*) ir katėms (*Felicola subrostratus*) gydyti. Insekticidinis veiksmingumas nuo pakartotinio užsikrėtimo suaugusiomis blusomis katėms išlieka iki 2 mėnesių, o šunims – iki 3 mėnesių, priklausomai nuo aplinkos užkrėtumo.

Veterinarinis vaistas pasižymi nuolatiniu akaricidiniu veiksmingumu erkėms iki vieno mėnesio, priklausomai nuo aplinkos užkrėtumo.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti sergantiems ar sveikstantiems gyvūnams.

Negalima naudoti triušiams, nes galimos nepalankios reakcijos ar net mirtis.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Jei gyvūnas laižosi, galimas trumpalaikis intensyvus seilėtekis, daugiausiai dėl nešiklio savybių.

Tarp pranešimų apie labai retas įtariamą nepalankias reakcijas po veterinarinio vaisto naudojimo, gauta duomenų apie laikinas odos reakcijas: paraudimą, niežulį ir plaukų išslinkimą. Po naudojimo išimtiniais atvejais pastebėtas itin gausus seilėtekis, grįžtamieji neurologiniai reiškiniai (padidėjęs jautrumas, depresija, nerviniai reiškiniai), vėmimas ar kvėpavimo sutrikimai.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokią šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

Taip pat galima pranešti naudojantis nacionaline pranešimo sistema; www.vmv.lt.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės ir šunys.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Naudojimo būdas: purkštukas odos naudojimui.

Dozavimas. Svarbu sudrėkinti kailį iki odos. Atsižvelgiant į plaukų ilgį, reikia purkšti 3–6 ml tirpalo 1 kg kūno svorio (7,5–15 mg veikliosios medžiagos 1 kg kūno svorio), t. y. 6–12 purkštuko paspaudimų 1 kg kūno svorio iš 100 ml buteliuko.

100 ml buteliuko užtenka:

- maždaug 3–6 kartus apipurkšti 5 kg sveriantį šunį, priklausomai nuo plaukų ilgio,
- maždaug 8 kartus apipurkšti 4 kg sveriančią trumpaplaukę katę,
- maždaug 2 kartus apipurkšti 8 kg sveriantį ilgaplaukį šunį.

Naudojimo metodas.

Apipurkšti visą gyvūno kūną iš maždaug 10–20 cm atstumo.

Purkšti reikia prieš plauką ir įsitikinti, kad visas gyvūno kailis yra sudrėkęs. Kailį reikia pašiaušti, ypač jei gyvūnas ilgaplaukis, kad veterinarinis vaistas prasiskverbtų iki odos.

Purškiant galvos sritį arba jaunos ar nervingus gyvūnus, galima užpurkšti ant rankos su pirštine ir įtrinti veterinarinį vaistą į kailį. Leisti gyvūnui išdžiūti natūraliai. Negalima sausinti rankšluosčiu. Savybės. Sudėtyje yra plėvelę sudarančios medžiagos, todėl apipurškus susidaro plėvelė, suteikianti kailiui blizgesio.

Nesant saugumo tyrimų, minimalus intervalas tarp apipurškimų yra 4 savaitės.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

10. IŠLAUKA

Netaikytina.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Labai degus.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant buteliuko.

Galiojimo pabaigos data yra paskutinė to mėnesio diena.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 1 metai.

Rekomenduojama užrašyti išmetimo datą (1 metai po atidarymo). Po šios datos nesunaudotą veterinarinį vaistą reikia išmesti.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Didžiausiam veiksmingumui užtikrinti, nerekomenduojama gyvūnų maudyti ar prausti su šampūnu dvi dienas prieš apipurškiant ir dvi dienas po to. Buvo įrodyta, kad maudymas ar prausimas su šampūnu iki keturių kartų per du mėnesius neturi reikšmingos įtakos liekamajam veterinarinio vaisto veiksmingumui. Jei su šampūnu prausiama dažniau, rekomenduojama gyvūną apipurkšti kas mėnesį. Reikėtų apsvarstyti galimybę, kad kiti tame pačiame namų ūkyje esantys gyvūnai gali pakartotinai užsikrėsti blusomis, erkėmis ir utelėmis, ir prireikus juos reikia gydyti atitinkamu produktu. Gyvūnų blusos dažnai veisiasi gyvūnų krepšiuose, patiesaluose ir įprastose poilsio vietose, pvz., kilimuose ar minkštuose balduose. Jei užsikrėtimas didelis prieš pradedant taikyti kontrolės priemonės, reikia apdoroti šiuos daiktus tinkamu insekticidu ir reguliariai išsiurbti. Gali būti prisisiurbusių pavienių erkių, todėl esant nepalankioms sąlygoms, negalima visiškai atmesti užkrečiamų ligų perdavimo tikimybės.

Veterinarinis vaistas netinka tiesiogiai purkšti į aplinką.

Atsižvelgiant į purkštuku išpurškiamą tūrį (0,5 ml vienu paspaudimu), veterinarinis vaistas puikiai tinka iki 5–10 kg sveriančioms katėms ir šunims, atsižvelgiant į plaukų ilgį (taip pat žr. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI), bet netinka vidutinio dydžio ir dideliems šunims.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Svarbu pasirūpinti, kad apipurkšti gyvūnai vienas kito nelaižytų.

Negalima viršyti rekomenduojamos dozės.

Vengti vaisto patekimo į gyvūno akis.

Negalima purkšti tiesiai ant pažeistos odos.

Gydytiems gyvūnams reikia leisti nudžiūti gerai vėdinamoje patalpoje.

Negalima uždaryti gyvūnų ankštoje erdvėje arba nešyklėje, kol jų kailis visiškai neišdžiūvo.

Veterinarinio vaisto nerekomenduojama naudoti kitoms rūšims nei katės ir šunys gydyti, nes nėra specifinių duomenų apie jo toleravimą ir veiksmingumą.

Galima saugiai gydyti šuniukus ir kačiukus nuo 2 dienų amžiaus.

Apipurkštus gyvūnus bent 30 minučių po apipurškimo ir kol kailis visiškai išdžius reikia laikyti atokiau nuo ugnies ir kitų karščio šaltinių bei paviršių, kuriuos gali paveikti purškalas su alkoholiu.

Negalima purkšti į atvirą liepsną ar ant įkaitusių medžiagų.

Tik odos naudojimui.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Veterinarinis vaistas gali dirginti gleivinę ir akis, todėl reikia saugotis, kad jo nepatektų į burną ar akis. Sergantys astma žmonės arba kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas (alergija) insekticidams arba alkoholiui, turėtų vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu. Reikia saugotis, kad vaisto nepatektų ant pirštų. Taip nutikus, reikia nusiplauti rankas su muilu ir vandeniu. Atsiradus dirginimui, reikia kreiptis į gydytoją.

Vaistui atsitiktinai patekus į akis, reikia jas kruopščiai praskalauti paprastu vandeniu.

Apipurkštų gyvūnų negalima liesti ir vaikams negalima leisti su jais žaisti tol, kol jų kailis neišdžiūvęs. Todėl nerekomenduojama gyvūnus purkšti dieną, o geriau tai daryti anksti vakare ir neleisti tik apipurkštiems gyvūnams miegoti su šeiminingais, ypač vaikais.

Apipurkšti gyvūnus reikia lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

Purškalo negalima įkvėpti. Purškiant negalima rūkyti, gerti ar valgyti.

Gydant gyvūnus, reikia mūvėti PVC arba nitrilo pirštines. Rekomenduojama dėvėti vandeniui nepralaidžią prijuostę rūbams apsaugoti.

Jei drabužiai smarkiai sudrėksta nuo veterinarinio vaisto, juos reikia nusivilkti ir išskalbti prieš vėl dėvint.

Panaudojus pirštines, jas reikia išmesti ir nusiplauti rankas su muilu bei vandeniu. Nedelsdami nuplaukite pusrus nuo odos vandeniu ir muilu. Jei atsiranda dirginimas, kreipkitės į gydytoją

Kelių gyvūnų gydymas. Gera ventiliacija yra itin svarbi, kuomet išpurškiami keli gyvūnai. Gydant keletą gyvūnų, juos reikia apipurkšti lauke arba sumažinti susikaupusių garų kiekį išvedant gyvūnus iš

purškimo patalpos, kol išgaruos alkoholis, bei pasirūpinti, kad purškimo patalpa būtų gerai vėdinama tarp atskirų purškimų. Be to, reikia pasirūpinti, kad patalpa, kurioje gyvūnai paliekami išdžiūti, būtų gerai vėdinama ir nelaikyti toje pačioje patalpoje kelių tik ką apipurkštų gyvūnų.

Kitos atsargumo priemonės

Fipronilas gali neigiamai veikti vandens organizmus.

2 dienas po purškimo, negalima leisti šunims plaukioti vandens telkiniuose.

Vaikingumas ir laktacija

Purškalas saugus naudoti žindančioms kalėms.

Negalima naudoti vaikingoms katėms ar kalėms arba žindančioms katėms.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Negalima naudoti su kitomis gydymo nuo blusų priemonėmis, naudojamomis tiesiai ant gyvūno.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Nepalankių reakcijų pasireiškimo rizika gali padidėti perdozavus, todėl gyvūnus gydyti visada reikia nustatyta gyvūno kūno svorį atitinkančia doze.

Perdozavus, veterinarijos gydytojas turi pradėti tinkamą simptominių gydymą.

Nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Fipronilas gali būti kenksmingas vandens organizmams. Negalima užteršti tvenkinių, vandentakų ar griovių veterinariniu vaistu ar tuščiomis jo pakuotėmis.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

2022-12-27

15. KITA INFORMACIJA

Parduodama be recepto.

100 ml buteliukas