

ЕТИКЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

250 ml, 1000 ml Бутилка

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Butox Protect 7,5 mg/ml, суспензия за поливане

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Deltamethrin 7,50 mg/ml

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

250 ml
1000 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда и овце.

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилагане чрез поливане.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентен срок:

Говеда:

Месо и вътрешни органи: 18 дни

Мляко: 0 дни

Овце:

Месо и вътрешни органи: 1 ден

Мляко: 12 часа

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След отваряне използвай в рамките на 30 седмици.

След отваряне използвайте преди...

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се охлажда или замразява. Да се пази от замръзване.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

Intervet International B.V.

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

0022-2482

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

250 ml, 1000 ml Бутилка

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Butox Protect 7,5 mg/ml, суспензия за поливане

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Deltamethrin 7,50 mg/ml

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда и овце.

4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилагане чрез поливане.

Преди употреба прочетете листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентен срок:

Говеда:

Месо и вътрешни органи: 18 дни

Мляко: 0 дни

Овце:

Месо и вътрешни органи: 1 ден

Мляко: 12 часа

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След отваряне използвай в рамките на 30 седмици.

След отваряне използвайте преди...

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се охлажда или замразява. Да се пази от замръзване.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Intervet International B.V.

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА – КОМБИНИРАН ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА

2500 ml бутилка

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Butox Protect 7,5 mg/ml, суспензия за поливане за говеда и овце

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всеки ml съдържа:

Активно вещество:

Deltamethrin 7,50 mg

Помощни вещества:

Formaldehyde solution 35 % 0,18 mg

Светлокремава до бледокафява суспензия за поливане.

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

250 ml

1000 ml

2500 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда и овце.

5. ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Показания за употреба

Говеда:

За лечение и профилактика на опаразитявания, причинени от следните ектопаразити:

Кръвосмучещи въшки (*Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*)

Хапещи въшки (*Bovicola bovis*)

За контрол на:

Жилещи мухи (*Stomoxys calcitrans*, *Haematobia* spp.), както и некръвосмучещи мухи (*Musca* spp., *Hippobosca* spp.)

Овце:

За лечение и профилактика на опаразитявания, причинени от следните ектопаразити:

Кръвосмучещи въшки (*Linognathus ovillus*)

Хапещи въшки (*Bovicola ovis*)

Овчи космояди (*Melophagus ovinus*)

6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

7. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения

Специални предупреждения:

Животните не трябва да бъдат третирани при много горещо време (опасност от облизване на продукта от животните).

Да не се прилага върху или около очите и лигавиците на животните.

Трябва да се избягват практики като твърде честа и повтаряща се употреба на инсектициди от един и същи клас за продължителен период от време, тъй като те повишават риска от развитие на резистентност и могат да доведат до неефективна терапия.

Този ветеринарен лекарствен продукт е продукт за контрол на мухите, който ще намали броя им, намиращи се директно върху животното, но не се очаква да елиминира всички мухи във фермата.

Докладвани са случаи на резистентност към deltamethrin при жилещи и некръвосмучещи мухи при говеда и въшки при овце. Следователно, употребата на този продукт трябва да се основава на местната (регионална, на ниво ферма) епидемиологична информация за чувствителността на жилещите и некръвосмучещите мухи и въшките.

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Резистентност не може да бъде изключена при некръвосмучещите мухи (*Musca spp.*). Този ветеринарен лекарствен продукт трябва да се използва преди всичко в контекста на концепция за управление за борба с мухите чрез подобряване на състоянието на хигиената и употребата на нехимични вещества. Допълнително, редуващата се употреба на инсектициди от различни групи активни вещества следва да се разглежда въз основа на програма за елиминиране на вредителите. Изборът на активното вещество трябва да се основава в идеалния случай на тест за чувствителност. Моля, попитайте Вашия ветеринарен лекар за допълнителна информация.

Този ветеринарен лекарствен продукт трябва да се прилага само върху здрава кожа, тъй като е възможно да се прояви токсичност поради резорбцията му през големи кожни рани. Признаци на локални раздразнения могат да се появят след третиране, тъй като кожата може вече да е засегната от опаразитяването. Делтаметринът е локално дразнещ за очите и лигавиците.

Наличието на смесено опаразитяване трябва да бъде доказано преди третирането.

Наличието на смесено опаразитяване с ектопаразити, които не са посочени в терапевтичните показания, трябва да бъде доказано преди третирането.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Могат да се появят дразнене, сензибилизация и неблагоприятни реакции от страна на нервната система. Избягвайте контакт на продукта с кожата, очите, лигавиците и перорален прием.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от предпазни ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт.

Сменяйте силно замърсените дрехи и ги перете преди повторна употреба.

Да не се яде, да не се пие и да не се пуши по време на прилагането на този ветеринарен лекарствен продукт.

При случаен контакт с кожата, незабавно измийте внимателно с вода и сапун.

При случаен контакт с очите, незабавно изплакнете обилно с вода.

Хора с установена свръхчувствителност към този ветеринарен лекарствен продукт трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

Ако не се чувствате добре след употребата на този ветеринарен лекарствен продукт, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Специални предпазни мерки за защита на околната среда:

Дългосрочните ефекти на ВЛП върху динамиката на популацията на торните бръмбари не са проучвани; ето защо е препоръчително да не се третират животни на същото пасище всеки сезон.

Бременност:

Може да се прилага по време на бременност.

Лактация:

Може да се прилага по време на лактация.

Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:

В комбинация с органо-фосфорни вещества се повишава токсичността на deltamethrin. Поради тази причина не се препоръчва използването на такива продукти в комбинация с този ветеринарен лекарствен продукт.

Предозиране:

Deltamethrin има много ниска токсичност, когато се прилага локално под формата на водна суспензия. Поради това не се очаква остра токсичност чрез трансдермална резорбция.

Приложението на три пъти по-висока доза от препоръчаната не предизвиква никакви неблагоприятни реакции при говеда.

Случайното поглъщане на голямо количество или наличието на големи кожни рани може да доведе до поява на признаци на токсичност като саливация, възбуда, клонични конвулсии и парестезии. Трябва незабавно да се потърси съвет от ветеринарния лекар. Терапията трябва да бъде симптоматична и поддържаща.

Основни несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост, този ветеринарен лекарствен продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарни лекарствени продукти.

8. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Неблагоприятни реакции

Говеда и овце:

Много редки (по-малко от 1 на 10 000 третирани животни, включително изолирани съобщения):	Дразнене на кожата (като еритема, сърбеж) Безпокойство, свръхактивност, тревожност, поведенческо разстройство* Свръхчувствителност
--	---

* Тръскане на главите и опашките

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в този етикет или мислите, че ветеринарния лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт на този етикет или чрез Вашата национална система за съобщаване:

<https://kvmp.bfsa.bg/index.php/bg/registers/veterinarnomedicinski-producty>

9. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, НАЧИН И МЕТОД НА ПРИЛАГАНЕ

Дозировка за всеки вид животно, начин и метод на прилагане

Прилагане чрез поливане. Разклатете внимателно преди употреба.

Свържете апликаторния пистолет с прикрепена тръба и свързващата винтова капачка.

Приложете продукта чрез поливане равномерно по линията на гърба, в посока от основата на главата към опашката.

Мухи:

Говеда

До 100 kg т.м. 10 ml

100 kg до 300 kg т.м. 20 ml

Над 300 kg т.м. 30 ml

Кръвосмучещи и хапеци въшки, овчи космояди:

Говеда, овце

10 ml на животно.

10. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

Съвет за правилното прилагане на продукта

Следните указания трябва да се вземат предвид при третирането на овце:

- прилагайте продукта непосредствено след стригане на овцете (животни с късо руно)
- дръжте остриганата група далеч от неостригани животни
- стрижете и третирайте овцете 4-6 седмици преди раждане.

Ветеринарният лекарствен продукт се прилага като еднократно третиране.

Въпреки това, третирането срещу мухи може да се повтаря на всеки 6-10 седмици, в зависимост от степента на опаразитяване. Продължителността на контрола върху *Musca spp.* може да варира.

Влиянието на атмосферните условия върху продължителността на ефикасността на продукта не е проучвано.

11. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентни срокове

Говеда:

Месо и вътрешни органи: 18 дни

Мляко: 0 дни

Овце:

Месо и вътрешни органи: 1 ден

Мляко: 12 часа

12. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да не се охлажда или замразява. Да се пази от замръзване.

Да не се използва този ветеринарен лекарствен продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета след Ехр. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.

13. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ

Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Този ветеринарен лекарствен продукт не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като deltamethrin може да бъде опасен за риби и други водни организми.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар или фармацевт как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

14. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Класификация на ветеринарните лекарствени продукти
Да се отпуска само по лекарско предписание.

15. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗМЕРИ ОПАКОВКИ

0022-2482

Размери опаковки

250 ml и 1000 ml HDPE бутилка в картонена кутия, включваща интегрирана дозираща камера и апликатор с винт.

2500 ml HDPE бутилка, опакована с апликаторен пистолет, който да бъде свързан с тръба с бутилката.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

16. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ЕТИКЕТА

Дата на последната редакция на етикета

12/2023

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите <https://medicines.health.europa.eu/veterinary>.

17. ДАННИ ЗА ВРЪЗКА

Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия:

Intervet International B.V
Wim de Koeerverstraat 35
5831 AN BOXMEER
The Netherlands

Производител, отговарящ за освобождаването на партиди:

Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons
27460 Igoville
France

Данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

Република България
Intervet International B.V.
Тел: + 359 28193749

18. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Допълнителна информация

19. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

20. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до: {мм/гггг}

След отваряне използвайте преди...

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 30 седмици.

21. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

Butox Protect 7,5 mg/ml, суспензия за поливане за говеда и овце

2. Състав

Всеки ml съдържа:

Активно вещество:

Deltamethrin 7,50 mg

Помощни вещества:

Formaldehyde solution 35 % 0,18 mg

Светлокремава до бледокафява суспензия за поливане.

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Говеда и овце.

4. Показания за употреба

Говеда:

За лечение и профилактика на опаразитявания, причинени от следните ектопаразити:

Кръвосмучещи въшки (*Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*)

Хапещи въшки (*Bovicola bovis*)

За контрол на:

Жилещи мухи (*Stomoxys calcitrans*, *Haematobia* spp.), както и некръвосмучещи мухи (*Musca* spp., *Hippobosca* spp.)

Овце:

За лечение и профилактика на опаразитявания, причинени от следните ектопаразити:

Кръвосмучещи въшки (*Linognathus ovillus*)

Хапещи въшки (*Bovicola ovis*)

Овчи космояди (*Melophagus ovinus*)

5. Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

6. Специални предупреждения

Специални предупреждения:

Животните не трябва да бъдат третирани при много горещо време (опасност от облизване на продукта от животните).

Да не се прилага върху или около очите и лигавиците на животните.

Трябва да се избягват практики като твърде честа и повтаряща се употреба на инсектициди от един и същи клас за продължителен период от време, тъй като те повишават риска от развитие на резистентност и могат да доведат до неефективна терапия.

Този ветеринарен лекарствен продукт е продукт за контрол на мухите, който ще намали броя им, намиращи се директно върху животното, но не се очаква да елиминира всички мухи във фермата.

Докладвани са случаи на резистентност към deltamethrin при жилещи и некръвосмучещи мухи при говеда и въшки при овце. Следователно, употребата на този продукт трябва да се основава на местната

(регионална, на ниво ферма) епидемиологична информация за чувствителността на жилещите и некръвосмучещите мухи и въшките.

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Резистентността не може да бъде изключена при некръвосмучещите мухи (*Musca spp.*). Този ветеринарен лекарствен продукт трябва да се използва преди всичко в контекста на концепция за управление за борба с мухите чрез подобряване на състоянието на хигиената и употребата на нехимични вещества. Допълнително, редуващата се употреба на инсектициди от различни групи активни вещества следва да се разглежда въз основа на програма за елиминиране на вредителите. Изборът на активното вещество трябва да се основава в идеалния случай на тест за чувствителност. Моля, попитайте Вашия ветеринарен лекар за допълнителна информация.

Този ветеринарен лекарствен продукт трябва да се прилага само върху здрава кожа, тъй като е възможно да се прояви токсичност поради резорбцията му през големи кожни рани. Признаци на локални раздразнения могат да се появят след третиране, тъй като кожата може вече да е засегната от опаразитяването. Делтаметринът е локално дразнещ за очите и лигавиците.

Наличието на смесено опаразитяване трябва да бъде доказано преди третирането.

Наличието на смесено опаразитяване с ектопаразити, които не са посочени в терапевтичните показания, трябва да бъде доказано преди третирането.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Могат да се появят дразнене, сенсibiliзация и неблагоприятни реакции от страна на нервната система. Избягвайте контакт на продукта с кожата, очите, лигавиците и перорален прием.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от предпазни ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт.

Сменяйте силно замърсените дрехи и ги перете преди повторна употреба.

Да не се яде, да не се пие и да не се пуши по време на прилагането на този ветеринарен лекарствен продукт.

При случаен контакт с кожата, незабавно измийте внимателно с вода и сапун.

При случаен контакт с очите, незабавно изплакнете обилно с вода.

Хора с установена свръхчувствителност към този ветеринарен лекарствен продукт трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

Ако не се чувствате добре след употребата на този ветеринарен лекарствен продукт, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Специални предпазни мерки за защита на околната среда:

Дългосрочните ефекти на ВЛП върху динамиката на популацията на торните бръмбари не са проучвани; ето защо е препоръчително да не се третират животни на същото пасище всеки сезон.

Бременност:

Може да се прилага по време на бременност.

Лактация:

Може да се прилага по време на лактация.

Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:

В комбинация с органо-фосфорни вещества се повишава токсичността на deltamethrin. Поради тази причина не се препоръчва използването на такива продукти в комбинация с този ветеринарен лекарствен продукт.

Предозиране:

Deltamethrin има много ниска токсичност, когато се прилага локално под формата на водна суспензия. Поради това не се очаква остра токсичност чрез трансдермална резорбция.

Приложението на три пъти по-висока доза от препоръчаната не предизвиква никакви неблагоприятни реакции при говеда.

Случайното поглъщане на голямо количество или наличието на големи кожни рани може да доведе до поява на признаци на токсичност като саливация, възбуда, клонични конвулсии и парестезии. Трябва незабавно да се потърси съвет от ветеринарния лекар. Терапията трябва да бъде симптоматична и поддържаща.

Основни несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост, този ветеринарен лекарствен продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарни лекарствени продукти.

7. Неблагоприятни реакции

Говеда и овце:

Много редки (по-малко от 1 на 10 000 третирани животни, включително изолирани съобщения):	Дразнене на кожата (като еритема, сърбеж) Безпокойство, свръхактивност, тревожност, поведенческо разстройство* Свръхчувствителност
---	---

* Тръскане на главите и опашките

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарния лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване: <https://kvmp.bfsa.bg/index.php/bg/registers/veterinarnomedicinski-producty>.

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

Прилагане чрез поливане. Разклатете внимателно преди употреба.

Приложете продукта чрез поливане равномерно по линията на гърба, в посока от основата на главата към опашката.

Мухи:

Говеда

До 100 kg т.м. 10 ml

100 kg до 300 kg т.м. 20 ml

Над 300 kg т.м. 30 ml

Кръвосмучещи и хапещи въшки, овчи космояди:

Говеда, овце

10 ml на животно.

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

Следните указания трябва да се вземат предвид при третирането на овце:

- прилагайте продукта непосредствено след стригане на овцете (животни с късо руно)
- дръжте остриганата група далеч от неостригани животни
- стрижете и третирайте овцете 4-6 седмици преди раждане.

Ветеринарният лекарствен продукт се прилага чрез еднократно третиране.

Въпреки това, третирането срещу мухи може да се повтаря на всеки 6-10 седмици, в зависимост от степента на опаразитяване.

Продължителността на контрола върху *Musca* spp. може да варира.

Влиянието на атмосферните условия върху продължителността на ефикасността на продукта не е проучвана.

10. Карентни срокове

Говеда:

Месо и вътрешни органи: 18 дни

Мляко: 0 дни

Овце:

Месо и вътрешни органи: 1 ден

Мляко: 12 часа

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да не се охлажда или замразява. Да се пази от замръзване.

Да не се използва този ветеринарен лекарствен продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета след Ехр. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.

Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: 30 седмици.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Този ветеринарен лекарствен продукт не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като deltamethrin може да бъде опасен за риби и други водни организми.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар или фармацевт как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

0022-2482

Размери на опаковката: 250 ml, 1000 ml HDPE бутилка с апликатор с винт и 2500 ml HDPE бутилка, опакована с апликаторен пистолет, който да бъде свързан с тръба с бутилката.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

15. Дата на последната редакция на текста

12/2023

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия:

Intervet International B.V
Wim de Koeerverstraat 35
5831 AN BOXMEER
The Netherlands

Производител, отговарящ за освобождаването на партии:


Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons
27460 Igoville
France

Данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

Република България
Intervet International B.V.
Тел: + 359 28193749

17. Допълнителна информация

Използване на дозиращата система (приложима за опаковката от 250 ml и 1 000 ml):



- 1) Отстранете капачка 2 от дозиращия резервоар на бутилката. Дръжте капачка 1 затворена през цялото време.
- 2) Прикрепете апликатора към дозиращия резервоар.
- 3) Напълнете дозиращия апликатор чрез притискане на контейнера.
- 4) Дръжте контейнера от страната на апликатора. След обръщане на бутилката и по време на приложението трябва да сте убедени, че апликаторът е под дозиращия резервоар (вижте диаграмата по-горе). Приложете дозата чрез поливане, по дължина на гръбначния стълб от основата на главата до опашката, като стискате леко контейнера. (Повторете процедурата за третиране на мухи върху животни с телесна маса над 100 kg, които се нуждаят от доза, по-висока от 10 ml).
- 5) Зона за приложение на този ветеринарен лекарствен продукт: уверете се, че пълната доза е приложена върху гърба на животното.
- 6) Когато всички животни са третирани, отстранете апликатора преди да затворите отново бутилката.

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТИНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР