

А. ЕТИКЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Многодозови стъклени флакони (100 ml, 250 ml)

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

L.S. Injection инжекционен разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Spectinomycin 2HCl, 5H ₂ O	100.00 mg/ml
Lincomycin HCl, H ₂ O	50.00 mg/ml

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Телета (с неразвити предстомашия), овце, кози, прасета, птици и кучета.

4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За подкожно приложение при птици.

За интрамускулно приложение при всички останали видове животни.

Телета, прасета: 1 ml на 10 kg телесна маса за 3-7 дни.

Овце, кози: 1 ml на 10 kg телесна маса за максимум 3 дни.

Кучета: 1 ml на 10 kg телесна маса за максимум 3 дни.

Птици: 0.2 ml на 10 kg телесна маса за максимум 3 дни.

Преди употреба прочетете листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Бъбреци и черен дроб: 21 дни

Месо: 14 дни

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за

Консумация от хора.

Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат яйца за консумация от хора.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След отваряне използвай в рамките на 30 дни

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25° C.
Да се пази от светлина.
Да се съхранява на сухо място.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ
--

Керро В.В.

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot{номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонени кутии (100 mg, 250 mg).

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

L.S. Injection инжекционен разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Spectinomycin 2HCl, 5H ₂ O	100.00 mg/ml
Lincomycin HCl, H ₂ O	50.00 mg/ml

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

100 ml
250 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Телета (с неразвити предстомашия), овце, кози, прасета, птици и кучета.

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Инфекции, причинени от микроорганизми, чувствителни към Lincomycin и Spectinomycin. L.S. Injection е предназначен за лечение на често срещани респираторни инфекции (с или без усложнения, причинени от микоплазми) и гастро-интестинални инфекции при телета, прасета, овце, кози, птици и кучета; дизентерия, червенка и артрит при прасетата; копитен гнилец при овцете и козите; ХРБ (с или без усложнения, причинени от *E. coli*) при птиците.

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За подкожно приложение при птици.

За интрамускулно приложение при всички останали видове животни.

Телета, прасета: 1 ml на 10 kg телесна маса за 3-7 дни.

Овце, кози: 1 ml на 10 kg телесна маса за максимум 3 дни.

Кучета: 1 ml на 10 kg телесна маса за максимум 3 дни.

Птици: 0.2 ml на 10 kg телесна маса за максимум 3 дни.

Преди употреба прочети листовката.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Бъбреци и черен дроб: 21 дни

Месо: 14 дни
Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е за консумация от хора.
Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат яйца за консумация от хора.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}
След отваряне използвай в рамките на 30 дни.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25° C.
Да се пази от светлина.
Да се съхранява на сухо място.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

Кepro B.V.

14. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

0022-2528

1. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП