

BIJSLUITER
Nobilis Marek THV

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Intervet International B.V., Boxmeer, Nederland vertegenwoordigd door
MSD Animal Health BVBA – Lynx Binnenhof 5 – 1200 Brussel

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Nobilis Marek THV

3. GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDELEN

Werkzaam bestanddeel:

Levend verzwakt Kalkoen Herpes Virus (stam PB-THV-1) \geq 1000 pfu per dosis.

4. INDICATIES

Actieve immunisatie van kuikens tegen de virus van de ziekte van Marek ter vermindering van sterfte, klinische symptomen en/of letsels. Bescherming werd aangetoond 8 dagen na vaccinatie. Een enkelvoudige vaccinatie is voldoende voor een bescherming gedurende de risicoperiode.

5. CONTRA-INDICATIES

Indien gebruikt volgens de instructies : geen.

6. BIJWERKINGEN

Geen.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Kippen van 1 dag tot 3 weken oud.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Dosis: Minstens 1000 pfu per dier (0,2 ml).

Toedieningswijze: Intramusculair

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Bereid het vaccin door toevoeging van ongeveer 2,0 ml verdunningsvloeistof aan de flacon die het gevriesdroogde materiaal bevat. Gebruik hiertoe een steriele injectiespuit met naald. Als de inhoud van de flacon is opgelost, brengt men deze over naar het juiste volume verdunningsvloeistof. Per 1000 doses gevriesdroogd vaccin dient 200 ml verdunningsvloeistof te worden gebruikt.

10. WACHTTIJD

Nul dagen.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Gevriesdroogd pellet: koel bewaren bij +2 °C tot +8 °C.

Solvens: op kamertemperatuur bewaren.

Houdbaarheid na oplossen: 2 uur

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Er zijn geen laboratoriumgegevens betreffende het gebruik van dit vaccin samen met enig andere vaccin, maar op basis van veldervaring mag dit vaccin gelijktijd gebruikt worden met andere vaccins zolang de vaccinvirussen andere doelorganen hebben.

Onverenigbaarheden

Combineer niet met levende Reo-vaccinatie. Niet mengen met een ander product dan het suspensiemiddel, geleverd voor gebruik met dit product.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

De nodige voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden opdat het product niet in het milieu terecht zou komen.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

04/2013.

15. OVERIGE INFORMATIE

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Afleveringswijze: Op diergeneeskundig voorschrift.

BE-V059446 (diluens glazen flacons)

BE-V274741 (diluens PE-zakken)