

**NOTICE****NOBILIS EDS****1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBERATION DES LOTS, SI DIFFERENT**

Intervet International B.V., Boxmeer, Pays-Bas  
représenté par  
MSD Animal Health BVBA  
Lynx Binnenhof 5  
1200 Brussel

Distributeur: MSD Animal Health BVBA

**2. DENOMINATION DU MEDICAMENT VETERINAIRE**  
**NOBILIS EDS****3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGREDIENTS**

Par dose:

Virus inactivé Egg Drop Syndrome '76, souche BC14, quantité de virus pour induire  $\geq 6,5 \log_2$  unités HI (haemagglutination inhibition) ad 0,5 ml pro dos. un.

**4. INDICATION(S)**

Immunisation active des futures poules pondeuses et parentales contre le virus Egg Drop Syndrome '76.

Début de la protection: indéterminé.

Durée de la protection: une période de ponte.

**5. CONTRE-INDICATION(S)**

Aucune connue.

**6. EFFETS INDESIRABLES**

Aucun symptôme clinique n'est observé lors de la vaccination d'animaux sains.

Un gonflement passager peut parfois se présenter au site d'injection.

**7. ESPECE(S) CIBLE(S)**

Poule (futures poules pondeuses et parentales).

**8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPECE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION**

Dose: 0,5 ml par animal.

Mode d'administration: injecter en s.c. ou i.m.

Schéma de vaccination:

Nobilis EDS est injecté à l'âge de 16 - 20 semaines, au moins 4 semaines avant le début de la ponte.

**9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE**

Pour assurer une réponse immunitaire, il faut éviter tout stress autant que possible pendant les deux semaines qui suivent la vaccination.

**10. TEMPS D'ATTENTE**

Viande: 0 jours.

Œufs: 0 jours.

**11. CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION**

A l'obscurité entre 2 et 8° C. Eviter la congélation.

Durée de conservation

24 mois. Tout flacon entamé doit être utilisé immédiatement.

**12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIERE(S)**

Ne vacciner que des animaux en bonne santé. Utiliser uniquement des aiguilles et seringues stériles. Avant l'emploi, amener le vaccin à température ambiante (15 - 25° C).

Pour l'utilisateur:

Ce produit contient de l'huile minérale. L'injection accidentelle/l'auto-injection peuvent provoquer de fortes douleurs et un gonflement, notamment en cas d'(auto-)injection dans une articulation ou un doigt de la main, et, dans de rares cas, conduire à la perte de ce doigt si un examen médical n'est pas effectué rapidement. En cas d'(auto-)injection accidentelle, même en quantité minime, demander immédiatement conseil à un médecin et lui montrer la notice.

Si la douleur persiste au-delà de 12 heures à compter de l'examen médical, consulter à nouveau le médecin.

Pour le médecin:

Ce produit contient de l'huile minérale. Même une faible quantité de ce produit (auto-)injectée accidentellement peut provoquer un œdème intense susceptible d'entraîner, par exemple, une nécrose ischémique, voire la perte d'un doigt. Il est impératif de recourir IMMEDIATEMENT à des soins médicaux. Une incision et une irrigation de la zone injectée peuvent s'avérer nécessaires, notamment si la pulpe ou le tendon d'un doigt sont touchés.

**13. PRECAUTIONS PARTICULIERES POUR L'ELIMINATION DES MEDICAMENTS VETERINAIRES NON UTILISES OU DES DECHETS DERIVES DE CES MEDICAMENTS, LE CAS ECHEANT**

Les précautions nécessaires doivent être prises afin que le produit ne se retrouve pas dans l'environnement.

**14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE**

03/2013.

**15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

Sur prescription vétérinaire.

BE-V197014 (Verre)

BE-V304692 (PET)