

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS
V/NRP/98/0814

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ketosaid šķīdums iekšķīgai lietošanai liellopiem un aitām

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvā viela:

Propilēnglikols 0,9996 ml

Palīgviela(-s):

Karmoizīns (E122) līdz 1 ml

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums iekšķīgai lietošanai.

Viskozs, sarkans šķīdums.

4. KLĪNISKIE DATI

4.1 Mērķa sugas

Liellopi, aitas.

4.2 Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Palīg līdzeklis acetonēmijas un ketozes ārstēšanai liellopiem un aitām.

4.3 Kontrindikācijas

Nav.

4.4 Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai

Nav.

4.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Tā kā ketoze aitām rodas no prenatālā metaboliskā stresa, ārstēšanu ar Ketosaid var turpināt līdz simptomu izzušanai vai līdz dzemdībām. Šajā laikā ir ieteicama vispārēja ēdināšanas uzlabošana.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Izvairīties no zāļu saskares ar ādu.

Ja notikusi nejauša saskare ar ādu, skarto vietu skalot ar lielu daudzumu ūdens. Ja parādās kairinājums, meklēt medicīnisko palīdzību.

Izvairīties no nejaušas zāļu saskares ar acīm.

Ja notikusi nejauša nokļūšana acīs, skalot tās ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Pēc zāļu lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas.

4.6 Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Nav zināmas.

4.7 Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

4.8 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

4.9 Devas un lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Liellopiem: 200 ml divas reizes dienā pirmajā dienā un 100 ml divas reizes dienā turpmākās trīs dienas, ievadot iekšķīgi ar zondi.

Aitām: 100 ml dienā četras dienas pēc kārtas ievadot iekšķīgi ar zondi.

Pirms ievadīšanas precīzi jānomēra devas, pārlejot Ketosaid no oriģinālā konteinera tīrā, sausā, piemērota izmēra traukā ar iedaļām milimetros (piemēram, mērglāzē).

4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nav zināma.

4.11 Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas.

Pienam: nulle dienas.

5. FARMAKOLOĢISKAS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: metabolīti un šķīdumi.

ATĶ vet kods: QA16QA01.

Propilēnglikols ir enerģijas avots. Tas viegli uzsūcas no spurekļa un ir glikogēnisks, oksidācijas starpprodukti ir piruvāts un laktāts. Lietojot 3-4 dienas ilgu periodu, propilēnglikols efektīvi paaugstina glikozes līmeni asinīs.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Karmoizīns (E122)

6.2 Būtiska nesaderība

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

6.3 Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 2 gadi.

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs

Plastikāta konteineri pa 1 l; 2,5 l; 5 l un 10 l.

6.6 Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/98/0814

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 25/09/1998
Pēdējās pārreģistrācijas datums: 08/12/2008

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

05/2019

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Bezrecepšu veterinārās zāles.