

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:****KARTONNEN doos 100 ml en 250 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Flodoex 300 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELENElke milliliter bevat:
Florfenicol... 300 mg**3. VERPAKKINGSGROOTTE**100 ml
250 ml**4. DOELDIERSOORT(EN)**

Rund, schaap en varken.

5. INDICATIE(S)**6. TOEDIENINGSWEGEN**Runderen: Intramusculair of subcutaan gebruik
Schapen: Intramusculair gebruik
Varkens: Intramusculair gebruik**8. WACHTTIJDEN**

Wachttijd

Runderen:

Vlees en slachtafval: bij IM toediening: 30 dagen
bij SC toediening: 44 dagen

Melk: Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige dieren bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie.

Schapen:

Vlees en slachtafval: bij IM toediening: 39 dagen

Melk: Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige dieren bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie.

Varkens:

Vlees en slachtafval: bij IM toediening: 18 dagen

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP. {maand/jaar}

Na openen gebruiken binnen 28 dagen

Na aanbreken gebruiken voor

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 30°C.
Niet in de vriezer bewaren.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING "BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN"

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN**

Industrial Veterinaria, S.A.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V519546

15. PARTIJNUMMER

Lot.

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:**FLACON 100 ml en 250 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Flodoex 300 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDELENElke milliliter bevat:
Florfenicol... 300 mg**3. DOELDIERSOORT(EN)**

Rund, schaap en varken.

4. TOEDIENINGSWEGENRunderen: Intramusculair of subcutaan gebruik
Schapen: Intramusculair gebruik
Varkens: Intramusculair gebruik
Lees vóór gebruik de bijsluiter.**5. WACHTTIJDEN**

Wachttijd

Runderen:

Vlees en slachtafval: bij IM toediening: 30 dagen
bij SC toediening: 44 dagen

Melk: Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige dieren bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie.

Schapen:

Vlees en slachtafval: bij IM toediening: 39 dagen

Melk: Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige dieren bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie.

Varkens:

Vlees en slachtafval: bij IM toediening: 18 dagen

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP. {maand/jaar}

Na openen gebruiken binnen 28 dagen

Na aanbreken gebruiken voor

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 30°C.

Niet in de vriezer bewaren.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

BRENGEN

Industrial Veterinaria, S.A.

9. PARTIJNUMMER

Lot