

I PRIEDAS
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Protozoks 500 mg, tabletės šunims ir katėms

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje tabletėje yra:

veikliosios medžiagos:

metronidazolo 500 mg;

pagalbinių medžiagų:

išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Tabletė.

Šviesiai ruda su rudomis dėmėmis, išgaubta aromatizuota tabletė su kryžmine įranta vienoje pusėje.

Tabletes galima padalinti į 2 arba 4 lygias dalis.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Šunys ir katės.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Virškinimo trakto infekcinėms ligoms, sukeltoms *Giardia spp.* ir *Clostridia spp.* (pvz., *C. perfringens* arba *C. difficile*), gydyti.

Šlapimo ir lyties organų, burnos ertmės, gerklės ir odos infekcinėms ligoms, sukeltoms metronidazolui jautrių obligatinių anaerobinių bakterijų (pvz., *Clostridia spp.*), gydyti.

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti, esant kepenų sutrikimams.

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

4.4. Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Dėl galimo bakterijų jautrumo metronidazolui kintamumo (laiko ir geografinės vietovės atžvilgiu), rekomenduojama imti bakteriologinius mėginius ir atlikti mikroorganizmų jautrumo tyrimus.

Kai tik įmanoma, prieš naudojant vaistą reikia atlikti ligos sukėlėjų jautrumo tyrimus.

Naudojant veterinarinį vaistą būtina atsižvelgti į oficialius, nacionalinius ir vietinius antimikrobinių medžiagų naudojimo reikalavimus.

Gali pasireikšti neurologiniai simptomai, ypač po ilgalaikio gydymo metronidazoliu.

Kadangi tabletės yra aromatizuotos, tabletes reikia laikyti gyvūnams nepasiekiamoje vietoje, kad būtų išvengta atsitiktinio prarijimo.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Tyrimais su laboratoriniais gyvūnais ir iš patirties su žmonėmis patvirtinta, kad metronidazolas pasižymi mutageninėmis ir genotoksinėmis savybėmis. Tyrimais su laboratoriniais gyvūnais patvirtinta, kad metronidazolas yra kancerogeninė medžiaga, galinti turėti kancerogeninį poveikį žmonėms. Tačiau metronidazolo kancerogeniškumas žmonėms nėra pakankamai įrodytas. Metronidazolas gali būti kenksmingas negimusiam kūdikiui. Nėščios moterys turi atsargiai naudoti šį veterinarinį vaistą. Naudojant šį vaistą gyvūnams, reikia mūvēti nelaidžias pirštines, siekiant išvengti vaisto sąlyčio su oda ir patekimo nuo rankų į burną.

Norint išvengti atsitiktinio prarijimo (ypač vaikams), nepanaudotas tablečių dalis reikia įdėti atgal į atidarytą lizdinę plokštelę, o ją – atgal į kartoninę dėžutę ir laikyti saugioje vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Atsitiktinai prarijus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Metronidazolas gali sukelti padidinto jautrumo reakcijas. Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas metronidazolui, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Naudojus tabletes, būtina kruopščiai plauti rankas.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Naudojus metronidazolo gali pasireikšti šios nepalankios reakcijos: vėmimas, toksinis poveikis kepenims ir neutropenija. Labai retais atvejais gali pasireikšti neurologiniai požymiai.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Vaikingumas

Laboratoriniais tyrimais su gyvūnais gauti nenuoseklūs rezultatai, susiję su metronidazolo teratogeniniu/embriotoksinu poveikiu. Todėl šio vaisto nerekomenduojama naudoti vaikingumo metu.

Laktacija

Metronidazolas išsiskiria su pienu, todėl jo nerekomenduojama naudoti laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Metronidazolas gali slopinti kitų vaistų (pvz., fenitoino, ciklosporino ir varfarino) skaidymą kepenyse. Cimetidinas gali lėtinti metronidazolo metabolizmą kepenyse, todėl metronidazolo koncentracija kraujo serume gali padidėti.

Fenobarbitalis gali stiprinti metronidazolo metabolizmą kepenyse, todėl metronidazolo koncentracija kraujo serume gali sumažėti.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Naudoti per burną.

Rekomenduotina dozė yra 50 mg metronidazolo 1 kg kūno svorio per parą, 5–7 d. Paros dozę

rekomenduojama padalinti į dvi lygias dalis ir sušerti per du kartus (t.y. po 25 mg/kg kūno svorio du kartus per parą).


Norint tinkamai dozuoti, būtina kuo tiksliau nustatyti kūno svorį.

Kūno svoris (kg)	500 mg tablečių skaičius	
	Du kartus per parą	Vieną kartą per parą
2,5 kg	-	¼
5 kg	¼	½
10 kg	½	1
15 kg	¾	1½
20 kg	1	2
25 kg	1¼	2½
30 kg	1½	3
35 kg	1¾	3½
40 kg	2	4

Tabletes galima padalinti į 2 arba 4 lygias dalis, kad būtų galima tiksliai dozuoti. Tabletę reikia padėti ant lygaus paviršiaus, kad pusė su įranta būtų nukreipta aukštyn, o išgaubta (apvali) remtųsi į kietą paviršių.

Norint padalinti per pusę, reikia žemyn nykščiais paspausti abi tabletės puses.

Norint padalinti į keturias dalis, reikia nykščiu paspausti per tabletės vidurį.



4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Nepalankios reakcijos gali pasireikšti dažniau, jei gydoma didesnėmis dozėmis ir ilgiau nei rekomenduojama. Pasireiškus neurologiniams požymiams, gydymą reikia nutraukti, o pacientą gydyti simptomiškai.

4.11. Išlauka

Netaikytina.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: antiprotozoinės medžiagos nuo pirmuonių sukeltamų ligų, nitroimidazolo dariniai.

ATCvet kodas: QP51AA01

5.1. Farmakodinaminės savybės

Metronidazolui prasiskverbus į bakteriją, jautrios bakterijos (anaerobinės) sumažina molekulę. Susidarę metabolitai bakteriją veikia toksiškai, prisijungdami prie jos DNR. Bendrai metronidazolas baktericidiškai veikia jautrias bakterijas, kai jo koncentracija lygi arba šiek tiek didesnė už minimalią slopinančiąją koncentraciją (ang. MIC).

5.2. Farmakokinetinės savybės

Sušertas metronidazolas yra greitai ir gerai absorbuojamas. Sušėrus vieną 50 mg dozę, po 1 valandos koncentracija plazmoje siekia 10 µg/ml. Biologinis metronidazolo prieinamumas siekia beveik 100 %, o pusėjimo trukmė plazmoje – maždaug 8–10 valandų.

Metronidazolas gerai prasiskverbia į audinius ir kūno skysčius, pvz., seiles, pieną, makšties išskyras ir spermą. Daugiausia metronidazolo metabolizuojama kepenyse. Per 24 valandas po sušėrimo 35–65 % sušertos dozės (metronidazolo ir jo metabolitų) išsiskiria su šlapimu.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Celiuliozė, mikrokristalinė,
karboksimetilkrakmolo A natrio druska,
hidroksipropilceliuliozė,
koloidinis silicio dioksidas, hidratuotas,
magnio stearatas,
mielių ekstraktas,
rudasis geležies oksidas (E172) (juodas, geltonas ir raudonas).

6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nėra.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 30 mėn.
Padalintų tablečių tinkamumo laikas, – 3 dienos.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.
Padalintas tabletes reikia gražinti į lizdinę plokštelę.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

PVC - aliuminio- oPA (orientuotas poliamidas) / karščiu užlydomo lako – aliuminio lizdinė plokštelė kartoninėje dėžutėje.

Pakuočių dydžiai:

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 20 tablečių (2 lizdinės plokštelės po 10 tablečių).

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 100 tablečių (10 lizdinių plokštelių po 10 tablečių).

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 250 tablečių (25 lizdinės plokštelės po 10 tablečių).

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. REGISTRUOTOJAS

Vet-Agro Multi-Trade Company Sp. z o.o.

Gliniana 32, 20-616 Lublin, Lenkija

8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/21/2652/001-003

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2021-04-15

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2021-04-12

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

III PRIEDAS
ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Protozoks 500 mg, tabletės šunims ir katėms
Metronidazolas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Kiekvienoje tableteje yra:
veikliosios medžiagos:
metronidazolo 500 mg.

3. VAISTO FORMA

Tabletė

4. PAKUOTĖS DYDIS

20 tablečių
100 tablečių
250 tablečių

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys ir katės.

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Metronidazolas gali sukelti sunkias nepalankias reakcijas. Vengti sąlyčio su oda ir atsitiktinio prarijimo. Mūvėti nelaidžias pirštines. Vaistą laikyti saugioje vietoje. Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Padalintas tabletes reikia grąžinti į lizdinę plokštelę.

**12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Vet-Agro Multi-Trade Company Sp. z o.o.
Gliniana 32, 20-616 Lublin, Lenkija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/21/2652/001
LT/2/21/2652/002
LT/2/21/2652/003

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR JUOSTELIŲ

aliuminis/aliuminio lizdinės plokštelės

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Protozoks 500 mg, tabletės
Metronidazolas



2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Vet-Agro (logo)

3. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

4. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

B. INFORMACINIS LAPELIS

INFORMACINIS LAPELIS
Protozoks 500 mg, tabletės šunims ir katėms

**1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE
ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Registruotojas

Vet-Agro Multi-Trade Company Sp. z o.o.
Gliniana 32, 20-616 Lublin, Lenkija

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Lelypharma B.V.
Zuiveringweg 42
8243 PZ Lelystad
Nyderlandai

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Protozoks 500 mg, tabletės šunims ir katėms
Metronidazolas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Kiekvienoje tabletėje yra:

veikliosios medžiagos:

metronidazolo 500 mg;

pagalbinių medžiagų: q.s.

Šviesiai ruda su rudomis dėmėmis, išgaubta aromatizuota tabletė su kryžmine įranta vienoje pusėje.
Tabletes galima padalinti į 2 arba 4 lygias dalis.

4. INDIKACIJA (-OS)

Virškinimo trakto infekcinėms ligoms, sukeltoms *Giardia spp.* ir *Clostridia spp.* (pvz., *C. perfringens* arba *C. difficile*), gydyti.

Šlapimo ir lyties organų, burnos ertmės, gerklės ir odos infekcinėms ligoms, sukeltoms metronidazolui jautrių obligatinių anaerobinių bakterijų (pvz., *Clostridia spp.*), gydyti.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti, esant kepenų sutrikimams.

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Naudojus metronidazolo gali pasireikšti šios nepalankios reakcijos: vėmimas, toksinis poveikis kepenims ir neutropenija. Labai retais atvejais gali pasireikšti neurologiniai požymiai.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),

- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
 - labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).
 Pastebėjus bet koki šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.
 Taip pat galima pranešti naudojantis nacionaline pranešimo sistema www.vmv.lt.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys ir katės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Naudoti per burną.

Rekomenduotina dozė yra 50 mg metronidazolo 1 kg kūno svorio per parą, 5–7 d. Paros dozę rekomenduojama padalinti į dvi lygias dalis ir sušerti per du kartus (t.y., po 25 mg/kg kūno svorio du kartus per parą).

Norint tinkamai dozuoti, būtina kuo tiksliau nustatyti kūno svorį.

Kūno svoris (kg)	500 mg tablečių skaičius	
	Du kartus per parą	Vieną kartą per parą
2,5 kg	-	¼
5 kg	¼	½
10 kg	½	1
15 kg	¾	1½
20 kg	1	2
25 kg	1¼	2½
30 kg	1½	3
35 kg	1¾	3½
40 kg	2	4


9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Tabletes galima padalinti į 2 arba 4 lygias dalis, kad būtų galima tiksliai dozuoti.

Tabletę reikia padėti ant lygaus paviršiaus, kad pusė su įranta būtų nukreipta aukštyn, o išgaubta (apvali) remtūsi į kietą paviršių.

Norint padalinti per pusę, reikia žemyn nykščiais paspausti abi tabletės puses.

Norint padalinti į keturias dalis, reikia nykščiu paspausti per tabletės vidurį.



10. IŠLAUKA

Netaikytina.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia. Padalintas tabletes reikia grąžinti į lizdinę plokštelę.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po „EXP“. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Dėl galimo bakterijų jautrumo metronidazolui kintamumo (laiko ir geografinės vietovės atžvilgiu), rekomenduojama imti bakteriologinius mėginius ir atlikti mikroorganizmų jautrumo tyrimus.

Kai tik įmanoma, prieš naudojant vaistą reikia atlikti ligos sukėlėjų jautrumo tyrimus.

Naudojant veterinarinį vaistą būtina atsižvelgti į oficialius, nacionalinius ir vietinius antimikrobinų medžiagų naudojimo reikalavimus.

Gali pasireikšti neurologiniai simptomai, ypač po ilgalaikio gydymo metronidazoliu.

Kadangi tabletės yra aromatizuotos, tabletes reikia laikyti gyvūnams nepasiekiamoje vietoje, kad būtų išvengta atsitiktinio prarijimo.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Tyrimais su laboratoriniais gyvūnais ir iš patirties su žmonėmis patvirtinta, kad metronidazolas pasižymi mutageninėmis ir genotoksinėmis savybėmis. Tyrimais su laboratoriniais gyvūnais patvirtinta,

kad metronidazolas yra kancerogeninė medžiaga, galinti turėti kancerogeninį poveikį žmonėms. Tačiau metronidazolo kancerogeniškumas žmonėms nėra pakankamai įrodytas. Metronidazolas gali būti kenksmingas negimusiam kūdikiui. Nėščios moterys turi atsargiai naudoti šį veterinarinį vaistą. Naudojant šį vaistą gyvūnams, reikia mūvėti nelaidžias pirštines, siekiant išvengti vaisto sąlyčio su oda ir patekimo nuo rankų į burną.

Norint išvengti atsitiktinio prarijimo (ypač vaikams), nepanaudotas tablečių dalis reikia įdėti atgal į atidarytą lizdinę plokštelę, o ją – atgal į kartoninę dėžutę ir laikyti saugioje vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Atsitiktinai prarijus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Metronidazolas gali sukelti padidinto jautrumo reakcijas. Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas metronidazolui, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Naudojus tabletes, būtina kruopščiai plauti rankas.

Vaikingumas

Laboratoriniais tyrimais su gyvūnais gauti nenuoseklūs rezultatai, susiję su metronidazolo teratogeniniu/embriotoksiniu poveikiu. Todėl šio vaisto nerekomenduojama naudoti vaikingumo metu.

Laktacija

Metronidazolas išsiskiria su pienu, todėl jo nerekomenduojama naudoti laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Metronidazolas gali slopinti kitų vaistų (pvz., fenitoino, ciklosporino ir varfarino) skaidymą kepenyse. Cimetidinas gali lėtinti metronidazolo metabolizmą kepenyse, todėl metronidazolo koncentracija kraujo serume gali padidėti.

Fenobarbitalis gali stiprinti metronidazolo metabolizmą kepenyse, todėl metronidazolo koncentracija kraujo serume gali sumažėti.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Nepalankios reakcijos gali pasireikšti dažniau, jei gydoma didesnėmis dozėmis ir ilgiau nei rekomenduojama. Pasireiškus neurologiniams požymiams, gydymą reikia nutraukti, o pacientą gydyti simptomiškai.

Nesuderinamumai

Netaikytina.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis. Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

2021-04-12

15. KITA INFORMACIJA

Pakuočių dydžiai:

Kartoninė dėžutė, kurioje yra su 20 tablečių (2 lizdinės plokštelės po 10 tablečių).

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 100 tablečių (10 lizdinių plokštelių po 10 tablečių).

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 250 tablečių (25 lizdinės plokštelės po 10 tablečių).
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.