



MINISTERIO
DE SANIDAD



agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
MEDICAMENTOS
VETERINARIOS

PROSPECTO:

Intubeaze 20 mg/ml solución para pulverización laringofaríngea para gatos

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización:

Dechra Regulatory B.V.
Handelsweg 25
5531 AE Bladel
Países Bajos

Fabricante responsable de la liberación del lote:

Genera Inc.
Svetonedeljska cesta 2
Kalinovica
10436 Rakov Potok
Croacia

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Intubeaze 20 mg/ml solución para pulverización laringofaríngea para gatos
Lidocaína clorhidrato como monohidrato

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIA(S)

Sustancia activa:
Lidocaína clorhidrato como monohidrato 20 mg/ml
(equivalente a lidocaína 16,2 mg/ml)

Excipientes:
Clorocresol 1 mg/ml

Líquido transparente, incoloro.

4. INDICACIÓN(ES) DE USO

Anestesia local de la mucosa laríngea del gato para facilitar la intubación endotraqueal previniendo la estimulación del reflejo laríngeo.

5. CONTRAINDICACIONES

No usar en animales hipovolémicos o que presenten bloqueo cardíaco. No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-01-13

Página 1 de 4

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID
TEL: 91 822 54 01
FAX: 91 822 54 43

6. REACCIONES ADVERSAS

Ninguna conocida.

Si observa algún efecto adverso, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

Como alternativa puede usted notificar al Sistema Español de Farmacovigilancia Veterinaria vía tarjeta verde.

https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/docs/formulario_tarjeta_verde.doc

7. ESPECIES DE DESTINO

Gatos.

8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Para uso laringofaríngeo.

Aplique una o dos pulverizaciones en la parte trasera de la garganta. Cada pulverización (aproximadamente 0,14 ml) contiene 2,8 mg de lidocaína clorhidrato como monohidrato, que corresponde a 2,27 mg de lidocaína.

Espere entre 30 y 90 segundos antes de intentar la intubación, de forma que la laringe esté relajada.

Tenga en cuenta que al retirar el actuador de la bomba pulverizadora, se debe realizar verticalmente y no en ángulo para garantizar que el acople no quede dañado.

9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Antes de usar, ceba la bomba hasta que suelte líquido. Se recomienda un mínimo de 4 pulverizaciones para cear el frasco antes del primer uso y se recomiendan al menos 2 pulverizaciones para volver a cear si no se utiliza durante 7 días o más.

10. TIEMPO(S) DE ESPERA

No procede.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

No conservar a temperatura superior a 25 C.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta y caja después de CAD. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

Una vez abierto, utilizar antes de 3 meses.

12. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES)

Precauciones especiales para su uso en animales:

Utilizar con precaución en casos con insuficiencia hepática y/o cardiaca.

Se recomienda esterilizar en frío la boquilla entre usos para evitar la propagación de la infección.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

- La lidocaína y el clorocresol pueden causar reacciones de hipersensibilidad (alérgicas). Las personas con hipersensibilidad conocida a estas sustancias deben evitar el contacto con el medicamento veterinario.
- La exposición accidental a este medicamento veterinario puede provocar efectos locales como insensibilidad y efectos sistémicos, como mareos o somnolencia. La exposición accidental, especialmente la exposición oral, ocular y la inhalación debe evitarse.
- Utilice guantes cuando manipule el medicamento veterinario y lave cualquier zona expuesta después del uso. En caso de producirse una exposición accidental ocular, enjuagar con agua.
- En casos de reacciones graves o prolongadas, consulte con un médico y muéstrelle la etiqueta .
- La lidocaína puede formar metabolitos genotóxicos y mutagénicos en los humanos. Estos metabolitos también pueden inducir, en estudios toxicológicos a largo plazo en ratas, efectos carcinogénicos con dosis altas.

Gestación y lactancia:

Los estudios de laboratorio efectuados en ratones han demostrado efectos tóxicos para el feto a dosis altas.

No se han realizado estudios de seguridad con el medicamento veterinario en gatas gestantes. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Ninguna conocida.

Incompatibilidades:

No procede.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

Noviembre 2021

15. INFORMACIÓN ADICIONAL

Uso veterinario.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración exclusiva por el veterinario.

Formatos: 10 ml.