

[Version 9.1, 11/2024]

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ονομασία του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος

Osteopen 100 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για σκύλους

2. Σύνθεση

Κάθε ml περιέχει:

Δραστικό συστατικό:

Pentosan Polysulphate Sodium 100 mg

Έκδοχο (α):

Benzyl Alcohol E1519 10,45 mg

Διαυγές υποκίτρινο υδατικό διάλυμα.

3. Είδη ζώων

Σκύλοι.

4. Θεραπευτικές ενδείξεις

Για τη θεραπεία της χωλότητας και του πόνου λόγω εκφυλιστικής νόσου των αρθρώσεων / οστεοαρθρίτιδας (μη μολυσματική αρθροπάθεια) σε σκελετικά ώριμους σκύλους

5. Αντενδείξεις

Να μην χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της σηπτικής αρθρίτιδας.

Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να ξεκινήσει κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία.

Να μην χρησιμοποιείται σε σκύλους με προχωρημένη ηπατική ή νεφρική δυσλειτουργία ή ενδείξεις λοίμωξης.

Να μην χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

Να μην χρησιμοποιείται σε σκύλους στους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η ωρίμανση των οστών. (δηλ. σκύλους των οποίων οι επιφυσιακές γραμμές των μακρών οστών δεν έχουν ολοκληρώσει το στάδιο ανάπτυξης τους).

Να μην χρησιμοποιείται σε σκύλους με αιματολογικές διαταραχές, διαταραχές της πήξης, αιμορραγία, τραύματα ή κακοήθεια (ιδιαίτερα αιμαγγειοσαρκώματα) ή κατά την περιεγχειρητική περίοδο, εντός 6-8 ωρών μετά τη χειρουργική επέμβαση, καθώς η πολυθειϊκή πεντοζάνη έχει αντιπηκτική δράση

Να μην χρησιμοποιείται σε αρθρίτιδες ανοσολογικής προέλευσης (π.χ. ρευματοειδή αρθρίτιδα).

6. Ειδικές προειδοποιήσεις

Ιδιαίτερες προφυλάξεις για την ασφαλή χρήση στα είδη ζώων:

Να μην υπερβαίνεται η συνιστώμενη δόση. Η αύξηση της συνιστώμενης δόσης μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση της δυσκαμψίας και της δυσφορίας.

Λόγω της ινωδολυτικής δράσης της νατριούχου πολυθειϊκής πεντοζάνης, θα πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα εσωτερικής αιμορραγίας από ένα νεόπλασμα ή μια αγγειακή διαταραχή και να ληφθεί η κατάλληλη θεραπευτική δράση.

Έχει αναφερθεί ότι ένας σκύλος που είχε υποστεί πνευμονική ρήξη πριν από δώδεκα μήνες, είχε σοβαρή πνευμονική αιμορραγία μετά από μια ένεση νατριούχου πολυθειϊκής πεντοζάνης. Χρησιμοποιήστε το με προσοχή σε σκύλους με ιστορικό πνευμονικών ρήξεων. Συνιστάται επίσης προσοχή σε περιπτώσεις ηπατικής δυσλειτουργίας. Η νατριούχος πολυθειϊκή πεντοζάνη έχει αντιπηκτική δράση. Συνιστάται η παρακολούθηση του αιματοκρίτη (PVC) και του χρόνου επαναναπλήρωσης των τριχοειδών, όταν χρησιμοποιείται το προϊόν. Αποφύγετε την ενδομυϊκή ένεση, λόγω του κινδύνου αιματώματος στο σημείο της ένεσης. Δεν πρέπει να χορηγούνται περισσότεροι από τρεις κύκλοι τεσσάρων εγχύσεων, σε περίοδο δώδεκα μηνών. Συνιστάται το ζώο να παρακολουθείται για συμπτώματα απώλειας αίματος και να αντιμετωπίζεται κατάλληλα. Διακόψτε τη θεραπεία εάν εμφανιστούν συμπτώματα αυξημένης αιμορραγίας.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:

Το συντηρητικό, βενζυλική αλκοόλη, μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αλλεργικές) σε ευαισθητοποιημένα άτομα. Εάν γνωρίζετε ότι είστε ευαισθητοποιημένοι, θα πρέπει να προσέχετε κατά το χειρισμό αυτού του προϊόντος. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως την προσβεβλημένη περιοχή με νερό. Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση

Κύηση και Γαλουχία:

Εργαστηριακές μελέτες σε κουνέλια έδειξαν εμβρυοτοξικές επιδράσεις που σχετίζονται με πρωτογενή επίδραση στο μητρικό οργανισμό, σε επαναλαμβανόμενες ημερήσιες δόσεις, 2,5 φορές μεγαλύτερες από τη συνιστώμενη δόση.

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σε έγκυο ή θηλάζον ζώο δεν έχει μελετηθεί, συνεπώς δεν συνιστάται η χρήση σε έγκυα ή θηλάζοντα ζώα.

Το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τον τοκετό, λόγω των αντιπηκτικών του επιδράσεων.

Αλληλεπίδραση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:

Τα ΜΣΑΦ, και ειδικότερα η ασπιρίνη, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με νατριούχο πολυθειϊκή πεντοζάνη, καθώς μπορεί να επηρεάσουν την προσκόλληση των αιμοπεταλίων και να ενισχύσουν την αντιπηκτική δράση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος. Τα κορτικοστεροειδή έχουν αποδειχθεί ότι είναι ανταγωνιστικά σε πολλές δράσεις της νατριούχου πολυθειϊκής πεντοζάνης. Επιπλέον, η χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων μπορεί να προκαλέσει πρόωρη αύξηση της δραστηριότητας του σκύλου, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αναλγητικές και αναγεννητικές επιδράσεις του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.

Να μην χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με στεροειδή ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων της ασπιρίνης και της φαινυλβουταζόνης ή εντός 24 ωρών από μια τέτοια χορήγηση. Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ηπαρίνη και άλλους αντιπηκτικούς παράγοντες.

Υπερδοσολογία:

Σε χορήγηση τριπλάσιας της συνιστώμενης δόσης, έχει παρατηρηθεί μια παροδική αύξηση του χρόνου αιμορραγίας, διάρκειας περίπου 3 έως 4 ωρών. Επαναλαμβανόμενη ημερήσια υπερδοσολογία, πενταπλάσια της συνιστώμενης δόσης ή περισσότερο, είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ανορεξίας και κατάπτωσης, οι οποίες ήταν αναστρέψιμες μετά την διακοπή του φαρμάκου.

Σε υπερδοσολογία, μπορεί να προκληθεί ηπατοκυτταρική βλάβη και μία συσχετιζόμενη δοσοεξαρτώμενη αύξηση στην ALT. Οι αυξήσεις του aPTT και του TT είναι δοσοεξαρτώμενες.

Σε επαναλαμβανόμενες δόσεις μεγαλύτερες από πέντε φορές της συνιστώμενης δόσης, αυτές οι αυξήσεις μπορεί να παραμείνουν περισσότερο και από 1 εβδομάδα μετά τη χορήγηση σε υγιείς σκύλους. Τα συμπτώματα που σχετίζονται με αυτές τις διαταραχές μπορεί να περιλαμβάνουν αιμορραγία στο γαστρεντερικό σωλήνα, στις κοιλότητες του σώματος και εκχυμώσεις.

Σε επαναλαμβανόμενες δόσεις δέκα φορές μεγαλύτερες της συνιστώμενης μπορεί να επέλθει θάνατος ως αποτέλεσμα της γαστρεντερικής αιμορραγίας.

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, οι σκύλοι θα πρέπει να νοσηλεύονται και να παρακολουθούνται και να τους παρέχεται υποστηρικτική θεραπεία, όπως κρίνεται απαραίτητο από τον κτηνίατρο.

Κύριες ασυμβατότητες:

Λόγω έλλειψης μελετών ασυμβατότητας, αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Ειδικοί περιορισμοί χρήσης και ειδικές συνθήκες χρήσης:

Για χορήγηση μόνο από κτηνίατρο.

7. Ανεπιθύμητα συμβάντα

Σκύλοι:

Σπάνια (1 έως 10 ζώα / 10.000 υπό θεραπεία ζώα):	Αντίδραση στο σημείο της ένεσης ¹
Πολύ σπάνια (1 ζώο / 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων αναφορών):	Έμετος ² Κατάπτωση ³ και ληθαργικότητα ^{4,6}
Απροσδιόριστη συχνότητα (δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα)	Παρατεταμένη ενεργοποίηση του χρόνου μερικής θρομβίνης (APTT) και του χρόνου θρομβίνης (TT) ⁵ Έμετος ⁶ , διάρροια ⁶ , ανορεξία ⁶ Αιμορραγικές διαταραχές (όπως ρινορραγία, αιμορραγική διάρροια και αιματώματα) Τοπικές αντιδράσεις (π.χ. οίδημα ⁷)

¹ Μπορεί να συμβεί εντός 24 ωρών σε ένα φαινομενικά υγιές ζώο. Η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται και να χορηγείται συμπτωματική θεραπεία για την ανακούφιση του ζώου.

² Συμβαίνει άμεσα μετά την ένεση. Σε τέτοιους σκύλους, δεν απαιτείται γενικά ιατρική θεραπεία και αναρρώνουν χωρίς απρόοπτα. Δεν συνιστάται περαιτέρω θεραπεία με πολυθειϊκή πεντοζάνη.

³ Φαινομενικά ήπια.

⁴ Διάρκει έως 24 ώρες.

⁵ Μπορεί να εμμένει για έως 24 ώρες μετά τη χορήγηση σε υγιείς σκύλους. Αυτό, πολύ σπάνια προκαλεί κλινικές επιδράσεις, αλλά, λόγω της ινωδολυτικής δράσης της νατριούχου πολυθειϊκής πεντοζάνης, η πιθανότητα εσωτερικής αιμορραγίας από ένα νεόπλασμα ή μια αγγειακή διαταραχή, θα πρέπει να εξεταστεί εάν εμφανιστούν συμπτώματα. Συνιστάται το ζώο να παρακολουθείται για συμπτώματα απώλειας αίματος και να αντιμετωπίζεται κατάλληλα.

⁶ Αυτά τα συμπτώματα, μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας αντίδρασης υπερευαισθησίας και μπορεί να απαιτούν την κατάλληλη συμπτωματική θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης αντιϊσταμινικών.

⁷ Παροδική

Η αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της ασφάλειας ενός κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος. Οι αναφορές πρέπει να αποστέλλονται, κατά προτίμηση μέσω κτηνιάτρου, είτε στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας ή στον τοπικό αντιπρόσωπο του, είτε στην εθνική αρμόδια αρχή μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς. Ανατρέξτε επίσης στο φύλλο οδηγιών χρήσης για τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας.

Ελλάδα

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μεσογείων 284

GR-15562 Χολαργός, Αθήνα

Τηλ: + 30 21 32040213

8. Δοσολογία για κάθε είδος, τρόπος και οδοί χορήγησης

Υποδόρια χρήση.

3 mg νατριούχου πολυθειϊκής πεντοζάνης / kg σωματικού βάρους (ισοδύναμο με 0,3 ml / 10kg σωματικού βάρους) σε τέσσερις επαναλήψεις, με μεσοδιάστημα 5-7 ημερών.

9. Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση

Χορηγήστε άσηπτα μόνο με υποδόρια ένεση. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια κατάλληλα βαθμονομημένη σύριγγα για να επιτρέπεται η ακριβής χορήγηση του απαιτούμενου όγκου δόσης. Αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά την έγχυση μικρών όγκων. Για τον καθορισμό της κατάλληλης δοσολογίας, το βάρος του κάθε ζώου θα πρέπει να προσδιορίζεται πριν από τη χορήγηση του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος.

10. Χρόνοι αναμονής

Δεν ισχύει.

11. Ειδικές συνθήκες διατήρησης

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

Να φυλάσσεται το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φιαλίδιο και στο κουτί μετά Exp.

Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 84 ημέρες

12. Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.

Χρησιμοποιήστε προγράμματα επιστροφής φαρμάκων για την απόρριψη μη χρησιμοποιηθέντων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση τους σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις και με τυχόν ισχύοντα εθνικά συστήματα συλλογής. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων.

13. Ταξινόμηση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

Να χορηγείται μόνον με κτηνιατρική συνταγή.

14. Αριθμοί άδειας κυκλοφορίας και συσκευασίες

A.A.K.: 486 /10-01-2022/K- 0248101
Μεγέθη συσκευασίας: Φιαλίδια των 10 ml και 20 ml.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

15. Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών χρήσης

05/2025

Λεπτομερείς πληροφορίες για το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στη βάση δεδομένων της ΕΕ για τα κτηνιατρικά προϊόντα (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Στοιχεία επικοινωνίας

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Loughrea,
Co. Galway,
Ireland.

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την αποδέσμευση των παρτίδων:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,
Loughrea,
Co. Galway,
Ireland.

Και

Labiana Life Sciences, S.A.
C/Venus,
26 – Pol. Ind. Can Parellada,
Terrassa,
08228 Barcelona,
Spain.

Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:

ALTAVET EE
Ελ. Βενιζέλου 48
16344 Ηλιούπολη
Τηλ. 210 9752347

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

17. Άλλες πληροφορίες