

MARKĒJUMS

V/NRP/03/1588

Šīm veterinārajām zālēm nav lietošanas instrukcijas, visa lietošanas instrukcijā paredzētā informācija ir norādīta uz iepakojuma marķējuma.

INFORMĀCIJA, KUAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

100 g, 1 kg

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

VETRIMOXIN 500 mg/g pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai
Amoxicillin trihydrate

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

1 g pulvera satur -

Aktīvā viela:

Amoksicilīns (amoksicilīna trihidrāta veidā) 500 mg

Papildvielas:

Nātrijs karbonāts (bezūdens), dinātrijs edetāts, koloidāla bezūdens kramskābe, nātrijs citrāts

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 g

1 kg

5. MĒRĶA SUGAS

Mājputni, cūkas un piena teļi

6. INDIKĀCIJA(S)

Uz amoksicilīnu jutīgu mikroorganismu ierosinātu slimību ārstēšanai, kā *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Streptococcus*.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Iekšķīgai lietošanai kopā ar dzeramo ūdeni vai piena aizvietotāju.
20 mg amoksicilīna/kg ķermeņa svara 5 dienas pēc kārtas.

Mājputniem un cūkām: 4 g VETRIMOXIN 500 mg/g uz 10 litriem dzeramā ūdens 5 dienas pēc kārtas.

Teļiem: 4 g VETRIMOXIN 500 mg/g uz 100 kg ķermeņa svara 5 dienas pēc kārtas.

Cūkām un teļiem dienas devu sadala 2 aplikācijas reizēs.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakuproduktiem:

mājputniem: 3 dienas

cūkām: 7 dienas

piena teļiem: 1 diena

Nelietot putniem, no kuriem iegūst olas lietošanai pārtikā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Kontrindikācijas

Nelietot pret penicilīniem pastiprināti jutīgiem dzīvniekiem.

Nelietot lielajiem un mazajiem grauzējiem un zirgu dzimtas dzīvniekiem (Lagomorpha, Rodents un Equidae)

Lietot tikai zīdējiem.

Iespējamās blakus parādības

Hipersensitivitāte.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu informēties par tām savu veterinārārstu.

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu:

Nelietot nieru insuficiences gadījumā.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Penicilīni un cefalosporīni var izsaukt hipersensivitāti injicējot, inhalācijas vai ādas/gļotādu kontakta rezultātā. Paaugstināta jutība pret penicilīniem var radīt krustenisko reakciju uz cefalosporīniem un otrādi. Pret šīm vielām var būt nopietnas alerģiskas reakcijas Personām, ar pastiprinātu jutību pret penicilīniem un cefalosporīniem vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Ja zāles nejauši nokļuvušas uz ādas, skarto vietu nekavējoties mazgāt ar ūdeni.

Šķīdinot zāles ūdenī,

jāizmanto individuālais aizsargtērps, kas sastāv no cimdiem, maskas un brillēm.

Ja Jums rodas izsitumi uz ādas pēc šo veterināro zāļu lietošanas, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojuma marķējumu ārstam.

Ja rodas tādi nopietni simptomi kā sejas, lūpu un acu pietūkums, vai apgrūtināta elpošana nepieciešams nekavējoties meklēt neatliekamo medicīnisko palīdzību. **Lietošana grūsnības,**

laktācijas un dēšanas laikā:

Nav noteikts veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības, laktācijas un dēšanas laikā.

Lietot tikai, kad ārstējošais veterinārārstu izvērtējis potenciālo ieguvumu attiecībā pret iespējamo risku.

Laboratoriskajos pētījumos ar laboratorijas dzīvniekiem netika konstatēta teratogēna, fetotoksiska vai maternotoksiska iedarbība.

Mijiedarbības veidi:

Amoksicilīna baktericīdais efekts var ievērojami pazemināties, lietojot vienlaicīgi ar bakteriostatiskām antibiotikām.

Pārdozēšana

VETRIMOXIN 500 mg/g pārdozēšana sastopama ļoti reti, jo dzīvnieku sugām, kurām pielieto šo produktu ir augsta tolerance.

Ja ir aizdomas, ka ir toksiska reakcija no pārdozēšanas, jāpārtrauc ārstēšana un, nepieciešamības gadījumā, jāuzsāk simptomātiska ārstēšana.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma aiz EXP.

Pēc iepakojuma atvēršanas izlietot 2 mēnešu laikā.

Pēc atvēršanas, izlietot līdz: __/__/__

Pēc sajaukšanas ar ūdeni produkts jāizlieto 12 stundu laikā.

Pēc sajaukšanas ar piena aizvietotāju produkts jāizlieto 1 stundas laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt sausā vietā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem

13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ"

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā!

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Ceva Sante Animale

Zone Industrielle La Ballastiere

33500 Libourne

Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Ceva Sante Animale

Z.I. de Tres Le Bois

22603 Loudeac

Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/NRP/03/1588

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

Datums, kad lietošanas instrukcija pēdējo reizi tika apstiprināta: